




Med

4757

-2-

Ausführliches
Recept-Taschenbuch
in
alphabetischer Ordnung
für
praktische Aerzte und Wundärzte.

Mit einleitenden Bemerkungen
über die Art und Weise Recepte zu verordnen.

Herausgegeben

von

J. Karl Wilh. Walther,

Doctor der Medicin und Chirurgie, Professor an der Universität und
Director der chirurg. Poliklinik zu Leipzig.

Zweiter Band.

L e i p z i g.

Verlag von Gebhardt & Reisland.

1847.



V o r w o r t.

Auch in diesem zweiten Bande sind manche Arzneimittel theils aus den bereits in dem Vorworte zum ersten Bande angeführten Gründen, theils weil Recepte zu mehreren dieser Mittel leicht und ohne alle Anweisung abzufassen, Muster-Vorschriften aber davon nicht vorhanden sind, weggelassen worden.

Diese sind:

Ilicis folia,

Kali bichromicum,

Labdanum,

Lacca,

Ledum palustre,

Lichen parietinus,

Ligni fossilis oleum empyreumaticum,
 Matricaria,
 Melonum semina,
 Mercurialis,
 Mesembryanthemum,
 Mustelae fluviatilis oleum hepatis,
 Nasturtium,
 Olibanum,
 Origanum,
 Oryza,
 Papaver rhoeas,
 Passulae,
 Pikrotoxinum,
 Polytrichum commune,
 Pomum Borsdorfianum,
 Prunus padus,
 Pulegium,
 Pulvis pyrius,
 Pyrola,
 Ranae,
 Rhamnus catharticus,
 Ribes rubrum,
 Rosa rubra,

Rosae villosae semina,
Rubia tinctoria,
Rumicis acetosae folia,
Sandaracha,
Sanguis draconis,
Scolopendrii frons,
Scordium,
Scorzonera,
Sevum vervecinum,
Siliqua dulcis,
Simaruba,
Spigelia,
Tacamahaca,
Thuja occidentalis,
Thymus,
Tiliae flores,
Tragacantha.

Das Inhaltsverzeichniss, welches in einer dreifachen Abtheilung die Namen der Aerzte und Autoren, von welchen die Recepte entnommen sind, die Arzneimittel, deren Synonyme und Präparate, und die Krankheitsformen, gegen welche die Vorschriften empfohlen sind,

in grösster Vollständigkeit umfasst, hat Herr Dr. Anton zu fertigen die Gefälligkeit gehabt.

Mit vielem Danke werde ich es erkennen, wenn man mich auf Fehler aufmerksam machen will, damit diese bei einer zweiten Auflage vermieden werden.

Leipzig, im September 1847.

Der Herausgeber.

I.

Jalapae radix. Jalapenwurzel.

(*Convolvulus Jalapa L. Ipomoea Jalapa Nuttal.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Latt-
werge, Morsellen, Trochisken, Emulsion, als Reizmittel
gr. $\text{ij}—\text{v}$, als gelind eröffnendes Mittel gr. $\text{vj}—\text{x}$, eini-
gemal, als starkes Purgirmittel $\text{ʒj}—\text{ij}$, 2–3mal. Ja-
apenharz in Pillen, Bissen, geistiger Auflösung, nicht
gern in Pulver und Emulsion, gr. $\text{v}—\text{x}$, 1–2mal. Prä-
parirtes Harz in noch einmal so grosser Gabe. Jalapen-
seife in Pillen, Bissen, $\text{ʒß}—\text{j}$, 1–2mal täglich.

2124. Rx. Rad. jalap. pulv.

Tartari depur.

Elaeosacch. foeniculi $\text{āā } \text{ʒj}$.

M. f. pulvis.

D. S. Aller 2 Stunden 1 Theelöffel voll bis zur
Wirkung.

Pulvis purgans Hufelandi.

Anwend. Abführmittel.

Hufeland.

2125. Ry. Hydrargyr. muriat. mitis gr. xij
 Pulv. rad. jalapae ʒß
 Elaeosacch. citri ʒij.
 M. f. pulv. Div. in part. iij aequal.

D. S. Zweistündlich 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. Abführung.

2126. Ry. Pulv. rad. jalapae ʒj
 Kali sulphurici ʒij
 Olei anisi gutt. j.
 M. f. pulv. Div. in part. duas aequal.

S. Binnen einer Stunde beide Pulver zu nehmen.

Anwend. Zu gleichem Zwecke.

Vogel.

2127. Ry. Pulv. rad. jalapae
 „ „ rhei
 Tartari depurati āā ʒj.
 M. f. pulvis.

D. S. Auf einmal zu nehmen.

Anwend. Zu gleichem Zwecke.

Nicolai.

2128. Ry. Pulv. rad. jalapae
 „ „ rhei āā gr. ij
 „ cort. cinnamom. gr.
 Sacchari albi ʒß.
 M. f. pulvis.

S. Auf einmal zu geben.

Anwend. Abführmittel für Kinder.

Hôp. de la Matern.

2129. Ry. Pulv. rad. jalapae $\bar{3}\beta$

Syrup. althaeae $\bar{3}j$.

M. S. Wohlungeschüttelt, den dritten Theil auf einmal.

Anwend. Abführmittel für Kinder.

Hufeland.

2130. Ry. Pulv. rad. jalapae

Kali sulphurici $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ij$

Roob sambuci $\bar{3}j$

Syrup. spinae cervin. l. commun. q. s.

F. electuar.

S. Alle Stunden 1 Theelöffel voll, bis Wirkung erfolgt.

Anwend. Eröffnungsmittel.

J. A. Schmidt.

2131. Ry. Pulv. rad. jalapae $\bar{3}j$

Crem. tartari $\bar{3}ij$ —iv

Roob sambuci

Oxymell. scillae $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$

M. f. electuarium.

S. Aller 2 Stunden einen reichlichen Theelöffel voll zu nehmen, bis Purgiren erfolgt.

Anwend. In der Wassersucht.

Weickard.

2132. Ry. Pulv. rad. jalapae $\bar{3}j$

Hydrargyr. muriat. mitis gr. ij

Olei anisi aether. gutt. ij

Mellag. taraxaci q. s. ut f. bolus.

S. Auf einmal zu nehmen und schwarzen Kaffee nachzutrinken.

Anwend. Abführmittel.

Berends.

2133. *Ry.* Resin. jalapae 3ß
 Sapon. medic. 3jß
 Amygdal. dulc. 3ij.
 M. f. tritur. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Früh 3—12 Stück zu nehmen.

Anwend. Als Abführmittel, wo Bewegung im Darne, besonders im Magen und Dünndarme fehlt.

v. Wedekind.

2134. *Ry.* Resin. jalapae praep. gr. ij
 Hydrarg. muriat. mitis gr. iij
 Sacchari albi 3j.
 M. f. pulv. Div. in duas part. aequal.

S. Früh ein Stück zu geben.

Anwend. Abführmittel für Kinder.

Schwartze

2135. *Ry.* Resin jalapae pulv.
 Aloes
 Hydrargyr. muriat. mitis āā 3j
 Tinct. rhei aquos. q. s.
 F. pil. gr. ij. Consp. cinnamom.

D. S. Täglich 8 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei veraltetem Status mucosus, veralteten Unterleibsstockungen, zumal im Pfortader- und Lebersystem.

Selle.

2136. *Ry.* Sapon. jalap. 3ß
 Gummi gutti gr. xij.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Täglich 3mal 6—8 Stück zu nehmen.

Pilulae purgantes Graefii.

Anwend. Abführmittel.

v. Graefe.

Ignatii Sancti faba. Ignazbohne.*(Fabae indicae. Von Ignatia amara L.)*

Form u. Gabe. In Pulver oder im Aufguss, zu gr. β —j, einigemal täglich. Tinktur zu 10—20 Tropfen.

2137. *Ry.* Fabae St. Ignatii gr. ij—iij
Gummi arab. $\mathfrak{z}\beta$
Sacchari lact. gr. xvj.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.

S. Täglich 2mal 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. Gegen Epilepsie.

Andr. Haase.

2138. *Ry.* Fabae St. Ignatii rasp. $\mathfrak{z}\beta$.
Infunde
Aquae ferv. q. s.
Digere in loco calido per $\frac{1}{2}$ hor. Colat. $\mathfrak{z}\text{vj}$
adde
Syrup. cinnamomi $\mathfrak{z}\text{vj}$.

M. D. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Epilepsie.

Andr. Haase.

Imperatoriae radix. Meister- oder
Kaiserwurzel.

(*Von Imperatoria Ostruthium L.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, zu gr. x—xxx, mehrmals täglich; im Aufguss, $\mathfrak{z}\beta$ auf $\mathfrak{z}\text{vj}$.

2139. *Ry.* Pulv. rad. imperatoriae
„ ligni guajaci
„ fol. sennae $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{z}\text{j}$
„ cort. ligni sassafras
„ bacc. juniperi $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{z}\beta$
„ rad. helenii $\mathfrak{z}\beta$
„ semin. anisi $\mathfrak{z}\text{ij}$
Mellis despumati $\mathfrak{z}\text{j}$.
M. f. electuarium.

S. Täglich 2—4mal 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Electuarium mundificans Himlyi.

Anwend. Gegen chronische Hautkrankheiten.

Sch. clin. Gotting. Fuchs.

2140. *Ry.* Tartari tartaris.
Spongiar. tostar.
Sacchari albi $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{z}\beta$
Salis ammoniaci
Pulv. rad. imperatoriae
Cinnamomi acuti $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{z}\text{ij}$
Sulphur. aurat. antimon. $\mathfrak{z}\text{j}$
Piperis longi $\mathfrak{z}\text{j}$.
M. f. pulv. subtiliss.

D. S. Früh und Abends einen gehäuften Theelöffel voll zu nehmen.

Pulvis contra strumam Hedeni.

Anwend. Gegen Kropf.

Hedenus.

2141. Ry. Pulv. rad. imperatoriae $\mathfrak{z}\text{ij}\beta$
 Tinct rad. imperatoriae
 Axungiae porci aa $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 M. f. unguentum.

D. S. *Messerrückendick auf Leinwand zu streichen und Morgens und Abends zu verbinden.*

Anwend. Gegen Gesichtskrebs.

Mylius.

Indigum. Indigo.

(Von Indigofera disperma, argentea, tinctoria, Anil L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, zu $\mathfrak{z}\beta$ — $\mathfrak{z}\text{ij}$ täglich.

Man vermeide Brom, Chlor, chlorichtsaurer Salze.

2142. Ry. Indigi subtiliss. pulv. $\mathfrak{z}\beta$
 Pulv. aromat. Pharm. Bor. gr. v.
 Disp. tal. dos. x.

S. *Zwei-, drei- bis viermal täglich ein Pulver zu nehmen.*

Anwend. Gegen Epilepsie und andere Krämpfe.

Roth (nach Ideler). Berl. Charité.

2143. Ry. Indigi subtiliss. pulv. $\mathfrak{z}\beta$
 Pulv. aromat. $\mathfrak{z}\beta$.

D. S. *Drei bis vier Theelöffel voll täglich zu nehmen.*

Anwend. In gleichen Fällen.

Derselbe.

2144. *Ry.* Indigi pulv. aquae gutt. nonnulli. subacti $\bar{3}\beta$
 Pulv. aromat. $\bar{3}\beta$
 Syrup. simpl. $\bar{3}j$.
 M. f. l. a. electuar.

D. S. Den Tag über zu verbrauchen.

Anwend. In gleichen Fällen.

Derselbe.

Iodium. Jod.

(*Iodum, Jodina, Iodinum, Iodinium; Jodine.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, 'Lösung, zu gr. $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{2}$ —1. Tinktur, 4—16 Tropfen, 2—3mal täglich. Aeusserlich in Salben, gr. x—xv auf $\bar{3}\beta$, Pflaster, zu Waschungen, Bähungen, Kataplasmen, Einreibungen, Einspritzungen, Augewässern, Bädern.

Man vermeide starke, auch organische Basen, kohlen-saure Alkalien, Alkaloidsalze, neutrale Ammoniumsalze, mehrere Metallsalze, z. B. salpeters. Silber, Quecksilbersalze, Blei-, Kupfer-, Spiessglanzoxyd-Salze; ferner organische Substanzen, besonders amylothaltige Flüssigkeiten als Vehikel beim Einnehmen, Licht, Metallgefässe.

2145. *Ry.* Iodii gr. $\frac{1}{16}$
 Hydrargyr. muriat. mit.
 Herb. digital. purp. $\bar{a}\bar{a}$ gr. β —ij
 Pulv. gummosi $\bar{3}j$.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. xvj. D. in charta cerata.

S. Aller 3 Stunden ein Stück mit Leinsamenschleim.

Anwend. Gegen Wassersuchten, namentlich chronische und akute Gehirnwassersucht der Kinder. Zugleich kann man

sich einer Jodsalbe-Einreibung bedienen. Das Jod kann auch sehr zweckmässig mit Colchicum, Scilla, Terebinth. und Cantharid. verbunden werden.

Jahn.

2146. *Ry.* Iodii gr. vj
 Extr. gentian. rubr. 3j
 Mucilag. gummi mimos. q. s.
 F. pil. xxiv. Consp. cinnam.

S. Viermal täglich 3 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Speichelfluss, insbesondere skorbutischen.

v. Helmenstreitt.

2147. *Ry.* Iodii puriss. gr. j
 Pulv. rad. liquirit. ʒj
 Roob sambuci q. s.
 F. pil. viij. Consp. lycop.

S. Früh und Abends 4 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei Kropf, kalten Drüsengeschwülsten, Amenorrhöe u. s. w.

Brera.

2148. *Ry.* Iodii gr. v.
 Solve in
 Spirit. vini 3ij.
 Adde
 Aquae cinnamomi 3jß
 Syrup. simpl. 3ß.

S. Täglich 4mal einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Quecksilberspeichelfluss.

Knod v. Helmenstreitt.

2149. *Ry.* Iodii gr. ij
 Kali hydroiodici gr. iij.
 Solve in
 Aquae fontanae $\bar{3}$ ij.

D. S. Täglich 4 halbe und nach 4 Tagen 4 ganze
 Esslöffel voll zu nehmen und mit der Gabe so-
 fort auf gr. ij—iv—vj—viij täglich zu steigen.

Anwend. Gegen Quecksilberspeichelfluss.

Kluge.

2150. *Ry.* Iodii gr. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$
 Kali hydroiodici gr. xv—xx.
 Solve in
 Aquae destillatae $\bar{3}$ iv.
 Adde
 Syrup. capit. papav. $\bar{3}$ ij.

M. S. Täglich 3mal einen Esslöffel.

Anwend. Gegen inveterirte Geschwüre und Knochenaufstrei-
 bungen skrofulöser, arthritischer oder syphilitisch-merku-
 rieller Natur, besonders wenn Quecksilber nicht vertragen
 wird.

Dewees.

2151. *Ry.* Iodii gr. β
 Kali iodati $\bar{3}\beta$
 Syrup. papav. $\bar{3}\beta$
 Aquae destill. $\mathcal{Q}\beta$.

M. D. S. Täglich 3mal 2 Esslöffel voll zu neh-
 men.

Anwend. Bei Komplikation der Syphilis mit Skrofeln.

Tyrrel.

2152. *Ry.* Iodii gr. iij
 Kali hydroiodici gr. vj
 Aquae destillatae $\bar{\text{z}}$ j.

S. S. Täglich 3 mal 5 — 10 Tropfen in Zuckerwasser und allmählig bis 15 Tropfen gestiegen.

Anwend. In der Wassersucht.

Costler.

2153. *Ry.* Iodii puri gr. $\frac{3}{4}$ —1—1 $\frac{1}{4}$
 Kali hydroiodici gr. jß—ij—ijß
 Aquae destillatae $\bar{\text{z}}$ vij.

S. S. Täglich $\frac{2}{3}$ zu verbrauchen, später die ganze Portion.

Solutio iodurata Lugolii.

Anwend. Gegen Flechten, Skirrhus u. s. w.

Die erste leichtere Art wird 2—3 Wochen, die zweite aber von der 4. und 5. Woche der Kur bis zur Beendigung fortgesetzt. Die dritte stärkste Form wird selten gebraucht. Im Augenblicke des Einnehmens kann eine kleine Menge Zucker beigelegt werden.

Lugol.

2154. *Ry.* Iodii $\mathfrak{z}$!
 Kali hydroiodici $\mathfrak{z}$ ij
 Aquae destillatae $\bar{\text{z}}$ vij.

S. S. Täglich zweimal 6 Tropfen in einem Glase Zuckerwasser.

Solutio iodii concentrata Lugolii.

Anwend. In gleichen Fällen. — Wöchentlich um 2 Tropfen bis auf 36 Tropfen zu steigen. Kindern unter 6 Jahren 2—5 Tropfen, zwischen 7—14 Jahren 5—16 Tropfen.

Lugol.

2155. *Ry.* Tinct. iodii ̄ij
 Syrup. sacchari ̄iv .
M. frigide.

S. Jodsyrup.

(Muss stets frisch bereitet werden.)

2156. *Ry.* Tinct. iodii gutt. xc
 Decocti cort. peruvian. ̄x .
M. S. Täglich dreimal 2 Esslöffel voll.
Anwend. Gegen skrofulöse Geschwüre.

Rey.

2157. *Ry.* Tinct. iodii ̄ij .
S. Jeden Morgen 12—16 Tropfen in einem halben Glase Zuckerwasser.
Anwend. Bei äusserst hartnäckigen, keinem Mittel weichen-
 den Trippern.

dal Persico.

2158. *Ry.* Iodii gr. vj
 Aether. sulphur. ̄ij .
M. S. Täglich 2—3mal 8—10 Tropfen.

Aether sulphuricus ioduratus Magendii.

Anwend. Gegen Skrofeln mit Nervenleiden. — 30 Tropfen
 enthalten $\frac{1}{4}$ Gr. Jod.

Magendie.

2159. *Ry.* Iodii gr. ij—iij—iv
 Kali hydroiod. gr. iv—vj—viij
 Aquae destill. ̄xvj .
S. S. Zum Waschen.

Lugol's Jodsolution zum äusseren Gebrauche.

Anwend. Bei skrofulösen Leiden zu Einspritzungen in die

Thränenkanäle, zwischen die Augenlider, in Fisteln, geöffnete Cysten, in die Nase bei Ozaena. — Man bediene sich gläserner oder knöcherner Spritzen, und richte den Strahl nicht zu sehr gegen die Rachenhöhle.

Lugol.

2160. *Ry.* Iodii $\mathfrak{z}\beta$
 Kali hydroiod. $\mathfrak{z}j$
 Aquae destill. $\mathfrak{z}vj$.

S. S. Zum äussern Gebrauche.

Lugol's rothmachende Jodsolution.

Anwend. Man bringt diese Lösung mittelst Leinwandläppchen auf Oberflächen, die einer starken Reizung bedürfen; bei chronischer Ophthalmie, Ozaena, Geschwüren u. s. w. — Man braucht sie auch zu Bädern und Umschlägen.

Lugol's Jodbad. Man fügt die vorstehende Lösung — oder nur $\mathfrak{z}ij$ — $\mathfrak{z}iv$ — zu warmem Wasser. Zu örtlichen Bädern wird die Menge nach dem Gefühle des Kranken bestimmt. Metallgefässe sind zu vermeiden. Für Kinder muss die Menge des Jods und Jodkalis vermindert werden.

Jodumschläge. Man mischt diese Solution mit einem gewöhnlichen Umschlage und benutzt sie bei harten knotigen Geschwülsten und kalten Abscessen, die anderen Behandlungsweisen widerstanden.

2161. *Ry.* Iodii $\mathfrak{z}j$
 Kali iodati $\mathfrak{z}ij$.
 Solve in
 Aquae destill. $\mathfrak{z}ij$.

D. S. Zum äussern Gebrauche.

Lugol's kaustische Jodsolution.

Anwend. Wo die vorige Solution ihre Wirkung versagte, wird diese angewendet, auf die Augenlider, Nasenhöhle, Ge-

schwürränder, zur Unterdrückung übermässiger Granulation, bei fressenden Flechten, um die einzelnen Pusteln zu betupfen, wöchentlich 2—3 mal.

Lugol.

2162. Ry. Tinct. iodii gutt. xxx
 „ opii gutt. xxvj
 Aquae destill. ℥iv.

M. S. Augenwasser.

Anwend. Bei hartnäckiger skrofulöser Ophthalmie.

Lugol.

2163. Ry. Iodii gr. β—j
 Kali iodati ʒβ.
 Solve in
 Aquae rosar. ℥iij.

D. S. Augenwasser, 4mal täglich zu appliciren.

Anwend. Bei skrofulösen Ophthalmieen, selbst mit Schwärung der Conjunctiva und Cornea.

Magendie.

2161. Ry. Iodii gr. xv.
 Kali hydroiod. ʒij.
 Solve in
 Aquae destill. simpl. ℥v.
 Adde
 Spirit. vini rectific. ℥j.

M. D. S. Mittelst eines Schwämmchens aller 2 Stunden anzuwenden.

Anwend. Bei Prurigo perinaealis; bei Prurigo vulvae muss diese Mischung um das Vierfache verdünnt werden.

Hancke.

2165. Ry. Iodii gr. vj
 Kali hydroiod. ʒij
 Axungiae ʒj.
 M. f. unguentum.

S. Salbe.

Anwend. Bei skrofulöser Ophthalmie, Geschwüren, Fisteln, Knoten.

Lugol.

2166. Ry. Iodii ʒß
 Axungiae porci ʒjß.
 M. f. unguentum.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Bei atonischen Geschwülsten, verhärteten Bubonen u. s. w.

Brera.

2167. Ry. Iodii ʒiij
 Unguent. hydrargyr. ciner. ʒij.
 M. f. unguentum.

S. Täglich 3—4 mal einen Theelöffel voll in den Unterleib einzureiben.

Anwend. Bei Eierstockwassersucht.

Jahn.

2168. Ry. Iodii gr. xv
 Kali hydroiodici ʒj
 Tinct. opii ʒij
 Axungiae ʒij.
 M. f. unguentum.

S. Salbe.

Anwend. Gegen schmerzhaft skrofulöse Geschwüre, Rachitis, weisse Kniegeschwulst, Wasserkopf u. s. w.

Lugol. Lemasson.

2169. *Ry.* Iodii gr. xx—xxiv
 Kali hydroiodic. gr. XL—XLviii
 Unguent. simpl. $\text{℥}\beta$.
 M. f. unguent.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Zur Beförderung der Absorption bei Ablagerungen in Drüsen u. s. w., besonders auch einige Zeit hindurch täglich auf die Brust einzureiben bei beginnender tuberkulöser Lungensucht.

Little.

2170. *Ry.* Iodii gr. xij
 Kali iodati $\text{℥}\text{ij}$
 Medull. ossium $\text{℥}\text{ij}$.
 M. f. unguent.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Bei Frostbeulen.

Schmalz.

2171. *Ry.* Emplastr. lithargyri $\text{℥}\text{ij}$
 Iodii pulv. $\text{℥}\beta$
 Kali hydroiodic. $\text{℥}\text{ij}$
 Extr. opii $\text{℥}\text{ij}$.
 Malax.; f. emplastr.

S. *Lugol's Jodpflaster.*

Anwend. Gegen skrofulöse Geschwülste, rhachitische Knochenaufreibungen, weisse Kniegeschwulst u. s. w.

2172. *Ry.* Emplastr. hydrargyr. l. saponati $\text{℥}\text{j}$.
 Leni calore emollito admisce
 Iodii pulv.
 Kali hydroiodic. pulv. āā gr. v—x.
 M. f. emplastrum.

D.

Anwend. Bei syphilitischen und gichtischen Knochengeschwülsten.

Ebers.

Ipecacuanhae radix. Brechwurzel.

(*Ruhrwurzel. Von Cephaëlis Ipecacuanha Willd.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Trochisken, Schütteltrank, zu gr. $\frac{1}{6}$ —j, 3—4mal; im Aufguss, zu gr. $\frac{1}{3}$ —j auf $\bar{3}j$, esslöffelweise, 4—6mal, als revulsivisches, magenstärkendes Mittel. Als Brechmittel zu gr. xv—xxx, in drei Theilen, aller 10 Minuten einen, bis Brechen erfolgt, oder $\mathfrak{3}j$ —ij auf $\bar{3}iij$ Wasser, esslöffelweise, eben so oft.

Man vermeide Salzbilder, Jod- und Bromkalium, Metallsalze, Gerbestoff.

2173. R. Pulv. rad. ipecacuanhae
Elaeosacch. foenicul. $\bar{a}a$ $\mathfrak{3}ij$.
M. f. pulv. Div. in iv part. aequal.

S. Aller 10—12 Minuten 1 Pulver, bis zur Wirkung.

Anwend. : Als Brechmittel.

Sundelin.

2174. R. Tartari stibiati gr. ij
„ depurati $\bar{5}j$
Rad. ipecacuanhae $\mathfrak{3}j$.
M. f. pulv. Div. in iij part. aequal.

D. S. Viertelstündlich 1 Pulver, bis dreimal Erbrechen erfolgt ist.

Anwend. Als Brechmittel.

Schubarth.

2175. *Ry.* Pulv. rad. ipecacuanhae
 „ gummi mimosae āā 3ß.
M. f. pulv. Div. in iij part. aequal.
S. *Aller Viertelstunden 1 Pulver, bis Erbrechen folgt.*
Anwend. Als Brechmittel, wo Durchfall zu meiden.

2176. *Ry.* Tartari stibiati gr. ij
 Rad. ipecacuanhae gr. xv—xx
 Sacchari albi 3ij.
M. f. pulv. Div. in iij part. aequal.
S. *Aller Viertelstunden 1 Stück zu nehmen, bis Wirkung erfolgt.*
Anwend. Als Brechmittel.

Berends.

2177. *Ry.* Zinci oxydati gr. xij
 Rad. ipecacuanhae 3ß
 Elaeosacch. citri 3j.
M. f. pulv. Div. in vj part. aequal. D. in charta cerata.
S. *Aller 10 Minuten 1 Pulver, bis Erbrechen erfolgt.*
Anwend. Bei sensiblen, zu Krämpfen geneigten Individuen.

Sundelin.

2178. *Ry.* Pulv. rad. ipecacuanhae gr. iij
 Tartari depur. 3ij
 Sacchari albi 3vj.
M. f. pulvis.
S. *Einen halben bis ganzen Kaffeelöffel voll zu nehmen.*
 Pulvis antemeticus Vogleri.
Anwend. Zum Stillen von Erbrechen.

Vogler.

2179. *Ry.* Rad. ipecacuanhae gr. ij
 Natri carbonici sicci
 Pulv. cort. aurant. āā ℥ij.
 M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. Früh 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. Gegen Magenkrampf mit Säure und Atonie der ersten Wege.

Choulant.

2180. *Ry.* Rad. ipecacuanhae gr. ij—iv
 Sacchari albi ℥ij.
 M. f. pulv. Div. in iv part. aequal.

S. Alle Stunden 1 Pulver.

Anwend. Gegen falsche Wehen.

Bei gastrischer Komplikation kann man Kali sulphuric. ℥j zusetzen.

Ribke.

2181. *Ry.* Rad. ipecacuanhae gr. ij
 Opii puri gr. iv
 Camphorae tritae gr. viij
 Sacchari albi ℥viij.
 M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. Täglich 3—4mal 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. In der Ruhr, wenn der eigentliche Fieberzustand vorüber ist und nur noch eine habituelle Schwäche, Schläfheit, Gewohnheit im Darmkanale den Abgang und Schmerzen verursacht.

Selle. Fr. Jahn.

2182. *Ry.* Radic. ipecacuanhae gr. ij
 Sacchari albi ℥iv

Olei nucis moschatae gutt. ij.

M. f. pulv. Div. in iv part. aequal.

S. *Aller 3—4 Stunden 1 Pulver in einem halben Glase Zuckerwasser zu nehmen.*

Anwend. Bei chronischer Diarrhœe.

P. Frank.

2183. Rx. Rad. ipecacuanhae gr. xij

Opii puri gr. vj

Sacchari albi 3j.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. *Aller 2 Stunden 1 Pulver.*

Anwend. Im Säuferwahnsinn.

v. Hildenbrand.

2184. Rx. Pulv. rad. ipecacuanhae comp. gr. viij

Aluminis crudi

Cortic. cinnamomi

Gummi arabici āā ʒij

Sacchari albi ʒiv.

M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. *Aller 3 Stunden ein Pulver.*

Anwend. Gegen passiven Mutterblutfluss.

2185. Rx. Rad. ipecacuanhae gr. $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{4}$

Ammon. muriat. dep. gr. xij

Succi liquirit. dep.

Sacchari lactis āā gr. vj.

M. f. pulv. Dent. tal. dos. xij.

S. *Aller 2 Stunden 1 Stück.*

Anwend. Bei Brustentzündung, wo die aktive Entzündung gewichen und nur noch ein gereizter Zustand der Schleimhäute vorhanden ist.

Kopp.

2186. *Ry.* Rad. ipecacuanhae
 Sulph. stibiat. aurant. āā gr. j
 Camphorae tritae gr. iij
 Pulv. gummosi ℥j.
 M. f. pulv. Disp. tal. dos. viij. Dent. in charta
 cerata.

S. *Aller 2 Stunden 1 Pulver.*

Anwend. Wenn in der Pneumonie der Auswurf unter Sinken
 des Pulses, grosser Entkräftung, Röcheln stockt oder ganz
 aufhört.

Mursinna.

2187. *Ry.* Pulv. rad. ipecacuanhae ℥ij
 Sapon. med. ℥iv.
 M. exacte; f. pil. Lxxx. Consp. cinnam
S. *Nach dem Mittagessen 1, und kurz vor dem
 Schlafengehen 3—6 Stück zu nehmen.*

Anwend. Gegen Dyspepsie, Stuhlverstopfung.

James.

2188. *Ry.* Pulv. rad. ipecacuanhae
 Extr. centaur. min. āā gr. xv
 Rad. rhei 3ß.
 M. f. pil. xxx. Consp. rad. irid. flor.
D. S. *Nach dem Frühstück und beim Schlafen-
 gehen 1 Stück.*

Anwend. Bei Magenschwäche, Neigung zu Säureerzeugung,
 allein oder mit Magnesia.

2189. *Ry.* Rad. ipecacuanh. gr. v—x
 „ rhei 3ß
 Mucil. gumm. tragacanth. q. s.
 F. pil. xx. Consp. cinnam.

S. *Früh und Abends 1 Stück.*

Anwend. Gegen Schwäche und krampfhaftes Leiden des Ma-
 gens und Darmkanals.

Radius.

2190. *Ry.* Opii pulv. gr. v
 Rad. ipecacuanhae pulv.
 Herb. digital. pulv. āā 3ß
 Extr. helenii q. s.
 F. pil. lx. Consp. pulv. rad. irid. flor. D. in vitro.

S. Dreistündlich 1 Pille.

Anwend. Bei Husten, krampfhaftem Asthma.

Heim.

2191. *Ry.* Pulv. rad. ipecacuanh. gr. viij—x
 Extr. columb. sicci 3ij
 Spirit. vini q. s.
 ut f. pil. xl. Consp. rad. calam. arom.

S. Aller 2 Stunden 1 Pille.

Anwend. Gegen Magendrücken, Blähungen, Uebelkeit.

Kopp.

2192. *Ry.* Pulv. rad. ipecacuanhae
 „ opii āā gr. xv
 Balsami copaivae q. s.
 ut f. pil. xxx. Consp. rad. liquirit.

S. Früh 1 Stück und Abends 2 Stück, oder aller 4 Stunden 1 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Husten, der von Krampf und Reiz herrührt und sich durch seine nächtliche Heftigkeit und Trockenheit auszeichnet.

Weickard.

2193. *Ry.* Pulv. rad. ipecacuanh. gr. viij—xij
 Extr. aconiti gr. xxxij
 Pulv. rad. althaeae q. s.
 ut f. pil. xxxij. Consp. lycop.

S. Stündlich 1 Stück zu nehmen, bis zur Beseitigung des Anfalles.

Anwend. Gegen periodisch-asthmatische Beschwerden mit

gichtischem Hinterhalte. In der anfallsfreien Zeit können die Pillen aller 2 Stunden fortgesetzt werden.

Kopp.

2194. *Ry.* Rad. ipecacuanh. pulv. gr. vj—x
Chocolat. q. s., ut f. trochisci cxx.

S. Aller 2 Stunden 1 Stück.

Anwend. Gegen Uebelkeiten und Erbrechen Schwangerer.

Kopp.

2195. *Ry.* Rad. ipecacuanh. ʒj
Catechu ʒij
Ambrae gr. iij
Sacchari albi ʒj.
M. f. c. mucil. tragacanth. trochisci xl.

S. Aller 3 Stunden 1 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Schwäche des Darmkanals und habituellen atonischen Durchfall.

Daubenton.

2196. *Ry.* Rad. ipecacuanh. ʒj
„ liquirit.
Sacchari albi āā ʒij
Mucil. tragacanth. q. s.
F. trochisci xxx.

S. Früh und Abends 1 Stück.

Anwend. Gegen mannichfache Nervenleiden, Verdauungsschwäche.

Choulant.

2197. *Ry.* Rad. ipecacuanh. pulv. ʒj
Chocolat. c. vanill. parat. ʒj
Mucilag. gumm. tragacanth. q. s.

F. trochisci lx, pulv. vanill. consperg., lenissime torrendi.

S. *Täglich 2mal 1 Stück zu nehmen.*

Anwend. Gegen Magenschwäche mit Blähungen.

Richter.

2198. R_y. Opii pulverati gr. j
Rad. ipecacuanh. pulv. gr. iij
Sacchari albi pulv. ʒjß
Mucilag. gumm. tragacanth. q. s.
F. trochisci viij. Consp. cinnam.

D. S. *Morgens und Abends 2 Stück.*

Anwend. Als Diaphoreticum.

Phöbus.

2199. R_y. Pulv. rad. ipecacuanh. ʒj
Syrup. simpl. q. s. ut f. bolus.

S. *Auf einmal zu nehmen, und erst nach beginnender Wirkung reichlich nachzutrinken.*

Anwend. Brechmittel.

Gaubius.

2200. R_y. Tart. stibiati gr. ij
Rad. ipecacuanhae pulv. ʒj
Extr. cardui bened. q. s.
F. bolus. Consp. rad. irid. flor.

S. *Brechbissen.*

2201. R_y. Pulv. rad. ipecacuanh. ʒß
Extr. cardui benedict. ʒij

Aquae commun. q. s.
ut f. electuar.

S. Zuerst die Hälfte, nach einer Viertelstunde die andere Hälfte zu nehmen.

Anwend. Brechmittel.

2202. *Ry.* Pulv. rad. ipecacuanh. $\mathfrak{Dj}$ — $\mathfrak{ij}$
Aquae melissae $\mathfrak{Zij}$
Aether. acetici gutt. viij.

M. D. S. Umgeschüttelt, aller 10 Minuten einen Esslöffel, bis mehrmaliges Erbrechen erfolgt ist.

Anwend. Brechmittel für sensible Personen und Damen.

Berends.

2203. *Ry.* Pulv. rad. ipecacuanh. gr. $\mathfrak{ij}$ — $\mathfrak{iv}$
Natri subcarbonici $\mathfrak{D}\beta$
Syrup. capit. papav. $\mathfrak{Zj}$
Aquae menth. $\mathfrak{Zvj}$.

M. S. Aller 1—2—3 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen krampfhaftes Erbrechen.

Sainte - Marie.

2204. *Ry* Rad. ipecacuanh. $\mathfrak{Z}\beta$.
Infunde cum
Aquae ferv. ad colat. $\mathfrak{Ziv}$.
Liqu. kali acetici $\mathfrak{Zj}$.

M. S. Esslöffelweise.

Anwend. Zur Förderung der Expektion in Katarrhen der Luftwege und zu Ende entzündlicher Lungenkrankheiten.

Choulant.

2205. Ry. Rad. ipecacuanhae $\mathfrak{z}\text{j}$
 Fol. digital. purp. $\mathfrak{z}\beta$.
 Inf. c. aquae ferv. q. s. ad col. $\mathfrak{z}\text{v}$.
 Liqu. kali acetici $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. S. Täglich 3mal einen Esslöffel.

Anwend. Gegen chronische Brustübel ohne Entzündung.

Choulant.

2206. Ry. Rad. ipecacuanhae rud. tus. gr. $\text{vj} - \mathfrak{z}\beta$
 Inf. q. s. aquae ferv. per $\frac{1}{4}$ hor. v. c. ad
 colat. $\mathfrak{z}\text{vj}$.

S. Aller 2 Stunden 2 Esslöffel voll.

Anwend. Ein sehr schätzbares Mittel beim Uebergange katar-
 rhalischer Fieber in den nervösen Zustand.

Bisweilen wird Mucilag. gummi arab. $\mathfrak{z}\beta$ oder Syrup.
 cort. aurant. $\mathfrak{z}\text{ij}$ oder Zucker beigefügt; zuweilen wird die
 Ipecacuanha zu Ende des Kochens einer Althäaabkochung
 zugesetzt, oder man verbindet sie mit Valerian. oder gr. ij
 Kampher.

Schol. clin. Vindob.

2207. Ry. Rad. ipecacuanhae contus. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Cort. aurant. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Inf. aquae font. q. s. ad colat. $\mathfrak{z}\text{iiij}$
 in quae solve
 Kali tartarici $\mathfrak{z}\text{j}$
 Syrup. chamomillae $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. D. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel

Anwend. Gegen Icterus spasmodicus.

Baldinger.

2208. Ry. Rad. ipecacuanhae $\mathfrak{z}\beta$.
 Infunde
 Aquae font q. s. ad colat. $\mathfrak{z}\text{vj}$. Refrig. adde

Spirit. nitrico-aether. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Succ. juniperi inspiss. $\mathfrak{z}\text{j}$.

*M. D. S. Umgeschüttelt, alle 2 Stunden einen
 Esslöffel.*

Anwend. Für Kinder bei asthenischer Wassersucht, z. B. nach
 Scharlach.

Wendt.

2209. *Ry.* Rad. ipecacuanhae cont. $\mathfrak{z}\text{j}$.
 Coque ex
 Aquae font. $\mathfrak{z}\text{iv}$ per x sexag. Colat. adde
 Syrup. flor. aurant. $\mathfrak{z}\beta$.

M. S. Alle Viertelstunden einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Ruhr.

E m e t i n a d e p u r a t a; gereinigtes
 Emetin.

(*Emetinum; Brechstoff, Brechwurzelalkaloid,*
[unpassend] Extractum Ipecacuanhae.)

Form u. Gabe. In Pillen, Bissen, Trochisken,
 Lösung, zu gr. $\frac{1}{8}$ —j, zwei- bis dreimal.

Man vermeide die unter Ipecacuanha angegebenen Ver-
 bindungen.

2210. *Ry.* Emetinae dep. gr. j.
 Solve in
 Acidi acetici q. s.

Adde

Inf. (Aquae) flor. tiliae $\bar{3}$ ij

Syrup. althaeae $\bar{3}$ j.

M. S. Alle Viertelstunden einen Esslöffel, bis zur Wirkung.

Anwend. Als Brechmittel.

Magendie.

2211. *Ry.* Emetinae dep. gr. j
Syrup. sacchari $\bar{3}$ xij.

S. S. Kaffeelöffelweise.

Magendie's Emetinsyrup.

Anwend. In Fällen, wo Ipecacuanha, in kleinen Gaben angezeigt ist.

2212. *Ry.* Emetinae dep. gr. viij
Sacchari albi $\bar{3}$ iv
Mucilag. gummi tragacanth. q. s
F. trochisci gr. ix.

S. Alle Stunden ein Stück zu nehmen.

Magendie's Emetinplätzchen.

Anwend. In gleichen Fällen.

Iridis florentinae radix. Floren-
tinische Veilchen- (Violen-) Wurzel.

(*Von Iris florentina L.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Trochisken, Aufguss, zu $\mathfrak{z}\beta$ — $\mathfrak{z}\beta$, mehrmals täglich; äusserlich als Kaumittel für Kinder, zur Unterhaltung von Fontanel-
len, gepulvert als Schnupf-, Zahn-, Wasch-, Räucher-
Pulver, zum Conspergiren.

2213. *Ry.* Magnes. carbonic.
Pulv. rad. iridis flor.
„ „ rhei $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}j$
Olei foenicul. gutt. ijj .
M. f. pulvis.

S. Täglich 3—4mal eine Messerspitze.

Anwend. Für Säuglinge mit Krämpfen aus Säure.

Bibke.

2214. *Ry.* Acidi benzoici $\mathfrak{z}j$
Sulphur. dep. $\mathfrak{z}\beta$
Rad. liquirit.
„ iridis florent. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}ij$
Sacchari albi $\mathfrak{z}ij$
Olei anisi
„ foeniculi $\overline{aa}$ gutt. x.
M. f. pulv. D. in scatula.

S. Täglich 3mal einen Theelöffel.

Pulvis pectoralis Wedelii.

Anwend. Bei heftigem, mit zähem Auswurfe verbundenem
Husten.

Juglans. Wallnuss.*(Von Juglans regia L.)***A. Folia juglandis regiae; Wallnussbaumblätter.**

Form u. Gabe. Im Aufguss die klein geschnittenen Blätter $\text{℥j} - \text{ij}$ auf ℥viij kochenden Wassers, mit Zucker oder Nussbaumblättersyrup versüsst, 2—3—5 Tassen täglich. — Extrakt der Blätter in Pillen, eine jede von gr. iv Extrakt mit Pulver von Nussbaumblättern gemengt, täglich 2 Stück, niemals über 4. — Syrup, gr. viij Extrakt mit ℥j einfachen Syrup vermengt; hiervon täglich kleinen Kindern 2—3 Kaffeelöffel voll in 24 Stunden, Erwachsenen $\text{℥j} - \text{℥ix}$. — Aeusserlich Abkochung der Blätter, $\text{℥iv} - \text{vj}$ auf ℥ijß , $\frac{1}{4}$ Stunde lang gekocht, zum Waschen und als Verbandwasser für skrofulöse Geschwüre, als Einspritzung für Fistelgänge und zu örtlichen Bädern. — Salbe, aus ℥vij Extrakt der Nussbaumblätter, ℥ix Fett und gr. ijß Bergamottöl, zu Friktionen, $\frac{1}{4}$ Stunde lang täglich 2mal. (Nach Négrier.)

B. Juglandes; Wallnüsse.

Form u. Gabe. Grüne Wallnusschale (*Putamen s. Cortex viridis nuc. juglandum*), in Abkochung, $\text{℥℥} - \text{j}$ mit ℥ix auf ℥vj , täglich zu verbrauchen; äusserlich abgekocht zu Umschlägen und Verbandwässern. Extrakt zu $\text{℥℥} - \text{j}$, einigemal, in Pillen, Bissen, Mixturen; äusserlich Pinselsaft, Gurgelwasser, Verbandwasser, Salbe. Oel, äusserlich.

Man vermeide Salzbilder, Metallsalze, thierischen Leim, Eiweiss, Kleber, Stärkmehl.

2215. *Ry.* Extr. nuc. juglandis $\bar{3}ij$
Aquae cinnamom. $\bar{3}\beta$.

S. S. Täglich 2—3mal 50 Tropfen.

Anwend. Gegen Würmer 3—4jähriger Kinder.

Stoll.

J. G. Fischer empfiehlt dasselbe Mittel bei abnehmendem Monde und lässt jeden 3. oder 5. Tag eine Abführung von Kalomel nehmen.

2216. *Ry.* Extr. nuc. juglandis
„ myrrhae
„ chamomill. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$.

Solve in

Solut. lapid. divin. c. aerug. parat. $\bar{3}iij$

Laudan. liquid. Syd. $\bar{3}j$

Mellis rosar. $\bar{3}j$

D. S. Zum Verbande.

Anwend. Gegen schlaffe Skrofelgeschwüre.

Kuhl.

2217. *Ry.* Cort. virid. nuc. juglandis siccata. $\bar{3}j$.

Infunde cum

Aquae commun. $\bar{8}j$.

Post tres horas infusio ebulliat per $\frac{1}{4}$ hor.; refrigeret.

D. S. Waschwasser.

Anwend. Gegen Flechtengeschwüre.

P. Frank.

2218. *Ry.* Rad. sarsaparill.

„ chinae nodosae $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$

Lapid. pumicis
Antimonii crudi } in petia ligat. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$

Cortic. nuc. juglandis interior. lignos. $\bar{3}x$.

Coque vase clauso in mensuris duabus aquae ad dimidiam consumptionem. Decoctum colatum (non filtratum) detur.

S. Früh und Abends ein Seidel zu nehmen.

Decoctum Pollin'i.

Anwend. Gegen inveterirte Syphilis und andere Dyskrasieen.

Dieses ist die vom Prof. Dr. Pleischl in Wien aufgefundene Original-Formel; nach ihm ist der bisherige Gebrauch des Putamen erfolglos.

2219. *Ry.* Olei nuc. juglandis 3j
Hydrargyr. oxydulat. nigr. gr. j.

M. S. Augensalbe.

Anwend. Gegen Hornhautflecke.

Hufeland. Andreae.

2220. *Ry.* Zinci oxydati albi 3ß
Olei nuc. juglandis 3j
Ungt. rosat. 3j.
M. f. unguentum.

S. Mit einem Pinsel täglich 2mal einer Linse gross in's Auge zu streichen.

Anwend. Gegen Hornhautflecke.

J. A. Schmidt.

Juniperus communis L. Gemeiner Wachholder.

(*K a d d i g.*)

Beeren, Holz.

Form u. Gabe. Die Beeren in Substanz als Kautmittel; als Pulver, in Bissen, Lattwerge, zu $\mathfrak{z}\beta - \mathfrak{ij}$, täglich 2—3mal; äusserlich zerstoßen zu Räucherungen Umschlägen, Salben. Aufguss oder leichte Abkochung mit Wasser, Bier, Wein, Branntwein, Milch, $\mathfrak{z}\beta - \mathfrak{j}$ auf $\mathfrak{z}\mathfrak{vj} - \mathfrak{xij}$, täglich zu verbrauchen. Roob in Lösung, Lattwerge, Bissen, Pillen, $\mathfrak{z}\beta - \mathfrak{j}$ täglich. Aether. Oel 1—4 Tropfen, 2—3mal. Spiritus $\mathfrak{z}\mathfrak{j} - \mathfrak{z}\mathfrak{j}$, einigemal täglich; äusserlich zu Umschlägen, Einreibungen, Waschungen. — Das Holz in Abkochung, $\mathfrak{z}\mathfrak{j} - \mathfrak{ij}$ auf $\mathfrak{z}\mathfrak{ij} - \mathfrak{ij}$ Wasser, täglich zu verbrauchen; äusserlich zu Räucherspecies.

2221. **Ry.** Baccar. juniperi cont. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$
Semin. petrosel. cont. $\mathfrak{z}\mathfrak{\beta}$
Aquae comm. ferv. q. s.
Digere per $\frac{1}{2}$ hor.
In colat. refriger. $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$ solve
Elaeosacchari juniperi $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$
et adde
Spirit. nitrico-aether. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

M. D. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Als Diureticum.

Phöbus.

2222. Ry. Infusi bacc. juniperi (℥β) ℥viii
 Aether. sulphur. gutt. xx
 Oxymell. scillit. ℥β.

M. D. S. Esslöffelweise.

Anwend. Auf gleiche Weise.

Brera.

2223. Ry. Olei juniperi ℥β
 Spirit. nitrico-aether.
 Tinct. digital. purp. āā ℥iij.

M. D. S. Aller 3 Stunden 20—30 Tropfen.

Tinctura diuretica Hufelandi.

Anwend. Eines der bewährtesten urintreibenden Mittel, welches den Magen nicht angreift und lange fortgesetzt werden kann.

Hufeland.

2224. Ry. Roob juniperi ℥j
 Aquae juniperi ℥vj
 Spirit. juniperi ℥β
 „ nitri dulcis ℥j.

M. D. S. Aller 3 Stunden 2 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. In der Wassersucht.

van Swieten.

2225. Ry. Summitat. juniperi ℥iij.
 Coque cum
 Aquae font. ℥iv ad reman. ℥ij.
 Sub finem coct. adde
 Bacc. juniperi ℥j.

Cola. S. Täglich 3—4mal eine halbe Tasse voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Wassersucht, Asthma und chronische Hautkrankheiten.

2226. *Ry.* Spirit. juniperi $\bar{3}j$
 „ saponis $\bar{3}iij$.

M. S. Morgens und Abends auf den Unterleib
 einzureiben.

Anwend. Bei atonischer Bauchwassersucht.

Brera.

2227. *Ry.* Olei terebinth. $\bar{3}j$
 Petrolei rectific. $\bar{3}\beta$
 Spirit. juniperi $\bar{3}iv$.

M. D. S. Täglich 2—3mal etwas erwärmt und
 umgeschüttelt die Lendengend damit zu wa-
 schen.

Anwend. Bei Wassersuchten mit Torpidität der Harnorgane.

Vogt

K.

Kali. Vegetabilisches Laugensalz.

(*Alkali, Potassa; Kali, Potasche.*)

A. *Kali aceticum*; essigsaures Kali.

(*Terra foliata Tartari, Acetas Kali; geblätterte
Weinsteinerde.*)

Form u. Gabe. In Lösung, $\mathfrak{zj}$ — $\mathfrak{ij}$, 3—4mal täglich. *Liquor kali acetici*, $\mathfrak{3j}$ — $\mathfrak{ij}$, mehrmals.

Man vermeide (mit Ausnahme der Riechpulver, wo man Essigsäure entbinden will) starke Mineralsäuren und diejenigen Salze dieser Säuren, die eine schwächere Base als Kali enthalten.

2228. Rx. *Kali acetici* $\mathfrak{3j}$

„ *sulphurici acidi* $\mathfrak{3ij}$.

M. f. pulv. D. ad vitrum epist. vitr. munitum.

S. *Riechpulver.*

Anwend. Bei Ohnmachten.

Mit ein wenig Wasser oder Essig zu befeuchten.

2229. *Ry.* Kali acetici $\bar{3}$ ij
 Aquae menthae pip. $\bar{3}$ ij
 Syrup. cort. aurant. $\bar{3}$ j.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Als Solvens bei Stockungen der Abdominaleingeweide.

Vogel.

2230. *Ry.* Liqu. kali acetici $\bar{3}$ ß
 Extr. taraxaci liquidi $\bar{3}$ ij
 Tinct. rhei aquos. $\bar{3}$ ß
 Aquae melissae l. tiliae $\bar{3}$ j.

S. S. Aller 2 Stunden 80—100 Tropfen.

Anwend. Bei gastrischen Unreinigkeiten der Kinder.

Radius.

2231. *Ry.* Liqu. kali acetici
 Syrup. cichorei $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ j
 Extr. graminis $\bar{3}$ ij
 Vini stibiati
 Saponis stibiati $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ij.

S. S. Aller 2 Stunden 1—2 Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei skrofulöser Aufreibung der Gekrösdrüsen.

Schäffer.

2232. *Ry.* Kali carbon. depur. $\bar{3}$ j
 Aceti q. s. ad saturat.
 Tinct. rhei aquos. $\bar{3}$ j
 Aquae benedict. Rulandi $\bar{3}$ j.

M. S. Täglich 3mal 20 Tropfen.

Anwend. Gegen Verstopfung der Gekrösdrüsen bei Kindern von einigen Jahren; auch bei zarten Erwachsenen in grösserer Gabe nützlich.

Selle.

2233. *Ry.* Liqu. kali acetici $\bar{3}j$
 Aquae chamomill. $\bar{3}vj$
 „ laurocerasi $\bar{3}j$.

M. S. Alle Stunden 1 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Beängstigungen, Herzzufälle, selbst gegen hysterische Beschwerden, die mit Plethora abdominalis in Verbindung stehen.

M. H. A. Naumann.

2234. *Ry.* Extr. digital. purp. gr. $vj - viij$.
 Solve in
 Liqu. kali acetici $\bar{3}ijj$.
 Adde
 Aquae laurocerasi
 Vini stibiati $\bar{a}a \bar{3}j$.

M. S. Aller 2 Stunden 2 Theelöffel.

Anwend. In der erethischen, floriden Skrofulosis.

Sobernheim.

2235. *Ry.* Liqu. kali acetici $\bar{3}ij\beta$
 Kali subcarbonici $\bar{3}j$
 Aquae destillat. $\bar{3}\beta$
 Alcohol. $\bar{3}ij$.

Stent in digestionem usque ad perf. salis solution.

D. S. 20 — 30 Tropfen in einem schicklichen Vehikel.

Solutio lithontriptica della Lena.

Anwend. Gegen Steinbeschwerden.

B. Kali carbonicum; kohlen saures Kali.

- a. Kali carbonicum crudum, Potassa cruda; unreines kohlen saures Kali, rohe Potasche.

Form u. Gabe. Nur zu Waschungen, $\mathfrak{3}\beta - j$ auf $\mathfrak{8}j$, Bädern $\mathfrak{3}iv - viij$, Fussbädern $\mathfrak{3}j - ij$.

2236. Ry. Kali carbon. crudi
 „ nitrici crudi $\mathfrak{aa} \mathfrak{3}ij$
 Aquae font. $\mathfrak{3}vj$
 Spirit. vini rectific. $\mathfrak{3}v$.

S. S. Umgeschüttelt, dreimal des Tages 1—2 Esslöffel voll in die behafteten Stellen einzureiben.

Spiritus contra scabiem Truseni.

Anwend. Gegen Krätze.

- b. Kali carbonicum depuratum; gereinigtes kohlen saures Kali, gereinigte Potasche.

- α . Ex Cineribus clavellatis, e Potassa.

Form u. Gabe. Selten innerlich. Waschungen, Einspritzungen, Umschläge, $\mathfrak{3}j - ij$ auf $\mathfrak{3}vj - viij$; Lini-
 ment, Salbe.

2237. Ry. Kali carbon. e potassa $\mathfrak{3}iij$
 Aquae destill. $\mathfrak{3}iv$.

S. S. Zum äussern Gebrauch.

Anwend. Als verdünnte, lauwarme Waschung und Einspritzung gegen Jucken und Fressen in der Scheide.

Trousseau.

2238. *Ry.* Kali carbon. e potassa $\overline{3}$ ij—iij
Aquae font. $\overline{3}$ xij.

S. S. Zum Waschen.

Anwend. Gegen chronischen Friesel.

2239. *Ry.* Kali carbon. e ciner. clavellat. $\overline{3}$ iiij
Natri muriat. $\overline{3}$ ij
Aquae rosar. $\overline{3}$ viiij
Aquae flor. aurantior. $\overline{3}$ ij.

S. Waschwasser.

Anwend. Gegen Sommerflecken.

Sundelin.

2240. *Ry.* Sulphur. dep. $\overline{3}\beta$
Kali carb. e ciner. clavell. subt. pulv. $\overline{3}$ ij
Adipis suilli $\overline{3}$ ij.
M. f. unguentum.

D. S. Täglich 3mal einzureiben.

Anwend. Gegen Krätze, in Verbindung mit Schwefelbädern.

Alibert.

β . Ex Tartaro. Sal Tartari; kohlensaures,
mildes Kali aus Weinstein bereitet, Wein-
steinsalz.

Form u. Gabe. In Lösung, zu gr. ij—x, 2—
4mal täglich. Sättigungen mit Essig, Citronensäure.
Augenwasser, gr. j—v auf $\overline{3}$ j. Liquor kali carbonici
(Liquor s. Oleum tartari per deliquium), 5—30 Tro-
pfen, 2—4mal; bei Vergiftungen öfter.

Man *vermeide* Säuren, saure Säfte und Salze, Kalkpräparate, alle Metallsalze, alkaloidische Vegetabilien, Aqua communis.

2241. *Ry.* Kali carbon. e tart. $\bar{3}\beta$
Aquae destill. $\bar{3}j\beta$.

S. S. Täglich 10—40 Tropfen.

Anwend. Gegen Konvulsionen der Kinder.

Hamilton.

2242. *Ry.* Kali carbon. e tart. $\bar{3}ij$
Aquae chamomill.
„ cinnamom. simpl. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ij$
Syrup. capit. papav. $\bar{3}j$.

S. S. Stündlich oder halbstündlich, abwechselnd mit 5—15 Tropfen Opiumtinktur, 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Starrkrampf.

Dabei Seifenklystiere; 1—2mal täglich ein Aetzkalibad.

Stütz.

2243. *Ry.* Kali carbon. e tart. $\bar{3}j-j\beta$.
Solve in
Aquae menth. crisp. $\bar{3}v$.
Adde
Syrup. cort. aurant. $\bar{3}j\beta$.

M. D. S. Aller 2—3 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Als Säuretilgendes, auflösendes und krampfstillendes Mittel.

Sundelin.

2244. *Ry.* Kali carbon. e tartaro $\bar{3}j$
Aquae sambuci $\bar{3}vj$

Syrup. althaeae $\bar{3}j$.

M. S. Alle Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen die mit Mandelbräune verbundenen aphthösen Eruptionen in heftigen Katarrhalfebern.

Castello. Naumann.

2245. *Ry.* Kali carbon. e tart. $\bar{3}ij$
Sacchari albiss. $\bar{3}ij$.

Solve in

Aquae destill. $\bar{3}iv$

„ cinnam. simpl. $\bar{3}ij$.

D. S. Alle halbe Stunden 3 Esslöffel mit 1 Esslöffel Citronensaft während des Aufbrausens zu nehmen.

Potio Riverii.

Anwend. Zur Stillung von Erbrechen.

2246. *Ry.* Liqu. kali carbon. $\bar{3}ij$
Aquae foeniculi $\bar{3}j\beta$.

M. S. Früh und Abends 80—90 Tropfen.

Anwend. Gegen Magensäure.

2247. *Ry.* Kali carbon. e tart. $\bar{3}\beta—j$.
Satura cum

Succi citri rec. expressi.

Adde

Aquae destill. simpl. $\bar{3}ij$

Syrup. rubi idaei $\bar{3}j$.

M. S. Zweistündlich einen halben oder ganzen Kinderlöffel voll.

Anwend. Als temperirendes Mittel.

Berends.

2248. *Ry.* Liqu. kali carbon. $\bar{3}$ ij
 Decocti rad. althaeae $\bar{3}$ vj
 Syrup. simpl. $\bar{3}$ j.

M. S. Umgeschüttelt, *Esslöffelweise*.

Anwend. Bei Vergiftung durch Schwefelsäure.

Ebers.

2249. *Ry.* Liqu. kali carbon. $\bar{3}$ β
 Olei amygdal. dulc. $\bar{3}$ jβ
 Aquae destillat. $\bar{3}$ x
 Syrup. emulsiv. $\bar{3}$ j.

M. S. Halbstündlich *Löffelweise*.

Anwend. Gegen Arsenikvergiftung.

Buchholz.

2250. *Ry.* Opii puriss. $\bar{3}$ ij
 Aquae cinnamom. vinos. $\bar{3}$ iv
 „ „ simpl.
 Sal. tartari dep. āā $\bar{8}$ j.

Separatim solvantur, deinde misceantur invicem et stent in balneo arenae per tres hebdomades saepius agitando. Colaturae tunc admisce

Sal. alcali volat. $\bar{3}$ j

Gummi arabici electi in aquae cinnam. $\bar{3}$ vj soluti $\bar{3}$ ij.

Omnia in se mixta stent in vase bene clauso per aliquot dies in quiete, dein filtrentur et serventur.

D. S. Der Kranke nehme in Syrup. capill. Ven. oder amygdal. oder in Eibischthee täglich 3mal 24 Tropfen und vermindere die Dosis, sobald die Symptome nachlassen.

Tinctura antisyphilitica Besnardi.

Anwend. Gegen alle Formen der Syphilis.

C. Kali bicarbonicum; doppelt kohlen-
saures Kali.

(*Kali carbonicum perfecte saturatum, Kali carbonicum acidulum, Sal Tartari crystallisatum; saures, neutrales kohlen-saures Kali.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Lösung, zu ʒß—j, mehrmals täglich; selten äusserlich zu Waschungen.

Man vermeide dieselben Verbindungen wie bei Kali carb. e tart. angegeben sind.

2251. R_y. Kali carbon. acidul. gr. xv
Flaved. cort. aurant. gr. v.
M. f. pulv. Disp. tal. dos. vj.

D. S. Täglich 3mal ein Pulver in Zuckerwasser.

Anwend. Gegen Säure in den ersten Wegen.

G. A. Richter.

2252. R_y. Acidi tartarici gr. vij
Kali carbon. acidul.
Sacchari albi l. Elaeosacch. citri āā ʒß.
M. f. pulv. Disp. tal. dos. viij.

D. S. Brausepulver.

2253. R_y. Kali bicarbon.
Elaeosacchari citri āā ʒj
Aquae destill. ʒij.

M. S. Von Zeit zu Zeit 1 Esslöffel zu nehmen,

nachdem vorher 3—4 Theelöffel Citronensaft genommen.

Anwend. Gegen Erbrechen. — Der Citronensaft wird mit Zucker und Wasser zu einer concentrirten Limonade gemacht, oder auch nur versüsst.

Phöbus.

2254. *Ry.* Kali carbonic. acidul. ʒij.

Solve. in

Aquae selteranae ℥j.

D. S. Täglich zu verbrauchen.

Anwend. Gegen Steinbeschwerden.

Colborn.

2255. *Ry.* Kali bicarbonic. ʒj

„ sulphurati ʒij

Aquae destillat. ℥j.

Sol. S. Zum Waschen.

Anwend. Gegen Prurigo.

Blasius.

2256. *Ry.* Kali carbonic. acidul. gr. ij—vj

Aquae destill. ʒj.

S. S. Aller 4, später aller 2 Stunden einzuträufeln.

Anwend. Gegen Hornhautflecke.

Himly.

D. Kali causticum; Aetzkali.

(*Kali causticum vegetabile; ätzendes vegetabilisches Laugensalz.*)

a. Kali causticum fusum; geschmolzenes Aetzkali.

(*Lapis causticus chirurgorum; Aetzstein.*)

Form u. Gabe. Aetzmittel; gepulvert auf ein gefensteres Pflaster getragen und mit einigen Tropfen Wasser angefeuchtet; auf feuchte Stellen mit einem Pinsel von Asbest oder hölzernen Spatel aufgetragen. Bad, $\overline{3j}$ — iv ; örtlich $\overline{3j}$ auf $\overline{3j}$.

Man vermeide alle Säuren und Salze der Alkalien, Erden und Metalloxyde.

2257. R_y. Kali caustici fusi $\overline{3v}$
 Calc. ustae pulv. $\overline{3vj}$.
 M. f. pulv. in mort. calido ferreo.

Pulvis causticus Vindobonensis.

Nimmt man statt des Aetzkalkes frisch gelöschten Kalk, so hat man das sogenannte Londoner Aetzpulver welches schwächer wirkt

Anwend. Zum Aetzen. Man befeuchtet es mit einigen Tropfen Wasser und bringt es auf ein gefensteres Pflaster.

2258. *Ry.* Kali caustici fusi gr. x
Opium puri gr. iv
Aquae destill. $\mathfrak{Z}_{xxx-x}$.

S. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Gegen hartnäckige, selbst noch entzündliche Tripper und Leukorrhöen.

Girtanner.

2259. *Ry.* Kali caustici fusi gr. $\beta-j$
Aquae destill. $\mathfrak{L}j$

S. S. Lauwarm aller 3—4 Stunden in die Harnröhre oder Scheide gleich nach verdächtigem Beischlaffe einzuspritzen und einige Minuten zurück zu halten.

Anwend. Als Prophylacticum der Ansteckung.

J. A. Schmidt.

2260. *Ry.* Kali caustici $\mathfrak{Z}\beta$
Aquae font. $\mathfrak{Z}vj$.

S. S. Zu Umschlägen.

Anwend. Gegen skrofulöse Geschwüre.

Cerutti.

2261. *Ry.* Kali caustici fusi $\mathfrak{Z}\beta$
Aquae destillat. $\mathfrak{L}j$.

S. S. Zum Waschen und Befeuchten der Charpie, 3—4mal täglich.

Anwend. Bei Wunden vom Bisse toller Thiere.

Rust.

2262. *Ry.* Kali caustici fusi $\mathfrak{Z}\beta$
Aquae destill. simpl. $\mathfrak{Z}ij$.

S. S. Aeusserlich.

Anwend. Gegen Bisswunden wüthender Thiere. Man lässt

die Wunde aller 5—6 Minuten damit auswaschen, in der Zwischenzeit leinene, damit befeuchtete Kompressen auflegen und so 48 Stunden fortfahren, dann 14 Tage lang nur alle Stunden die Kompresse auflegen und späterhin die verheilte Wunde noch einige Tage damit waschen.

Mederer. Sauter.

b. Kali causticum siccum; trocknes
Aetzkali.

(*Kali vegetabile purum; reines Aetzkali.*)

Form u. Gabe. In Lösung, zu gr. $\frac{1}{4}$ —2, zwei- und dreimal täglich. Augewasser, gr. β — ij auf $\bar{\text{z}}$ j; Einspritzungen, gr. ij — iiij auf $\bar{\text{z}}$ j; Verbandwasser, gr. j — vj auf $\bar{\text{z}}$ j.

Man vermeide alle Säuren und Salze der Alkalien, Erden und Metalloxyde.

2263. Rx. Kali caustici $\text{ʒ}\beta$
Aquae cort. aurant. $\bar{\text{z}}$ j.

S. S. Täglich 4mal 12—20 Tropfen mit Fleischbrühe zu nehmen.

Anwend. Gegen Skrofeln.

Wendt. Cerutti.

2264. Rx. Kali caustici $\bar{\text{z}}$ j
Aquae destill. $\bar{\text{z}}$ j.

S. S. Morgens und Abends Erwachsenen vom 15. Jahre an den neunten Theil dieser Lösung und allmählig gestiegen; Kindern von 8—15 Jahren den 18. Theil; Kindern von 4—8 Jahren den

25. Theil und allmählig gestiegen, immer so verdünnt, dass sie durchaus keine brennende Empfindung auf der Zunge haben.

Anwend. Gegen Skrofeln.

Dzondi.

2265. R_y. Kali caustici gr. ij
Aqua destill. ℥j.

S. S. Augenwasser.

Anwend. Gegen Hornhautflecke. Man lässt einige Tropfen zwischen die Augenlider fallen und wäscht sodann die Augen mit einer schleimigen Flüssigkeit aus.

Gimbernati.

2266. R_y. Kali caustici gr. j
Aqua destill. ℥ij—iij.

S. S. Die Augen fleissig damit zu bestreichen.

Anwend. Gegen torpide Augenentzündung.

v. Gräfe.

2267. R_y. Kali caustici gr. ij—iij
Aqua destill. ℥j.

S. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Gegen Hodenverhärtung.

Durch täglich 2mal wiederholte Einspritzungen in die Harnröhre sucht Handschuch Entzündung in derselben hervorzurufen, welches er für das beste Mittel zur Zertheilung der Verhärtung des Hodens hält.

Handschuch.

2268. *Ry.* Kali caustici sicci gr. j
 Aquae calc. ustae $\bar{3}$ vj
 Tinct. opii simpl. $\bar{3}$ ß.

S. S. Nach vorhergegangener Reinigung des Gehörganges einige Tropfen in denselben zu giesen und mit Baumwolle zurückzuhalten.

Anwend. Gegen schleimigen katarrhalischen Ohrenfluss im Uebergange zur atonischen Otorrhöe.

Vogt.

2269. *Ry.* Kali caustici sicci $\bar{3}$ j
 Aquae destill. $\bar{3}$ vij
 Extr. chamomill.
 „ conii macul. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ij
 Tinct. opii simpl. $\bar{3}$ j.

S. S. Mittelst Charpie überzulegen.

Anwend. Gegen phagedänische, kallöse, schwammige und durch allgemeine Dyskrasie bedingte Geschwürformen.

Rust.

Liquor Kali caustici; Aetzlauge.

(*Lixivium causticum vegetabile; Aetzkali-
 lösung.*)

Form u. Gabe. In Lösung zu 3—6 Tropfen,
 2—3mal. Einspritzung.

2270. *Ry.* Liqu. kali caustici
 Aquae cinnamom. vinos. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ j.

M. S. Morgens und Abends 2 Kaffeelöffel voll mit einer Tasse Milch gemischt zu geben.

Anwend. Gegen Skrofeln.

Nach Fares Methode.

Kopp.

2271. *Ry.* Liqu. kali caustici gutt. x—xx
Decoct. bacc. juniperi ℞j.

S. S. Täglich zu verbrauchen.

Anwend. Gegen Wassersucht.

Cohen.

Tinctura kalina; Kalitinktur.

(*Tinctura Salis Tartari, Tinct. Antimonii acris
s. tartarisata; scharfe Spiessglanztinktur.*)

Form u. Gabe. In einem schleimigen Vehikel oder mit destillirtem Wasser verdünnt, zu 10—30 Tropfen, 3—4mal täglich.

Man vermeide dieselben Verbindungen wie bei Kali causticum siccum.

2272. *Ry.* Tinct. kalinae ℥iij
„ guajaci ammoniat. ℥β
„ opii simpl. ℥j.

M. D. S. Täglich 4mal, umgeschüttelt, 30—40 Tropfen in Haferschleim zu nehmen.

Anwend. Gegen einen zurückbleibenden Rest des Hüftwehs nach der Cotunnischen Methode.

Hufeland.

2273. *Ry.* Tinct. kalinae ℥iv
Aquae cerasor. nigr. ℥iv
Syrup. althaeae ℥β.

M. D. S. Täglich 4mal einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Steinbeschwerden.

Marcus.

2274. *Ry.* Tinct. kalinae $\bar{3}\beta$
 „ guajaci ammoniat. $\bar{3}ij$
 „ opii simpl. $\bar{3}\beta$.

M. S. Täglich 2—3mal 10—20 Tropfen.

Tinctura antarthritica Gräffii.

Anwend. Gegen Gicht.

v. Gräfe.

2275. *Ry.* Tinct. kalinae $\bar{3}j$
 Liqu. ammon. succinici $\bar{3}\beta$.

M. S. Täglich 3mal 10—30 Tropfen zu nehmen.

Anwend. Bei allen chronischen Krankheiten mit Atonie, irregulärer Wirkung des Nervensystems und der Absonderungsorgane angewendet.

Ein Lieblingsmittel von Stahl, zwar unchemisch, doch erprobt.

Stahl.

E. Kali chloricum; chlorsaures Kali.

(*Kali muriaticum oxygenatum, Kali oxymuriaticum; oxydirt oder hyperoxygenirt - salzsaures Kali.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Lösung, zu gr. $ii\bar{j}$ — x , 2—4mal täglich. Aeusserlich zu Fomenten und zu Moxen.

Man vermeide stärkere Säuren, saure schwefelsaure Salze, Hitze.

2276. *Ry.* Kali chlorici $\bar{3}j$
 Aquae destill. $\bar{3}iv$.

S. S. Zweistündlich einen Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Magen- und Brustverschleimungen mit dem

Charakter des Erethismus, bei Schleimflebern, katarrhalisch-nervösen Leiden und Grippe. Bei perverser Absonderung des Magens.

Boeckh.

2277. *Ry.* Kali chlorici gr. xxv
Aqua destill. $\bar{3}$ iv.

S. S. Täglich 3mal 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Schwärungen im Munde nach starken Speichelflüßen.

Eyr.

2278. *Ry.* Kali chlorici gr. vj—viij
Sacchari albi $\bar{3}$ j.

M. f. pulv. Dent. tal. dos. xij.

S. Täglich 2—4 Pulver in Oblate zu nehmen.

Anwend. Gegen Schwindsucht und mehrere andere Krankheiten, wo Herabsetzung der Spannung und des fieberhaften Zustandes des Pulses zu wünschen ist.

2279. *Ry.* Kali chlorici $\bar{3}$ jß
Aqua destill. simpl. $\bar{3}$ iv.

S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen hartnäckige Rheumatismen nervöser Art, Kreuzschmerzen, Cotunnisches Hüftweh und Fothergill'schen Gesichtsschmerz.

Knod von Helmenstreitt.

2280. *Ry.* Kali chlorici $\bar{3}$ j
Aqua destill. $\bar{3}$ ij.

S. S. Kindern von 2—4 Jahren täglich 3mal 1 Esslöffel voll zu geben.

Anwend. Im Croup nach vorausgeschicktem Brechmittel.

Chaussier.

2281. R_y. Kali chlorici ʒj
Aquae destill. ʒxij.

S. S. Charpie damit zu tränken und überzuschlagen.

Anwend. Gegen schmerzlose, atonische Geschwüre, um Reaction des Gewebes zu bethätigen.

Swediaur.

F. Kali chromicum; chromsaures Kali.

(*Kali chromicum flavum; einfach gelbes chromsaures Kali.*)

Form u. Gabe. In Lösung, zu gr. $\frac{1}{12}$ —ß, 6—8mal. Papier damit getränkt als Moxen. Jacobson.

2282. R_y. Kali chromici gr. iij—iv
Aquae destill. ʒj.

S. S. Von 10 zu 10 Minuten 60—80 Tropfen bis Erbrechen folgt.

Anwend. Brechmittel. Es macht selten Durchfall.

Radius.

G. Kali citricum; citronensaures Kali

(*Kali citratum, Sal Absinthii citratum.*)

Form u. Gabe. In Lösung, zu ʒß—ʒß, 3—6mal.

Man vermeide dieselben Verbindungen wie bei Kali aceticum.

2283. R_y. Kali carbonici ʒß
Succi citri q. s.

ad perfectam saturationem. Adde
 Aquae flor. sambuci $\bar{3}\text{iv}$
 Syrupi cerasorum $\bar{3}\text{vj}$.

M. S. Stündlich 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei gastrisch-fieberhafter Affektion zarter Subjekte.

Richter.

2284. *Ry.* Kali carbonici $\bar{3}\text{ij}$
 Succi citri q. s. ad saturat.
 Syrup. acetosit. citri $\bar{3}\text{j}$
 Aquae benedict. Rulandi $\bar{3}\text{j}$
 „ flor. tiliae $\bar{3}\text{iv}$.

M. S. Alle Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen gallige Fieber.

Selle.

2285. *Ry.* Kali carbon. $\bar{3}\text{j}$
 Succi citri q. s. ad satur. ($\bar{3}\text{j}\beta$)
 Vini stibiati $\bar{3}\text{j}$
 Aquae flor. tiliae $\bar{3}\text{ij}$
 Syrup. violarum $\bar{3}\text{vj}$.

M. S. Aller $1\frac{1}{2}$ Stunden 2 Theelöffel.

Anwend. Bei Reizfiebern für ein Kind von 3–5 Jahren.

Vogt.

2286. *Ry.* Kali carbonici $\bar{3}\beta$
 Succi citri q. s. ad saturat.
 Aquae font. $\bar{3}\text{ix}$
 Syrup. rubi idaei $\bar{3}\text{j}$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Unze zu nehmen.

Anwend. Gegen Säuferwahnsinn bei allgemeiner Erregung,
 Blutandrang nach dem Gehirn, Kongestionen nach der
 Leber.

J. Frank.

H. Kali ferroso-hydrocyanicum; eisenhaltiges blausaures Kali.

(*Kalium ferro-cyanogenatum*, *Kali ferro-borussicum*; einfach *Cyaneisenkalium*, *blausaures Eisenkali*. — Gewöhnlich, aber fälschlich, *Kali zooticum*, *Kali borussicum*.)

Form u. Gabe. In Lösung, gr. xx — xxx, 3 — 4 mal.

Man vermeide Säuren, Salzbilder, Silber-, Blei-, Quecksilber- und Kupfersalze.

2287. *Ry.* Kali ferroso-hydrocyanici $\overline{3}j$
Aquae petroselini $\overline{3}vj$
„ laurocerasi $\overline{3}ij$.

M. S. Täglich 3 mal 1 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Stein- und Griesbeschwerden.

Rau.

2288. *Ry.* Kali ferroso-hydrocyan. $\overline{3}ij$
Aquae destill. $\overline{3}j$.

S. S. Erwachsenen aller 4 — 6 Stunden 30 — 45 Tropfen.

Anwend. Nach Bronchitis, Pneumonie, bei kolliquativen Schweissen, hektischem Fieber u. s. w.

Burleigh - Smart.

I. Kali hydrobromicum; bromwasserstoff
saures Kali.

(*Kalium bromatum; Bromkalium.*)

Form u. Gabe. In Lösung, zu gr. ij — iv, 3—
8mal; Salbe 3j auf 3j.

Man vermeide Salzsäure, Chlor, salpetersaures Silber-
oxyd, Quecksilbersalze, Bleioxydsalze.

2289. Ry. Aquae lactucae 3iij
Kali hydrobromici gr. xvij
Syrup. althaeae 3j.

S. S. Innerhalb 24 Stunden zu verbrauchen.

Anwend. Gegen Skrofeln, Unterdrückung des Monatsflusses
Hypertrophie der Herzventrikel.

Magendie.

2290. Ry. Kali hydrobromici ʒj
Aquae destill. 3vj.

S. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Herpes scabidus, Eczema chronicum, Impe-
tigo sparsa nützlich.

Radius.

2291. Ry. Kali hydrobromici 3ß
Axungiae 3j.

M. intime.

S. Ein halbes bis ganzes Quentchen auf die Ge-
schwulst einzureiben.

Anwend. Gegen skrofulöse Anschwellungen. Zuweilen setzt
Magendie noch 6—12 Tropfen flüssiges Brom zu.

Magendie.

2292. *Rx.* Kali hydrobromici 3j
 Axung. porci 3ß.
 M. f. unguent.

S. Täglich 2mal eine Stelle bis zur Grösse eines
 Thalers damit einzureiben.

Anwend. Gegen Kopfgrind, nebst Bromquecksilber innerlich.
 Ist eine Stelle geheilt, so reibt man die Salbe an einer an-
 dern ein. Auch bei nässenden Flechten zu gebrauchen.

Prieger.

Gegen Pädarthrocace, schwächer einmal mit Nutzen

Radius.

K. Kali hydrocyanicum; cyanwasserstoff-
 saures Kali.

(*Kalium cyanogenatum, Cyanuretum potassi-
 cum; Cyankalium, Blaustoffkalium, blausaures
 Kali*)

Form u. Gabe. In Pillen, Bissen, Lösung, zu
 gr. $\frac{1}{4}$ —j, 2—3mal. Aeusserlich zu Einreibungen, Wa-
 schungen, Salben.

Man vermeide alle Säuren, Salzbilder, Alkalien, Me-
 talloxyde, Metallsalze und Wärme.

2293. *Rx.* Kali hydrocyanici part. j
 Aquae destill. part. viij.

S. S. Kali hydrocyanicum medicinale
 Magendii.

2294. *Ry.* Kali hydrocyanici 3ß
Aqua destill. 3ß.

S. S. Täglich 2—3 mal 2—6 Tropfen in einer
schicklichen Flüssigkeit.

Anwend. In denselben Fällen wie die Blausäure angewendet
von

Magendie.

2295. *Ry.* Kali hydrocyanici medic. gutt. xv
Infusi hederæ terrestr. 3ij
Syrup. althææ 3ij.

S. S. Dreistündlich 1 Kaffeelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Brustleiden, Tuberkeln.

Magendie.

2296. *Ry.* Kali hydrocyanici gr. iv
Aqua destill. 3j.

S. S. Zur Anfeuchtung der Kompressen.

Anwend. Gegen Gesichtsschmerz, Migräne und heftigen Kopf-
schmerz äusserlich angewendet.

**Lombard. Recamier. Trousseau.
Blouquier.**

2297. *Ry.* Kali hydrocyanici gr. xij
Emuls. amygdal. amar. 3vj.

S. S. Waschwasser.

Anwend. Gegen pruriginöse Hautausschläge.

Louis.

2298. *Ry.* Kali hydrocyanici gr. ij—iv
Axungiae $\mathfrak{z}$ j.

M. exacte.

S. Soviel als eine Haselnuss beträgt einzureiben.

Anwend. Gegen Neuralgien.

Lombard.

L. Kali hydriodicum; hydriodsaures
Kali.

(*Kalium iodatum, Kali hydroiodinicum, Iodidum Kalii; Jodkalium, Jodinwasserstoffkali.*)

Form u. Gabe. In wässeriger oder weingeistiger Lösung, Pillen, zu gr. j—x, einigemal; Augenwasser, gr. v—xx auf $\mathfrak{z}\beta$; Einreibungen, $\mathfrak{z}\beta$ —j auf $\mathfrak{z}$ j; Salbe, $\mathfrak{z}$ j—iij auf $\mathfrak{z}$ j; Pflaster.

Man vermeide Säuren, Chlor, Brom, mehrere Metallsalze und Metallgefäße.

2299. *Ry.* Kali hydriodici $\mathfrak{z}$ j
Aqua destill. $\mathfrak{z}$ j.

S. S. Täglich 3mal 15, nach und nach bis 45 Tropfen zu nehmen.

Anwend. Gegen Eierstockwassersucht in Verbindung mit Einreibungen von Jodsalbe.

Elliotson.

2300. *Ry.* Kali hydriodici $\mathfrak{z}$ ij
Aqua destill. $\mathfrak{z}$ vij.

S. S. Täglich 4 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen sekundäre Syphilis, besonders Knochen- und Hautleiden mit Hypertrophie; bei Atrophie nicht brauchbar.

Wallace. Ebers.

2301. *Ry.* Kali hydrīodici gr. x
Aquae foeniculi $\bar{3}v$
„ amygdal. amar. $\bar{3}ij$
Mucil. semin. lini $\bar{3}iij$
Sacchari canar. $\bar{3}j$.

M. S. Umgeschüttelt, täglich 4 mal 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Lungenschwindsucht.

Hanke.

2302. *Ry.* Kali hydrīodici gr. xxxvj
Aquae destill. $\bar{3}j$.

S. S. 5—20 Tropfen nach und nach zu nehmen.

Anwend. Bei Kropf, kalten Drüsengeschwülsten, Skrofeln, Amenorrhöe, Knotenschwindsucht u. s. w.

Brera.

2303. *Ry.* Kali hydrīodici $\bar{3}j$
Aquae destill. $\bar{3}j$.

S. S. Dreissig Tropfen auf einmal zu nehmen.

Anwend. Gegen Amenorrhöe, Leukorrhöe und Blennorrhöe der Harnröhre.

Bell.

2304. *Ry.* Decoct. sarsaparill. ($\bar{3}j$) $\bar{3}viiij$
Kali hydrīodici $\bar{3}j$ —ij
Syrupi sacchari $\bar{3}\beta$.

M. S. Täglich 4 mal 2 Esslöffel.

Anwend. Gegen mehrere Formen sekundärer Syphilis, vorzüglich wenn Quecksilber unordentlich, in grossen Gaben u. s. w., gebraucht ist; gegen Skrofeln, Lupus, Dyskrasieen mancherlei Art, kalte Abscesse u. s. w.

Fricke.

2305. *Ry.* Kali hydrīodici gr. xv
 Aquae destill. q. s.
 Pulv. spong. ust.
 Extr. dulcamar. āā 3v
 Pulv. rad. liquirit. q. s.
 F. pil. CLXXX. Consp. Conch. praep.

S. Täglich 2—3mal 6 Stück.

Anwend. Gegen Skrofeln, Kropf.

Vogt.

2306. *Ry.* Kali hydrīodici gr. v—x
 Aquae destill. rosar. 3j.

S. S. Augewasser.

Anwend. Gegen Hornhautflecke, täglich einige Tropfen in's Auge zu lassen.

Radius.

2307. *Ry.* Kali hydrīodici 3j—ij
 Axung. porci 3j.
 M. f. unguentum.

S Zur Einreibung.

Anwend. Gegen Drüsengeschwülste, Sackwassersucht, ja selbst gegen Balggeschwülste bisweilen nützlich, gegen Kopfwassersucht und Ausschwitzungen zwischen den Hirnhäuten. Gegen Hygrome.

Radius.

- 2308 *Ry.* Kali hydrīodici 3j
 Sapon. medic. 3ß
 Aquae rosar. 3ij
 Ungt. rosati 3vj.

M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Verhärtungen.

Riecke.

2309. *Ry.* Kali hydrīodici
Natri carbon. dep. sicci āā 3β
Ungt. rosati 3iv—vj.
M. f. unguentum.

D. S. Morgens und Abends einer kleinen Bohne gross einzureiben.

Anwend. Gegen chronische Hodengeschwulst.

v. Walther.

2310. *Ry.* Kali hydrīodici 3j
Natri subcarbonici 3ij
Axung. porci 3j.
M. f. unguentum.

S. Salbe.

Anwend. Gegen Favus.

Fuchs.

2311. *Ry.* Kali hydrīodici gr. xij—xv
Ungt. hydrargyri ciner. 3β.
M. exact.; f. unguentum.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen fressende Flechten.

Blasius.

2312. *Ry.* Kali hydrīodici 3β
Axungiae 3jβ
M. exacte; f. unguentum.

S. Als Einreibung 3β, und nach 8 Tagen 3j
Morgens und Abends anzuwenden.

Anwend. Gegen Kropf, skrofulöse Drüsengeschwülste, Hoden-
anschwellung, Skirrhus der Prostata und des Uterus u. s. w.

Magendie. Ullmann.

2313. Ry. Kali hydriodici
Iodi puri āā ʒβ—j
Emplastr. saponati ʒij.
M. f. emplastrum.

S. *Pflaster.*

Anwend. Gegen syphilitische Knochenaufreibungen, Drüsen-
geschwülste u. s. w.

Ebers.

M. Kali natronato-tartaricum;
Natronweinstein.

(*Tartarus natronatus, Sal polychrestum de
Seignette, Sal Rochellense s. Rupellense,
Seignette-, Rochelle-, Polychrest-Salz.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, Lösung,
Mixtur, zu ʒβ—ʒβ, aller 2 Stunden als Reizmittel; als
Abführungsmittel ʒβ—ʒjβ auf mehrere Portionen ver-
theilt. Bisweilen zu Klystieren ʒβ—j.

Man vermeide Säuren, saure Salze und Säfte, schwefels.,
phosphors., salpeters, salzs. Salze, Tart. depur., Metall-
salze, Kalkwasser.

2314. Ry. Kali natronato-tartar. ʒj
Natri bicarbon. ʒij
Elaeosacch. foenicul. ʒβ.
M. f. pulvis.

S. Stündlich einen reichlichen Theelöffel bis zur
Wirkung.

Anwend. Ein mildes und sicheres Abführungsmittel.

Sundelin.

2315. *Ry.* Kali natronato-tartar. $\bar{\text{z}}\text{j}$
 Mannae electae $\bar{\text{z}}\text{ij}$.
 Solve in
 Aquae communis $\bar{\text{z}}\text{viii}$.
Cola. D. S. Stündlich 2 Esslöffel.
Anwend. Abführungsmittel.

Marcus.

2316. *Ry.* Kali natronato-tartar. vj
 Rad. rhei gr. vj .
 M. f. pulv. Disp. tal. dos. ij .
S. Morgens und Abends ein Pulver.
Anwend. Für Kinder, die an Atrophia mesenterica leiden.

Fordyce.

2317. *Ry.* Kali natronato-tartar. $\bar{\text{z}}\text{vj}$
 Extr. fumariae $\bar{\text{z}}\beta$
 Aquae flor. tiliae $\bar{\text{z}}\text{iv}$
 Tinct. rhei aquos. $\bar{\text{z}}\text{vj}$
 Elaeosacch. carvi $\bar{\text{z}}\text{j}\beta$.
S. S. Täglich 4mal 1 Esslöffel voll.
Anwend. Gegen Verschleimung und Neigung zur Verstopfung.

Vogt.

2318. *Ry.* Kali natronato-tartar. $\bar{\text{z}}\text{iv} - \text{vj}$
 Mannae $\bar{\text{z}}\text{j} - \text{ij}$.
 Solve in
 Aquae foeniculi $\bar{\text{z}}\text{iv}$.
 Adde
 Syrup. cort. aurant. $\bar{\text{z}}\text{j}$.
M. S. Umgeschüttelt, eine Hälfte sogleich und
 von der andern aller 2 Stunden 1 Esslöffel bis
 zur Wirkung.
Anwend. Gegen Unterleibsstockungen.

Berends.

2319. Ry. Kali natronato-tartar. $\mathfrak{D}\mathfrak{ss}$
 Sacchari lactis $\mathfrak{Z}\mathfrak{ij}$
 Syrup. simpl.
 Aquae foeniculi $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{Z}\mathfrak{j}$.

M. S. Umgeschüttelt, Theelöffelweise.

Anwend. Als Abführungsmittel für Neugeborene.

Berends.

2320. Ry. Kali natronato-tartar. $\mathfrak{Z}\mathfrak{ss}$
 „ sulphuric. $\mathfrak{Z}\mathfrak{ij}$.
 Solve in
 Infusi folior. cichorei $\mathfrak{Q}\mathfrak{j}$.
 Adde
 Oxymellis scillit. $\mathfrak{Z}\mathfrak{iv}$.

M. S. Vier Esslöffel voll Morgens binnen einer Stunde zu nehmen.

Anwend. Bei Unterleibsstockungen.

Boerhaave.

2321. Ry. Kali natronato-tartar.
 Extr. taraxaci liquidi $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{Z}\mathfrak{v}$
 Infus. flor. sambuci $\mathfrak{Z}\mathfrak{v}$.
 M. D. tal. dos. $\mathfrak{v}\mathfrak{j}$.

S. Täglich 2 mal gelind erwärmt zum Visceral-
 klystier.

Anwend. Bei Infarkten.

Vogt.

N. Kali et Natrum boracico-tartaricum; Boraxweinstein.

(*Tartarus boraxatus, Cremor Tartari Borace solubilis; weinsteinsaures Kali und boraxsaures Natrum, auflöslicher Weinsteinrahm.*)

Form u. Gabe. In Lösung, Mixturen, nicht gern in Pulver, zu $\mathfrak{zj}-\mathfrak{3\beta}$, einigemal täglich. Aeusserlich als Verbandwasser, $\mathfrak{3ij}$ auf $\mathfrak{3vj}$.

Man vermeide Weinstein-, Schwefel-, Salz-, Salpetersäure, Alkalien, Erden, salzs. Kalk, Baryt, Kali, Natrum, schwefels., salpeters., weinsteins., essigs. Kali, Metallsalze, Seifen, Schwefellebern.

2322. R $\mathfrak{y}$. Tartari boraxati $\mathfrak{3\beta}$
 „ emetici gr. j
 Aquae destill. $\mathfrak{3iv}$.

S. S. Esslöffelweise zu nehmen.

Anwend. Als herabstimmendes und gelind öffnendes Mittel, besonders bei Kongestionen und nervöser Erregung im Kopfe.

G. A. Richter.

2323. R $\mathfrak{y}$. Extr. chelidonii $\mathfrak{3j}$
 „ taraxaci liqu. $\mathfrak{3\beta}$
 Tartari boraxati $\mathfrak{3vj}$.
 Solve in
 Aquae melissae $\mathfrak{3vj}$.

M. S. Umgeschüttelt, 2 stündlich einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. In chronischen Leberleiden.

G. A. Richter.

2324. *Ry.* Tartari boraxati $\bar{3}j - j\beta$.

Solve in

Aquae foenicul. $\bar{3}iv$.

Adde

Oxymell. simpl. $\bar{3}j$.

M. D. S. Zweistündlich eine halbe Tasse zu nehmen bis zur Wirkung.

Anwend. Als Abführungsmittel. }

G. A. Richter.

2325. *Ry.* Tartari boraxati $\bar{3}ij - vj$

Aquae petroselini $\bar{3}viij$

Oxymell. scill. $\bar{3}j$

Spirit. muriatico-aether. $\bar{3}ij$.

S. S. Zweistündlich 1 Esslöffel.

Anwend. In der Wassersucht.

Berends.

2326. *Ry.* Tartari boraxati $\bar{3}j$.

Solve in

Aquae menthae crisp. $\bar{3}viij$.

Adde

Spirit. nitrico-aether. $\bar{3}ij$

Oxymell. scill. $\bar{3}j$.

M. S. Umgeschüttelt, aller 2 Stunden 2 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. In der Wassersucht.

Selig.

2327. *Ry.* Tartari boraxati $\bar{3}\beta$

Roob ebuli $\bar{3}ij$

Aquae baccar. juniperi $\bar{3}iij$

Syrup. rhamni cathartici

„ violarum āā 3β.

M.S. Esslöffelweise zu nehmen.

Anwend. In dem letzten Zeitraume der Wassersucht bei heftigem Fieber und Brandblasen an den Füßen und beim sparsamen Abgange eines dunkelrothen Urins.

Fr. Wendt.

2328. *Ry.* Crem. tartari solub. 3β

Rad. scillae 3β

Magnes. albae

Sacchari albi āā 3j.

M. f. pulvis.

D. S. Zweistündlich eine Messerspitze voll in einer Tasse Pfeffermünzthee genommen.

Pulvis diurecticus s. hydragogus.

Anwend. Bei akuter Wassersucht, vorzüglich Hydrops anasarca oder auch Bauchwassersucht sehr nützlich befunden von

Cerutti.

2329. *Ry.* Rad. scillae

Herb. digital. purp. āā gr. j

Olei juniperi gutt. ij

Tartari boraxati

Rad. liquirit. āā 3j

Cort. cinnamom. gr. ij.

M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.

S. Täglich 2—3mal ein Pulver.

Anwend. In der Wassersucht.

Hufeland.

2330. *Ry.* Tartari boraxati ʒij
Aquaе destill. ʒvj .

S. S. Zum Verband.

Anwend. Als Palliativmittel bei Krebsgeschwüren.

Rust.

O. Kali nitricum; salpetersaures Kali.

(*Nitrum depuratum; gereinigter Salpeter.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Lösung, Emulsion, zu gr. v—xx, zweistündlich; äusserlich Mund-, Gurgelwasser, Fomentation, Waschung, Klystier, Streupulver.

Man vermeide starke Säuren, schwefelsaure Salze, Weinsteinsäure, Baryta muriatica.

2331. *Ry.* Kali nitrici ʒj
Tartari depur. ʒvj
Magnes. carbon. ʒij
Sacchari albi ʒβ .
M. f. pulvis.

S. Täglich 2—3mal einen Theelöffel voll.

Pulvis temperans.

Anwend. Bei Stockungen in dem Pfortadersystem mit Nervenverstimmung, trägem Stuhlgange.

Radius.

2332. *Ry.* Kali nitrici ʒj—jβ
Gummi mimos. ʒij

Sacchari albi $\mathfrak{zj}$.
M. f. pulvis.

S. Täglich 3—4 mal einen Theelöffel voll mit Hafer Schleim zu nehmen.

Anwend. Beruhigendes und einhüllendes Pulver in fieberhaften Krankheiten mit Reizung der Darmschleimhaut.

Bichter.

2333. *Ry.* Kali nitrici depur.
Tartari depur.
Sacchari albi $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}\beta$.
M. f. pulv. Disp. tal. dos. xij .

D. S. Aller 1—2 Stunden ein Pulver mit Hafer Schleim zu nehmen.

Anwend. Bei Erregungen des Blut- und Gallensystems.

Rust.

2334. *Ry.* Kali nitrici depur.
„ sulphurici depur. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}ij$
Tartari depur. $\mathfrak{z}j$.
M. f. pulvis.

D. S. Aller 2—3 Stunden 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Pulvis antiphlogisticus Ph. Paup.

Anwend. Kühlendes, auf den Unterleib wirkendes Pulver bei Entzündungen und Fiebern.

Hufeland.

2335. *Ry.* Ka nitrici
„ sulphurici

Conch. praep. āā ʒiij.
M. f. pulvis.

S. *Aller 2 Stunden 1/2—1 Theelöffel voll.*

Anwend. Bei Säure im Magen mit Gefässaufregung.

Unzer.

2336. R_y. Kali nitrici ʒβ
Sulphur. antim. aurat. gr. xij.
M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

D. S. *Täglich 1—2 Pulver.*

Anwend. Gegen chronische Heiserkeit.

Burchard.

2337. R_y. Nitri depur. gr. xv
Cort. cinnamom. gr. v
Opⁱi puri gr. j
Rad. ipecacuanhae gr. β.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. viij.

S. *Alle Stunden 1 Pulver zu nehmen.*

Anwend. Bei Blutspeien ⁱⁿ it vorwaltender krankhafter Sensi-
bilität.

Fr Jahn.

2338. R_y. Kali nitrici ʒij
Decocti hordei ℥iij
Mellis optimi ʒj.

M. S. *Zum täglichen Verbrauche.*

Anwend. Ein sehr empfehlenswerthes Getränk in den meisten
Entzündungskrankheiten.

Brera.

2339. *Ry.* Hordei crudi $\bar{3}j$.
 Coque cum
 Aquae s. q. ad crepatur. granor.
 Colat. $\&j$ adde
 Kali nitrici $\bar{3}j$
 Oxymell. simpl. $\bar{3}\beta$.

S. Stündlich bis 2stündlich eine halbe Tasse.

Potio antiphlogistica P. Frankii.

Anwend. Gegen entzündliche Zustände überhaupt.

P. Frank.

2340. *Ry.* Emuls. amygdal. amar. $\&j$
 Nitri depur. $\bar{3}ij$
 Oxymell. scill. $\bar{3}j$.

M. S. Allmählig zu verbrauchen.

Anwend. Bei entzündlich-katarrhalischen Zuständen, bei Pleuritis, Pneumonia, wenn auch die Entzündung noch nicht völlig gehoben ist, oder wenn man sieht, dass sich die Natur bestrebt, eine Krise durch den Harn zu bilden.

Brera.

2341. *Ry.* Infusi liquirit.
 Decocti althaeae $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$
 Kali nitrici $\bar{3}j$
 Oxymell. simpl. $\bar{3}\beta$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Kinderlöffel.

Anwend. Gegen Lungenentzündung zweijähriger Kinder.
 Nach der Resolution statt des Salpeters Ligu. ammon.
 acet. $\bar{3}j$.

Brosius nach Gölis.

2342. *Ry.* Decocti rad. althaeae $\bar{3}j\beta$
 Kali nitrici gr. xij

Syrup. althaeae $\mathfrak{z}\beta$.

S. S. *Aller 2 Stunden 1 Theelöffel.*

Anwend. Gegen entzündliche Krankheiten bei Säuglingen.

Tourtual.

2343. R $\mathfrak{x}$. Decocti cap. papav. c. semin. $\mathfrak{z}\text{ij}\beta$
 Olei amygdal. dulc. rec. expr. $\mathfrak{z}\text{ij}—\text{ij}$
 Gummi arabici q. s.
 F. emulsio, cui adde
 Kali nitrici gr. xv—xvj
 Syrup. opiat $\mathfrak{z}\beta$.

S. S. *Ein- bis zweistündlich 1 Kinderlöffel voll.*

Anwend. Gegen Enteritis, Peritonitis und andere Entzündungen der Unterleibsorgane, zur Linderung der Schmerzen und des Fiebers.

Tourtual.

2344. R $\mathfrak{x}$. Kali nitrici dep. $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 Solve in
 Decocti rad. gramin. ($\mathfrak{z}\beta$) $\mathfrak{z}\text{vj}$.
 Adde
 Oxymell. simpl. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. D. S. *Stündlich 1 Esslöffel.*

Anwend. Bei Erysipelaceen u. s. w.

Schönlein.

2345. R $\mathfrak{x}$. Semin. papav. alb. $\mathfrak{z}\beta$
 Amygdal. dulc. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Aquae cerasor. nigr.
 „ simpl. āā $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Nitri depur. $\mathfrak{z}\text{j}—\text{ij}$
 Syrup. althaeae $\mathfrak{z}\beta$.
 M. f. emulsio.

S. *Alle Stunden 1—2 Esslöffel voll.*

Anwend. In entzündlichen Krankheiten nach vorausgeschickten Blutentleerungen, als kühlendes, beruhigendes Mittel.

Schwartz.

2346. *Ry.* Kali nitrici $\mathfrak{z}\text{j}$
 Decocti hordei $\mathfrak{z}\text{viii}$
 Syrup. moror. $\mathfrak{z}\text{j}$.

S. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Gegen Halsentzündung beim Scharlach, wenn eine tiefe Röthe ohne Geschwüre vorhanden ist.

Wendt.

2347. *Ry.* Decocti hordei $\mathfrak{z}\text{x}$
 Kali nitrici $\mathfrak{z}\text{j}$
 Mellis $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. S. Zum Klystier.

Anwend. Bei entzündlichen Krankheiten, um abzuleiten.

P. Frank.

2348. *Ry.* Kali nitrici crudi $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Ammon. muriat. $\mathfrak{z}\beta$
 Aquae fontan. frigid. $\mathfrak{z}\text{iv}$
 Aceti vini $\mathfrak{z}\text{j}$.

S S. Mehrfach zusammengelegte Leinwandstücke damit zu befeuchten, kalt aufzulegen und aller 10—15 Minuten zu erneuern.

Fomentatio frigida Schmuckeri.

Anwend. Bei Hirnerschütterungen, heftigen Kongestionen nach dem Kopfe, Gehirnentzündungen u. s. w.

Schmucker.

2349. *Ry.* Nitri crudi $\mathfrak{z}\text{j}$
 Ammon. muriat. $\mathfrak{z}\beta$.
M. terendo.

S. In eine Blase zu thun und kaltes Wasser dazu

zu giessen oder mit zerstoßenem Eis zu mischen und überzuschlagen.

Anwend. Fomentation, besonders bei eingeklemmten Brüchen.

van Mons.

2350. *Ry.* Kali nitrici dep. $\mathfrak{z}\beta$
Natri muriat. sicci $\mathfrak{z}\text{j}$
Sacchari albi $\mathfrak{z}\text{ij}$.
M. f. pulvis.

S. Zum Bestreuen der brandigen Stellen.

Anwend. Beim unmittelbaren Brande von Zerquetschung der Theile.

Vogt.

2351. *Ry.* Nitri purissimi $\mathfrak{z}\text{ij}$
Acid. sulphurici parum diluti $\mathfrak{z}\text{j}\beta$.

D. S. In einer Glasflasche oder einer Schale unter das Bett zu stellen.

Suffimentum Smythii.

Anwend. Bei contagiösen Krankheiten.

Man muss den Salpeter nicht zu klar stossen, damit ihn die Schwefelsäure nicht zu schnell auflöse und die Decomposition langsamer vor sich gehe.

P. Kali sulphuratum; Schwefelkali.

(*Hepar Sulphuris salinum s. alcalinum, Sapo Sulphuris; Kalischwefelleber, Schwefelseife.*)

Form u. Gabe. In Pillen, Bissen, Lattwerge, Lösung, Pulver (unzweckmässig), zu gr. v—x, 3—6mal; bei Vergiftungen $\mathfrak{z}$ j—iv in kurzen Zwischenräumen. Kali sulphuratum pro balneo, $\mathfrak{z}$ ij—iv auf ein Bad; Waschung, $\mathfrak{z}$ j—ij auf $\mathfrak{z}$ iv.

Man vermeide Säuren, saure Salze und Säfte, Metalle und Metallpräparate, Aqua commun., Metallgefässe.

2352. Ry. Gummi ammoniaci
Kali sulphurati
Extr. taraxaci $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}$ j
Sapon. med.
Pulv. rad. rhei $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\beta$
Extr. thebaic. gr. iij.
M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop. D. ad vitrum.

S. Aller 4 Stunden 5 Stück.

Anwend. Gegen Bleikolik, nachdem bereits die hartnäckige Verstopfung gehoben ist.

Radius.

2353. Ry. Kali sulphurati $\mathfrak{z}$ j
Rad. althaeae pulv. $\mathfrak{z}$ j
Extr. liquirit. $\mathfrak{z}$ ij.
M. f. pil. lx. Consp. rad. irid. flor. D. ad vitrum.

S. Kindern von 1—2 Jahren aller 1—2 Stunden eine Pille in Pflaumenmus.

Anwend. Im Croup, nach geschehenen Blutentleerungen und angewendetem Kalomel.

Kopp.

2354. *Ry.* Kali sulphurati
 Extr. gentian. āā 3j
 Pulv. herb. aconiti
 „ cort. cinnamom. āā 3ß.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. cinnam. D. in vitro.
S. *Täglich 3 mal 5 Pillen.*
Anwend. Gegen chronische rheumatische und gichtische Beschwerden.

Richter.

2355. *Ry.* Kali sulphurati
 Ferri pulverati
 Extr. quassiae āā gr. vj.
 M. f. bolus. Consp. rad. irid. flor. Dent. tal. dos.
 vj in vitro.
S. *Morgens und Abends 1 Bissen.*
Anwend. Gegen Drüsenverhärtungen, Kropf.

Kortum. Jahn.

2356. *Ry.* Ferri pulverati gr. iij
 Kali sulphurati gr. vj
 Extr. lign. quassiae gr. x
 Carbon. spong. q. s.
 ut f. bolus. Consp. rad. irid. flor. Disp. tal. iv.
 D. in vitro.
S. *Morgens und Abends 1 Stück.*
Anwend. Bei Drüsenverhärtungen.

Phoebus.

2357. *Ry.* Kali sulphurati 3j
 Mellis despumati 3v
 M. f. electuar.
D. S. *Aller 2 Stunden einen halben Theelöffel voll zu nehmen.*
Anwend. Gegen Croup, Vergiftungen mit Biei u. s. w.

Schubarth.

2358. *Ry.* Sacchari albi pulv. $\text{℥ij}\beta$.

Solve leni calore in
Aqua destill. ℥vj .

Adde

Kali sulphurati $\text{℥}\beta\text{—j}$.

D. S. Aller 2 Stunden einen Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei Croup für Kinder von 1—4 Jahren.

Chaussier.

2359. *Ry.* Olei cacao ℥ij .

Solve leni calore in
Olei amygdal. dulc. $\text{℥}\beta$.

Adde terendo

Kali sulphurati gr. x—xviij

Sacchari albi pulv. ℥iij .

M. D. S. Umgerührt theelöffelweise.

Anwend. In gleichen Fällen.

Chaussier.

2360. *Ry.* Kermet. miner. $\text{℥}\beta$

Kali sulphurati ℥j .

Misce cum

Syrup. senegae ℥ij

Liqu. ammon. anis. ℥j .

S. Aller 2 Stunden umgeschüttelt 1 Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Croup, wenn Schwefelleber überhaupt angezeigt ist.

v. Magen.

2361. *Ry.* Kali sulphurati gr. xx

Aqua destillat. simpl. ℥j

Syrup. cinnamomi ℥ij.

S. S. *Täglich auf dreimal zu verbrauchen.*

Anwend. Gegen Quecksilberkrankheit oder Verbindung derselben mit Lustseuche. Nebenbei Schwefelleberbäder.

Deondi.

2362. R_x. Kali sulphurati ℥ß
Aquae menth. piper. ℥ij
Kali carbonici aciduli ʒß
Extr. cardui bened. ℥jß
Carbon. tiliae pulv. ℥iij
Syrup. papaveris albi ℥ij.

S. S. *Aller 4 Stunden 1 Esslöffel.*

Anwend. Gegen Pneumophthisis.

Stegemann.

2363. R_x. Kali sulphurati ℥iij
Sapon. med. ℥j
Aquae calcar. ustae ℥viiij
Spir. vini rectific. ℥ij.

M. S. *Die Grindstellen früh und Abends damit zu waschen.*

Anwend. Gegen feuchten Grind.

Barlow.

2364. R_x. Kali sulphurati ℥iv
Aquae font. ℥jß.
Solutioni adde
Acid. sulphur. ℥ß.

S. *Früh und Abends die Ausschlagsstellen damit zu waschen.*

Anwend. Gegen Krätze.

Dupuytren.

2365. *Ry.* Kali sulphurati $\overline{3}j$
Aquae destillat. $\overline{3}viiij-xij$.

S. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Gegen Nachtripper.

v. Wedekind.

2366. *Ry.* Kali sulphurati pro balneo $\overline{3}j-iv$.
D. in sextuplo in lagenis probe clausis.

S. Einen Theil zu einem Bade.

Anwend. Gegen Krätze und andere chronische Ausschläge,
Merkurialkrankheit u. s. w.

Man löset zuvor die Schwefelleber in einem Topfe mit Wasser auf und schüttet sie zu dem Bade. Soll sich Schwefelwasserstoffgas entbinden, so mischt man dem Bade Acid. sulphuric. dilut. $\overline{3}\beta-j$ zu.

2367. *Ry.* Kali sulphurati
Natri carbonici $\overline{aa} \overline{3}iij$
Adipis suilli $\overline{3}iij$.
M. exacte; f. unguent.

S. Täglich eine kleine Quantität auf den abgeschorenen und durch Kataplasmen von den Krusten befreiten Kopf einzureiben und dann mit Fliesspapier zu bedecken.

Anwend. Gegen Tinea capitis.

Hôp. St. Louis.

Q. Kali sulphuricum; schwefelsaures Kali.

(*Tartarus vitriolatus*, *Kali vitriolatum*, *Arca-num duplicatum*; *vitriolisirter Weinstein*.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Latt-
werge, Lösung, zu $\mathfrak{z}\beta - \mathfrak{z}ij$, als auflösendes und kühl-
lendes Mittel. Als Abführungsmittel, wozu es sich nicht
sehr eignet, zu $\mathfrak{z}\beta - j$, auf einige Portionen vertheilt.

Man vermeide Weinsteinsäure, Kalkwasser, Kalk-, Ba-
ryt-, Quecksilber-, Silber- und Bleisalze, Gerbestoff.

2368. Rx. Kali sulphurici $\mathfrak{z}ij$
Pulv. rad. jalapae $\mathfrak{z}j$
Olei anisi aether. gutt. j.
M. f. pulv. Div. in part. ij aequal.

D. S. Binnen einer Stunde beide Pulver mit Was-
ser zu nehmen.

Anwend. Als Abführungsmittel.

Vogel.

2369. Rx. Kali sulphurici $\mathfrak{z}\beta$
Tartari depur. $\mathfrak{z}\beta$
Sacchari albi $\mathfrak{z}j$.
M. f. pulv. Disp. tal. dos. vj.

D. S. Aller 3 Stunden ein Pulver zu nehmen.

Anwend. Zu gleichem Zwecke.

Marcus.

2370. Rx. Kali sulphurici $\mathfrak{z}\beta$
Sacchari albi $\mathfrak{z}ij$.
M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. Aller 2 Stunden ein Pulver zu nehmen.

Anwend. Bei stillenden Frauen, um die Milch abzuleiten.

Brera.

2371. *Ry.* Kali sulphurici
 Tartari depur. $\bar{a}\bar{a}$ 3ij
 Elaeosacchari flaved. citri 3j
 Sacchari albi 3v .
M. f. pulv. D. ad scatulam.

S. Einen Theelöffel voll in einem Glase Selterwasser zu nehmen.

Anwend. Bei Kongestionen nach Kopf und Brust.

Vogt.

2372. *Ry.* Kali sulphurici
 Tartari depur. $\bar{a}\bar{a}$ 3ij
 Magnes. carbon. 3j
 Elaeosacch. foeniculi 3iij .
M. f. pulv. D. in vitro.

S. Dreistündlich einen Theelöffel voll.

Anwend. In gleichen Fällen. — Es braust schwach auf.

G. A. Richter.

2373. *Ry.* Gummi ammoniac.
 Kali sulphurici $\bar{a}\bar{a}$ 3ij
 Extr. taraxaci l. Pulp. tamarind. q. s.
F. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Täglich 3—4mal 14—15 Stück.

Anwend. Gegen Gelbsucht und überhaupt als auflösendes und eröffnendes Mittel.

Vogler.

2374. *Ry.* Rad. rhei
 Kali sulphurici $\bar{a}\bar{a}$ 3ß

Pulp. tamarind. q. s.
M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Aller 2 Stunden 15—20 Stück.

Pilulae eccoproticae Vogleri.

Anwend. Gelindes Eröffnungsmittel bei Gelbsucht, Hämorrhoiden, Gicht, Kopfweh u. s. w.

Vogler.

2375. *Ry.* Kali sulphurici $\bar{\text{z}}\beta$
Aquae commun. $\bar{\text{z}}\text{viii}$
Extr. taraxaci liquid. $\bar{\text{z}}\text{j}$.

S. S. Zweistündlich 1½ Esslöffel.

Anwend. In gleichen Fällen.

v. Siebold.

2376. *Ry.* Kali sulphurici $\bar{\text{z}}\text{vj}$
Infusi herb. digital. purp. ($\bar{\text{z}}\beta$) $\bar{\text{z}}\text{vj}$
Mellis despum. $\bar{\text{z}}\text{vj}$.

S. M. S. Zweistündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Bei Phlegmasia alba dolens.

Martin.

R. Kali sulphuricum acidulum; saures
schwefelsaures Kali.

(*Tartarus vitriolatus acidus.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Lösung, zu $\mathfrak{zj}$ — $\mathfrak{iiij}$,
drei- bis viermal täglich. Aeusserlich zu Riech- und
Räucherpulver.

Man vermeide dieselben Verbindungen wie bei dem
vorigen.

2377. R. Kali sulphurici aciduli $\mathfrak{z}\beta$
Aquae rubi idaei $\mathfrak{z}\mathfrak{iv}$
Syrup. rubi idaei $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

S. S. Halb-, 1—3stündlich einen Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Blutflüsse, besonders des Uterus, der Lungen,
namentlich wenn sie mit Verstopfung gepaart sind.

Radius.

2378. R. Kali sulphurici aciduli $\mathfrak{z}\beta$
Aquae rubi idaei $\mathfrak{z}\mathfrak{viiij}$
Spir. vini $\mathfrak{z}\beta$
Syrup. althaeae $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\beta$.

S. M. S. Stündlich einen Esslöffel voll.

Anwend. In septischen Fiebern, Blutbrechen, Mutterblutfluss
u. s. w.

2379. R. Kali sulphurici aciduli $\mathfrak{z}\mathfrak{xviiij}$
Plumbi acetici $\mathfrak{z}\mathfrak{v}$

Mangan. oxyd. nativ. ℥_{xxiv} .
 M. f. pulv. subtiliss.

Die Mittel werden einzeln gepulvert, gemischt und in flache Schalen vertheilt.

Pulvis ad suffiendum Kleistii.

Anwend. Zum Räuchern.

S. Kali tartaricum; weinsteinsaures Kali.

(*Tartarus tartarisatus*, *Tartarus solubilis*,
Sal vegetabilis; auflöslicher Weinstein.)

Form u. Gabe. In Lösung, Pillen, Bissen, Pulver mit sehr trockenen Pflanzentheilen, weil es leicht zerfließt, zu $\mathfrak{z}\beta$ —ij, mehrmals; um abzuführen $\text{℥}\beta$ —iβ, in mehrere Portionen vertheilt.

Man vermeide Säuren, säuerliche Früchte und Säfte, schwefels., phosphors., salpeters., salzs. Salze, Metallsalze, Kalkwasser.

2380. R $\mathfrak{y}$. Sulphur. praecip. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Rad. rhei ℥j
 Flaved. cort. aurant.
 Magnes. carbon. āā $\text{℥j}\beta$
 Kali tartarici
 Elaeosacch. foeniculi āā ℥iij .
 M. f. pulv. D. in vitro.

S. Täglich 3mal einen Theelöffel.

Solamen hypochondriacorum Kleinii

Anwend. Gegen Stockungen im Pfortadersysteme, Verschleimung u. s. w.

Klein.

2381. *Ry.* Kali tartarici
Rad. rhei
Flaved. cort. aurant. āā ʒij.
M. f. pulvis.

S. Theelöffelweise.

Pulvis digestivus s. leniens antihypochondriacus Kleinii.

Anwend. In gleichen Fällen.

Klein. Baldinger.

2382. *Ry.* Kali tartarici ʒj
Extr. taraxaci l. saponar. l. gramin. ʒß
Aquae mellissae ʒvj.

S. S. Morgens und Abends 2 Esslöffel.

Anwend. Bei allen Formen des Hämorrhoidalübel, welche nicht von allgemeiner sthenischer Diathesis und nicht von blosser Lokalschwäche der Hämorrhoidalgefäße herrühren; vorzüglich aber in allen Fällen, wo hypochondrische Beschwerden, gelbe Gesichtsfarbe u. s. w, auf Stockungen in der Leber und Pfortader hindeuten.

Rau.

2383. *Ry.* Tartari tartarisati
Extr. graminis
Mellis albi āā ʒß
Aquae destill. ʒiij.

S. S. Aller Stunden 1—2 Esslöffel.

Anwend. Bei Melancholie und Manie von Unterleibsstockungen.

Mutzel.

2384. *Ry.* Kali tartarici ʒjß
Aquae foeniculi ʒij

Vini stibiatī ʒj
Syrup. mannae ʒß.

S. S. *Zweistündlich einen Theelöffel.*

Anwend. Als gelind eröffnendes Mittel für Kinder von 1—2 Jahren; auch wohl als eigentlich abführendes für jüngere.

Osann.

T. Kali tartaricum acidulum; saures weinsteinsaures Kali.

(*Tartarus depuratus, Crystalli Tartari, Cremor Tartari; gereinigter Weinstein, Weinsteinkrystalle, Weinsteinrahm.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Lattwerge, Lösung, Schüttelmixtur, zu ʒß—j, als Digestivmittel und Diureticum; als gelindes Abführungsmittel zu ʒß—ij. Aeusserlich zu Zahnpulvern, Augenpulver.

Man vermeide reine und kohlensaure Alkalien und Erden, Borax, Seifen, Schwefellebern.

2385. R_y. Tartari depurat. ʒj
Kali nitrici ʒj
Cinnabar. factitiae gr. xxiv.
M. f. pulv. Div. in part. xij aequal.
S. *Aller 2—3 Stunden ein Pulver.*

Anwend. Gegen Säuferwahnsinn, um den gereizten Zustand des gesammten Nervensystems zu beschwichtigen.

Jos. Frank.

2386. R_y. Cremor. tartari
Flor. sulphur. lot. āā ʒij

Sacchari albi ℥iij .
M. f. pulvis.

D. S. Früh und Abends einen Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Hämorrhoiden.

2387. *Ry.* Kali tartar. acidul. ℥β
Resin. guajaci nativ. ℥ij .
M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. Vorm Schlafengehen ein Pulver zu nehmen und so mehrere Tage nach einander fortzufahren.

Anwend. Bei älteren Personen mit apoplektischer Anlage und Kongestionen nach dem Kopfe.

Kämpf. Hufeland.

2388. *Ry.* Tartar. depur. ℥ij
Vini stibiat
Aceti scill. āā ℥β
Aquae petroselini ℥jβ
Syrup. senegae ℥vj .

M. S. Aller 2 Stunden einen Theelöffel.

Anwend. Gegen Wassersucht nach Scharlach.

Vogt.

2389. *Ry.* Tartar. depur. ℥j
Rad. zingib. pulv.
Conserv. rosar. āā ℥j
Syrup. cort. aurant. q. s.
ut f. electuar.

S. Theelöffelweise, umgerührt.

Anwend. Bei Wassersucht.

Monro.

2390. *Ry.* Tartari depur. $\bar{3}j$
 Semin. foenicul. pulv. $\bar{3}ij$
 Pulp. tamarind. $\bar{3}ij$
 Syrup. rubi idaei q. s.
 ut f. electuar.

S. Umgerührt, stündlich 2 Theelöffel.

Anwend. Kühnendes und wohlschmeckendes Abführungsmittel.

2391. *Ry.* Pulp. prunor. $\bar{3}j\beta$
 Crem. tartari $\bar{3}\beta$
 Pulv. fol. sennae $\bar{3}j\beta$
 Oxymell. simpl. $\bar{3}\beta$.
 M. f. electuar.

D. S. Theelöffelweise bis zur Wirkung.

Anwend. Abführungsmittel, besonders für Unbemittelte.

2392. *Ry.* Tartari depur. $\bar{3}\beta$
 Sacchari albiss. $\bar{3}ij$
 Aquae commun. $\mathcal{Q}ij$.

M. D. S. Umgeschüttelt, mehrmals täglich zu halben Tassen (als Digestivmittel) oder zu 2 Tassen (als gelindes Abführungsmittel.)

2393. *Ry.* Cremor. tartari
 Sacchari albi
 Oss. sepiae $\bar{a}\bar{a}$ gr. xv.
 M. f. pulv. subtiliss.

D. S. Mittelst eines Federkieses ein wenig davon in's Auge zu blasen oder mit einem Haarpinsel auf die Cornea zu bringen.

Anwend. Gegen Hornhautflecke.

Rosas.

2394. R_y. Boli albae
Tartari depur.
Sacchari albi āā 3j.
M. f. pulv. subtiliss.

S. Augenpulver, 2—3mal täglich zu appliciren.

Anwend. Bei adynamischen Hornhauttrübungen.

Baldinger.

2395. R_y. Tartari depur.
Conch. ppt. āā 3ß
Lapid. pumicis 3ij
Pulv. myrrhae
„ rad. irid. flor.
„ coccionell. āā 3j.
Mixtis adde
Olei caryophyllor. gr. viijß
Mellis despum. 3ivß.
F. electuarium.

S. Zahnlattwerge.

Electuarium dentifricium Hamburgense.

Anwend. Gegen schwammiges, skorbutisches Zahnfleisch.

Fricke.

Kino. Kino.

(Gummi Kino s. Gambiense; Kinogummi. Von
Pterocarpus Senegalensis Hook.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Latt-
werge, Lösung, zu ʒß—j, mehrmals täglich. Tinktur,
20—80 Tropfen, 2—3mal. Aeusserlich zu Streupulver.

Man vermeide Säuren und Metallsalze.

2396. *Ry.* Kino

Sacchari lactis āā ʒß—j.

M. f. pulv. Dent. tal. dos. xij.

S. *Aller 2—3 Stunden 1 Pulver.*

Anwend. Bei Pyrosis, Schmerz in der Magengegend, Beängstigung, Herzklopfen, Aufstossen, Entleerung einer reichlichen Menge Flüssigkeit.

Radius.

2397. *Ry.* Opii gr. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$

Kino gr. viij—xij

Cassiae cinnamom. gr. ij—iij.

M. f. pulv. Disp. tal. dos. iv. D. in charta cerata.

S. *Stündlich ein Pulver.*

Anwend. Bei innerlichen Blutungen.

Engl. Hospit.

2398. *Ry.* Kino ʒij

Fol. digital. purp. ʒj.

M. f. pulv. Div. in x part. aequal.

S. *Aller 1 $\frac{1}{2}$ Stunden 1 Pulver zu nehmen.*

Pulveres deprimentes et adstringentes Brerae.

Anwend. Bei aktiven Blutflüssen des Fruchthälters.

Brera.

2399. *Ry.* Kino subtiliss. pulv. ʒj

Alumin. crudi ʒij.

Solvantur in suff. quant. aquae font. Solutio ad cuticulam evaporata ad crystallisandum reponatur.

S. *Gr. vj—xx mit Zucker zu geben.*

Pulvis stypticus.

Anwend. Bei Hämorrhagieen und kolliquativen Diarrhöen.

Reil.

2400. *Ry.* Kino gr. vj
 Terrae catechu gr. v
 Alumin. pulv. ʒß
 Conserv. rosar. q. s. ut f. bolus.

S. Täglich 3—4mal einen solchen Bissen zu nehmen und einen Rosenaufguss nachzutrinken.

Anwend. Bei atonischer Blennorrhöe, passivem Blutspeien, übermässig fließenden Hämorrhoiden, Lienterie, Durchfall u. s. w.

Brera.

2401. *Ry.* Kino ʒij.
 Coque cum
 Aquae font. ʒviij ad colat. ʒiv.

S. Aller 2—3 Stunden 1/2—1 Esslöffel.

Anwend. Gegen asthenische Bauchflüsse Erwachsener und Kinder.

Friedländer in Brody.

2402. *Ry.* Kino pulv. ʒjß.
 Tere cum
 Syrup. simpl. ʒß
 Aquae commun. ʒiiijß.
 Adde
 Spirit. sulphurico-aether. ʒß
 Tinct. cinnamom. ʒj.

M. D. S. Umgeschüttelt, stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Bei Blutflüssen.

Phoebus.

2403. *Ry.* Kino ʒj—ij
 Alumin. gr. xx—xxx.
 Tere cum
 Aquae fervid. ʒij.
 Filtra.

S. Zum Einspritzen.

Anwend. Gegen chronischen Tripper.

Swedjaur.

2404. *Ry.* Kino 3ß
 Gummi mimosae 3j.
 M. f. pulvis.

S. Zum Einstreuen.

Anwend. Styptisches Pulver bei Blutegelstichen.

Lentin.

Kreosotum. Kreosot.

Form u. Gabe. In Pillen, Bissen, Emulsion, Pulver, 1—2 Tropfen, 2—3mal. Aeusserlich rein, in Wasser oder Weingeist gelöst, Salbe, Einathmung, wozu man sich weithalsiger Gläser bedient und 6—10 Tropfen auf Baumwolle giesst, oder einen Bogen Papier damit bestrichen in der Nähe des Kranken aufhängt, bei Lungensucht. *Ebers.*

Man vermeide Salpetersäure, concentrirte Schwefelsäure, Chlor, Brom, kaustische Alkalien und Erden, Quecksilberoxyd, salpetersaures und essigsaures Quecksilber, salpetersaures Silber, salzsaures Gold, Cuprum acet. und sulphurico-ammoniat., Harze, Eiweiss.

2405. *Ry.* Kreosoti 3ß
 Rad. althaeae 3jß
 Mucil. gumm. mimos. q. s.
 M. f. pil. lx. Consp. cinnam.

S. Täglich 2—3mal 2—4 Stück.

Anwend. Gegen Verschwärungen innerer Theile, Lungensucht, wo es jedoch mit Vorsicht anzuwenden.

2406. *Ry.* Kreosoti 3j
 Pulv. rad. althaeae
 Succ. liquirit. aa 3jß

Aquae destillat. q. s.
F. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Früh und Abends 2 Pillen.

Anwend. Gegen tuberkulöse Lungensucht und Kehlkopfschwindsucht.

Wolff, der es jedoch widerrathet.

2407. *Ry.* Kreosoti gutt. ij—iv
Mucilag. gumm. mimos. $\bar{3}j$
Decoct. salep l. Emuls. papav. albi conc. $\bar{3}v$
Sacchari albi $\bar{3}j$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen eiterige Lungenschwindsucht mit kolliquativen Schweissen und Durchfällen mit auffallendem Nutzen. Zuweilen setzt Ebers etwas Opiumtinktur zu.

Ebers.

2408. *Ry.* Plumbi acetici
Opii puri $\bar{a}\bar{a}$ gr. vj
Kreosoti $\bar{3}j$
Succi liquiritiae $\bar{3}ij$.
M. f. pil. lx. Consp. liquirit.

S. Täglich 3mal 5 Stück.

Anwend. Im Kolliquationszeitraume der Lungenschwindsucht.

Fuchs.

2409. *Ry.* Kreosoti $\bar{3}j$
Succi liquiritiae
Gummi galbani $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$
Pulv. rad. althaeae $\bar{3}ij$.
M. f. pil. cxx. Consp. lycop.

S. Täglich 4mal 6 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei Lungensucht.

Reich.

2410. *Ry.* Kreosoti gutt. vj
 Sacchari albi
 Pulv. rad. althaeae $\bar{\text{aa}}$ $\bar{\text{3j}}$.
M. f. pulv. Div. in iij part. aequal.

S. Täglich 2—3mal 1 Pulver.

Anwend. Gegen Blutspeien, Lungensucht.

2411. *Ry.* Kreosoti
 Succ. liquirit. $\bar{\text{aa}}$ $\bar{\text{3j}}$
 Pulv. rad. althaeae $\bar{\text{3ij}}$.
M. f. pil. cxx. Consp. lycop.

S. Morgens und Abends 5 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei atonischer Gicht.

Reich.

2412. *Ry.* Kreosoti gutt. vj—xij
 Emuls. amygdal. $\bar{\text{3vj}}$
 Syrup. emulsiv. $\bar{\text{3ß}}$.

M. S. Zweistündlich 1 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Gelenkrheumatismus torpider Subjekte.

Marcus.

2413. *Ry.* Kreosoti $\bar{\text{3ß}}$
 Aquae destillat. $\bar{\text{3v}}$.

M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Impetigo sparsa und Krätze.

Wolff.

2414. *Rx.* Kreosoti
Alcohol. $\overline{aa}$ $\overline{3\beta}$.

M. S. Tropfenweise auf den hohlen Zahn.

Anwend. Gegen Zahnschmerz von kariösen Zähnen.

2415. *Rx.* Kreosoti gutt. iv
Pulv. opii gr. ij
Gumm. mimosae gr. v .
M. f. pil. x.

S. Zahnpillen.

Anwend. Bei Zahnschmerzen eine Pille in den hohlen Zahn zu legen.

Blasius.

2416. *Rx.* Kreosoti $\mathfrak{d}\text{j}$
Axung. porci $\overline{3}\text{vj}$.
M. f. unguent.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Zur Zertheilung von Drüsengeschwulst.

Oesterlen.

2417. *Rx.* Cerati
Olei amygdal. dulc. $\overline{aa}$ $\overline{3}\text{j}$
Kreosoti gutt. xxx .

M. D. S. Verbandsalbe.

Anwend. Bei skrofulöser Karies.

Frémanger.

2418. R_y. Kreosoti gutt. v—xx
Olei olivar. $\bar{\text{z}}$ ß.

M. S. Täglich 2—3mal auf die kranken Stellen
einzureiben.

Anwend. Bei chronischen Flechten.

Corneliani.

2419. R_y. Aquae kreosoti $\bar{\text{z}}$ ij.

S. Zum Befeuchten der Charpie.

Anwend. Gegen wuchernde, übelriechende Geschwüre.

L.

Lac vaccinum. Kuhmilch.

Als nährendes, einhüllendes Getränk. Zu Mund- und Gurgelwässern, Fomentationen, Klystieren, Bädern.

Lactis vaccini Serum; Kuhmolken (Schotten, Wadecke).

Versüsste Molken (Serum lact. dulcificatum) gewinnt man, wenn man auf ℥ijj Kuhmilch, beim Beginnen des Kochens, Tartar. depur. ʒj hinzufügt. Nach beendeter Gerinnung seihet man die halb erkaltete Flüssigkeit durch, und kocht sie mit der hinreichenden Menge zu Schaum gebrachten Eiweisses bis zur Gerinnung desselben. Der durchgeseihten Flüssigkeit werden, so viel als zur Neutralisation der Säure nothwendig ist, präparirte Austerschalen hinzugefügt, und filtrirt. Saure Molken (Serum lactis acidum) werden auf gleiche Weise, nur ohne Zusatz von Austerschalen, bereitet.

Auf ℥j Milch zur Bereitung der Molken rechnet man:

Aceti vini ʒj—ij
Alumin. depur. ʒß—j
Citri succi ʒj—iv
Coagul. vitulin. gr. xij—xv
Tamarind. pulp. ʒijj—vj
Tartari depur. ʒß—j

Vini rhenan. ℥ij—iv
 Semin. sinap. cont. ℥j .

Die Gabe der Molken ist nach den zur Bereitung gebrauchten Substanzen verschieden, von ℥β—ij täglich.

2420. *Ry.* Flaved. cort. aurant. ℥iv—vj .

Ebulliant cum

Seri lact. dulcificati ℥ij .

Colat. S. In einem Tage zu verbrauchen.

2421. *Ry.* Rad. gramin. conc.

Malti hordei cont. $\text{āā } \text{℥β}$.

Coque leni igne per $\frac{1}{2}$ horam cum

Seri lact. dulcific. ℥ij .

Colat. S. In einem Tage zu verbrauchen.

422. *Ry.* Herb. recent. nasturtii

„ „ cochlear.

„ „ heder. terrestr.

„ „ chaerefol. $\text{āā } \text{℥β}$.

Concis. infunde in

Seri lact. (tamarind.) ferv. ℥viiij .

Colat. expr. adde

Syrup. flor. aurant. ℥ij .

S. Eine halbe Tasse voll des Morgens 2—3mal.

Anwend. Bei angehender Knotenlungensucht.

Clarus.

Lactis saccharum; Milchzucker.

Form u. Gabe. *In Pulver, Lösung, zu 3ß — iv, einigemal täglich. Aeusserlich zu Gurgelwasser, Klystieren und Bädern.*

Man vermeide concentrirte Salpeter-, Schwefel- und Salzsäure, Chlor, kaustische Alkalien, viele Metallsalze.

2423. *Ry.* Sacchari lactis 3iv
 „ albiss. 3viii
 Gummi mimos. 3ß.
 M. f. pulvis.

S.

Pulvis pro Sero lactis artificiali.

Phoebus.

2424. *Ry.* Sacchari lactis 8j
 Natri muriatici 8ß
 Tartar. depur. 3x
 Sacchari albi 8iv.
 M. exacte. F. pulvis.

S.

Pulvis pro Sero lactis artificiali gallicus.

2425. *Ry.* Sacchari lactis 3ß.
 Infunde cum
 Aquae bullientis 8ij.
 Digere ad solutionem usque, dein adde
 Succu citri q. s. ad grat. saporem.

M. D. S. Zum Getränk.

Anwend. Als kühlendes Getränk in Fiebern.

Richter.

2426. R_y. Pulv. pro sero lact. artific. ℥ijß
Aquae font. ℥xxxij.

Solutis adde

Syrup. rhamni cathart. gutt. viij

Aceti vini gutt. x.

M. S. *Täglich zu verbrauchen.*

Anwend. Wie die gewöhnlichen Molken.

2427. R_y. Sacchari lactis pulv. ℥j

Magnes. albae

Pulv. gumm. mimos.

„ kali nitrici āā ℥ij.

M. f. pulvis.

S. *Theelöffelweise in einem schleimigen Vehikel.*

Pulvis sacchari lactis compositus Cod. med.

Hamb.

Anwend. Zu Anfange leichter Tripper.

Fricke.

Lactuca sativa L. Gartensalat.

Form u. Gabe. *Ausgepresster Saft, ℥ij—iij, 1 — 2 mal.*

2428. R_y. Herb. rec. lactucae sativae

„ et rad. rec. taraxaci

„ „ „ cichor. āā ℥iij.

Cont. in pulvem instillando sensim

Aquae menth. pip. s. v. ℥iij.

Cola cum express. forti et succum decantatum exhibe.

S. *Auf einem Morgenspaziergange binnen einer Stunde zu verbrauchen.*

Anwend. Bei materieller Hypochondrie mit Schlaflosigkeit.

Vogt.

Lactuarium; Lattigsaft.

(*Extractum lactucae, Thridax; Lattigextrakt, Lattigopium.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Emulsion, zu gr. β — ij , einigemal täglich.

2429. *Ry.* Lactucarii vj
 Mucilag. gummi mimos. q. s. ad subact.
 Perfecte unitis adfunde
 Aquae font. vj
 Syrup. rubi idaei vj .

M. S. Aller 2 Stunden 2 Esslöffel.

Anwend. Gegen krampfhaften Husten, Schlaflosigkeit, Hysterie.

v. Hildenbrand.

2430. *Ry.* Semin. lactucae sativ. vj
 Aquae ceras. nigr. vj
 F. l. a. emuls., in qua solve
 Lactucarii gr. xv
 Syrup. papav. vj .

M. S. Alle halbe, später alle Stunden einen Esslöffel voll.

Anwend. Bei Entzündungen des Unterleibes, namentlich bei Gastritis.

Rothamel.

2431. *Ry.* Lactucarii gr. j—ij
 Pulv. rad. liquirit. gr. vj .
 M. f. pulv. Disp. tal. dos. viij .

D. S. Aller 3—4 Stunden ein Pulver.

Anwend. Bei schmerzhaften Erektionen im Tripper, Chorda.

Sachse.

2432. *Rx.* Lactucarii gr. iv
 Sacchari albi ℥iv.
M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. Täglich 3 Pulver zu nehmen.

Hufeland.

2433. *Rx.* Lactucarii gr. xij
 Roob sambuci
 Pulv. rad. liquirit. āā q. s.
F. pilulae iv.

D. S. Aller 3 Stunden eine Pille zu nehmen.

Anwend. Bei hartnäckigem Husten ohne Auswurf und hypostenischen Wassersuchten.

Brera

2434. *Rx.* Lactucarii gr. ij—iij.
 Solve in
 Aquae destill. ℥iij.
 Colat. adde
 Mucilag. semin. cydonior. ℥j.

M. S. Täglich 1—2 mal, besonders des Abends vor Schlafengehen, einige Tropfen in das Auge zu träufeln..

Anwend. Bei erethisch-katarrhalischen Augenentzündungen.

Bau.

Lactucae virosae extractum.

Giftlattigextrakt.

(Von *Lactuca virosa* L., oft auch von *L.*
Scariola L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Lösung, Mixturen, zu gr. ij—x, mehrmals täglich. Tinktur zu 15 Tropfen.

2435. R_x. Herb. digital. purp. gr. β
Extr. lactuc. viros. gr. ij
Sacchari albi gr. xij.

M. f. pulv. Dent tal. dos. xij.

S. Aller 2 Stunden ein Pulver.

Anwend. Gegen Brustwassersucht.

Hufeland. Toel.

Auch von Hiller gerühmt, der noch einmal so grosse Gaben reicht.

2436. R_x. Extr. lactuc. viros. gr. iij—vj
Sacchari lactis 3ij.

M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

S. Aller 2 Stunden ein Pulver.

Anwend. Gegen Keuchusten. Nach und nach steigt Gumprecht mit der Gabe bis auf gr. j pro dos.

Gumprecht.

2437. R_x. Extr. lactuc. viros. gr. xvij
Bismuth. nitric. praecip. gr. xvij
Rad. ipecacuanh. gr. vj

Magnes. carbon. $\text{ʒ}\beta$

Elaeosacch. menth. crisp. ʒij .

M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

S. *Drei- bis viermal täglich ein Pulver in Wasser oder Kümmelthee zu nehmen.*

Anwend. Gegen Magenkrampf mit nervösem Charakter.

Burdach.

2438. Ry. Extr. lactuc. viros. ʒij
Tinct. digital. purp. $\text{ʒ}\beta$
Aquae cinnamom. vinos. $\text{ʒi}\beta$.

S. S. *Aller 2 Stunden 30—50 Tropfen.*

Anwend. Gegen Brustwassersucht.

Schneider. J. H. Schmidt.

2439. Ry. Extr. lactuc. viros.
„ hyoscyam. āā gr. x.
Solve in
Aquae amygdal. amar. $\text{ʒ}\beta$.

M. D. S. *20—40 Tropfen zu nehmen.*

Anwend. Gegen Asthma, Angina pectoris.

Horn.

2440. Ry. Tinct. lactuc. viros. ʒj .

S. *Täglich 2mal 15 Tropfen und allmählig zu steigen.*

Anwend. In der Wassersucht.

Niemann.

Lapathi acuti radix. Grindwurz.

(*Oxylapathi radix.* Von *Rumex obtusifolius* L.)

Form u. Gabe. Presssaft der frischen Wurzel, $\mathfrak{z}$ ij—iij mit Fleischbrühe täglich. Abkochung, $\mathfrak{z}$ j—ij auf $\mathfrak{z}$ viii—xij.

2441. R_y. Rad. lapath. acuti $\mathfrak{z}$ ij.

Coque cum

Aquae fontan. $\mathfrak{z}$ ij.

Colat. $\mathfrak{z}$ j adde

Tinct. aromat. $\mathfrak{z}$ ij

Syrup. cinnamom. $\mathfrak{z}\beta$.

M. D. S. Den Tag über zu verbrauchen.

Anwend. Bei chronischen Hautausschlägen.

2442. R_y. Rad. lapathi acut. conc. part. j.

Coque vase clauso in aquae font. part. iij

ad rem. part. ij.

Exprime per linteum, D. ad lagenas.

S. Täglich früh ein Nösel oder so viel zu trinken, dass täglich 3—4 Stuhlgänge erfolgen.

Anwend. Gegen chronische Ausschläge, besonders veraltete Krätze.

Thorstenson.

Laurocerasi aqua. Kirschchlorbeerwasser.*(Von Prunus Laurocerasus L.)*

Form u. Gabe. Rein oder in Mixturen, zu 10—60 Tropfen, einigemal täglich. Aeusserlich zu Dämpfen, Augen-, Verband-Wässern, Waschungen, Umschlägen, Bädern und Klystieren.

Man vermeide Basen, Metallsalze, Wärme, Luft.

2443. *Ry.* Aquae laurocerasi $\bar{\text{z}}\beta$
 „ destill. simpl. $\bar{\text{z}}\text{j}\beta$
 Sacchari albi $\bar{\text{z}}\beta$.

M. S. Theelöffelweise aller 3—4 Stunden.

Anwend. Gegen Heiserkeit und Husten.

Wendt.

2444. *Ry.* Aquae laurocerasi $\bar{\text{z}}\text{j}$
S. Täglich 30—40 Tropfen 2mal.

Anwend. Gegen Fothergill'schen Gesichtsschmerz

Harless.

2445. *Ry.* Aquae laurocerasi $\bar{\text{z}}\text{ij}$
 Syrup. rubi idaei $\bar{\text{z}}\text{j}$.

M. D. S. Täglich 4mal einen Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei venösen Stockungen und krampfhaften Zufällen.

Horn.

2446. *Ry.* Aquae laurocerasi 3ij
Tinct. thebaic. ʒj.

M. S. Aller 2 Stunden 15 Tropfen.

Anwend. Gegen Brustbräune. Dabei nöthigenfalls jeden Abend oder einen um den andern Extr. aloes aquos. gr. ij.

Pitschaft.

2447. *Ry.* Aquae laurocerasi 3ij
Vini stibiati 3j.

M. S. Aller 3 Stunden 12—15 Tropfen mit Wasser zu nehmen.

Anwend. Bei floriden Skrofeln 4—5jähriger Kinder, auch gegen Kinderkrankheiten krampfhafter Art.

Tourtual.

2448. *Ry.* Terrae ponderos. salit. 3j.
Solve in
Aquae laurocerasi 3j.

S. Täglich 3—4mal 15 Tropfen.

Anwend. Bei skrofulösen Kindern mit Austreibung des Unterleibes und Verstopfung der Gekrösdrüsen.

Hopf.

2449. *Ry.* Mucilag. tragacanth.
Syrup. althaeae āā 3j
Aquae laurocerasi 3j.

M. S. Aller 2—3 Stunden 1 Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Keuchhusten.

Henning.

2450. *Ry.* Extr. belladonnae gr. iv.
Aquae laurocerasi $\bar{3}\beta$.

S. S. Täglich 3mal 30 Tropfen.

Anwend. Gegen hartnäckige Prosopalgie.

Berndt.

2451. *Ry.* Aquae laurocerasi
Tinct. digital. purp. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$.

M. S. Täglich 2–4mal 5–10 Tropfen in Gerstenschleim.

Anwend. Bei trockenem, anhaltendem, krampfhaftem Husten in der Lungensucht, bei grosser Beängstigung und Brustkrämpfen.

Meyer.

2452. *Ry.* Ammon. muriat. depur. gr. iij.
Solve in
Aquae laurocerasi $\bar{3}\beta$.

S. Stündlich zu einigen Tropfen in's Auge zu bringen.

Anwend. Gegen Hornhautflecke.

Andreue.

2453. *Ry.* Aquae laurocerasi $\bar{3}\beta$
„ flor. sambuci $\bar{3}iv$.

S. Zum äussern Gebrauch 3–4mal täglich.

Anwend. Erwärmt gegen skrofulöse und habituelle katarrhalische Augenentzündung.

M. E. A. Naumann.

2454. R_y. Aquae laurocerasi
 „ saturni Goulardi āā ̄ij
 „ rosar. ̄iij.

M. S. Zum Waschen und Befeuchten der Kompressen.

Liquor anterehthisticus Hufelandi.

Anwend. Zur Verminderung örtlich krankhaft erhöhter Sensibilität und daraus herrührender örtlicher Leiden. [Bei heftigen Neuralgien, selbst beim Gesichtsschmerze; vorzüglich bei erhöhtem Erethismus der Geschlechtstheile in beiden Geschlechtern, und dessen Folgen, Pollutio nocturna et diurna, Hypochondrie, Hysterie, Nymphomanie, Satyriasis. Hierbei thut Waschen und Fomentiren der Geschlechtstheile sehr gut; auch kann man mit Nutzen einige Unzen Weinessig zusetzen.]

Hufeland.

Lauri baccae. Lorbeeren.

(Von *Laurus nobilis* L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Aufguss, zu gr. x—xxx, einigemal. Oel zu Pflastern, Ceraten, Salben, Linimenten, Einreibungen.

2455. R_y. Baccar. lauri ̄j
 Vini gallici ̄j.
 Digere per iij dies; colat. admisce
 Syrup. simpl. ̄ij.

M. S. Tassenweise zu verbrauchen.

Anwend. Gegen Stockungen im Uterinsysteme.

2456. R_y. Olei lauri aether. ̄ß
 „ macid. ̄j

Olei caryophyllor. ʒß

Bals. indic. nigri ʒj.

M. S. In die Schläfe und Augenlider einzureiben.

Anwend. Gegen Lähmung der Augenlider.

Beil.

2457. *Ry.* Resin. pini burgund. ʒiij

Olei lauri

„ nucistae āā ʒj.

Liquefactis admisce

Olei rorismarini ʒj.

F. emplastrum.

S. Magenpflaster.

Lavandulae flores. Lavendelblumen.

(Von Lavandula spica L.)

Spieke.

Form u. Gabe. Nur äusserlich zu Kräutersäckchen, Räucherspecies, Umschlägen, Bädern. Spiritus als Riechmittel, Waschung, Einreibung. Spirit. lavand. compositus innerlich zu 30—40 Tropfen; äusserlich als Riechmittel und zu Waschungen.

2458. *Ry.* Flor. lavandulae

„ chamomill. vulg. āā ʒj

Herb. melissae

„ serpylli

Rad. calam. aromat. āā ʒjß.

C. C. M. Mit einer hinreichenden Menge kochenden Wassers angebrüht zum Bade.

Walther.

2459. R_y. Spirit. lavandulae
Tinct. benzoës āā 3ij
Aquae flor. rosar. 3iv.

M. S. Waschwasser.

2460. R_y. Spirit. lavandulae
„ roris marini
„ serpylli āā 3j
Olei nucis moschatae 3j
„ menth. crisp. 3j.

M. S. Zum Waschen.

Levistici radix. Liebstöckelwurzel.

(Von *Ligusticum Levisticum* L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, zu gr. xv—xxx, einigemal; Aufguss, 3ij—iv auf 3iv—vj, esslöffelweise.

2461. R_y. Rad. levistici 3j—iiij.
Inf. in aquae comm. q. suff. ferv. per $\frac{1}{4}$ hor.
Colat. 3vj refriger. adde
Aether. muriat. 3j—iiij
Syrup. flor. aurant. 3ß.

M. D. S. Zweistündlich einen Esslöffel.

Anwend. Gegen wassersüchtige Zufälle der Kinder.

Wendt.

2462. R_y. Rad. levistici 3ß.
Infunde
Aquae fervid. q. s.; in colat. 3vj solve
Kali nitrici depur. 3ß.

Adde

Oxymell. scill. $\bar{3}j$.

M. S. Aller Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Gegen entzündlichen Hydrops, namentlich nach Scharlach.

Sobernheim.

2463. *Ry. Rad. levistici $\bar{3}ij-vj$.*

Infunde

Aquae ferv. q. s.; in colat. $\bar{3}vj$ solve

Tartari boraxati

Roob juniperi $\bar{a}\bar{a} \bar{3}j$.

Adde

Spirit. muriatico-aether. $3\beta-j$.

S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Haut-, aber auch gegen Bauch- und Brustwassersucht.

Trautensch.

2464. *Ry. Rad. levistici*

„ ononid. spinos. $\bar{a}\bar{a} \bar{3}\beta$

Baccar. juniperi $\bar{3}ij$

Rad. liquirit. $\bar{3}\beta$.

C. C. M. S. Täglich 2 Esslöffel voll und mehr zum Theeaufguss.

Species diureticae Hufelandi.

Anwend. Gegen Oedem der Füße, Wassersucht.

Hufeland.

Lichen islandicus L. Isländische Flechte.

Isländisches -, Blut - Lungenmoos.

Form u. Gabe. In Abkochung, $\bar{3}\beta$ —j mit $\bar{3}xij$ — xvj auf $\bar{3}viij$ eingekocht. Gallerte, Chokolade, Paste.

Man vermeide mineralische Mittel.

2465. Ry. Lichen. island. $\bar{3}j$
Seri lactis $\bar{3}xx$.
Coque ad reman. $\bar{3}xij$; adde
Sacchari lactis $\bar{3}vj$.

D. S. Zu halben Tassen zu nehmen.

Anwend. Als Nutriens bei Lungenkatarrh und Lungenschwindsucht.

Augustin.

2466. Ry. Lichen. island. $\bar{3}\beta$
Cort. peruvian. fusc. $\bar{3}ij$
Rad. senegae
„ liquirit. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$
Anisi stellati $\bar{3}\beta$.
C. C. F. spec. Disp. tal. dos. vj .

S. Jede Portion mit $\bar{Q}j$ Wasser abzukochen, durchzuseihen und täglich zu verbrauchen.

Anwend. Gegen atonischen Schleimfluss der Bronchien.

Vogt.

2467. Ry. Lichen. island.
Rad. polygal. amar. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ij$
„ liquirit. $\bar{3}vj$

Caul. dulcamar. ℥iij.

Conc. M. f. spec.

D. S. Den 3. Theil mit 1 Quart Milch zu kochen und täglich zu verbrauchen.

Anwend. In der Lungensucht.

Sachtleben.

2468. *Rx.* Lichen. island. ℥ij
Ichthyocollae ℥j.

Coque cum

Aquae font. q. s. per hor. ij.

Sub finem coct. solve

Sacchari albi ℥iv.

Liquorem, ope album. ovi j eliquatum et colatum, coque denuo per $\frac{1}{4}$ horae partem cum.

Cort. peruv. fusci ℥j

„ cinnamom. acuti ℥ij ad col. ℥viiij.

S. Täglich 4 mal den 8. Theil dieser Gallerte zu verspeisen.

Isländische Moosgelée.

Anwend. Gegen allgemeine Schwäche, chronische Schleim- und Eiterflüsse, Abzehrung.

Vogt.

2469. *Rx.* Lichen. island. ℥j—jß
Kali carbon. e cin. clav. ℥ij—ijj

Aquae commun. ferv. ℥ix.

Macera per xxiv horas; tum liquorem decanta et lichenem residuum probe ablutum coque cum

Aquae commun. ℥xij

ad colat. ℥vj, in qua ebulliendo solve

Sacchari albi ℥j—jß.

Elliqua album. ovi q. s.; denuo cola, evapora ad reman. ℥iv—v; repone in loco frigido, ut in gelatinam abeat.

S. In einem Tage zu verbrauchen.

Anwend. In gleichen Fällen.

2470. *Ry.* Gelatinae lichen. island.
 Sacchari albi āā 3vj
 Pulv. gumm. mimos. 3ij.
 Exsicc. leni calore donec massa in pulv. redigi possit.

S. Täglich 4—6mal 1 Kaffeelöffel.

Anwend. Als leicht nährendes Mittel bei Ab- und Auszehrung.

Clarus.

Cetrarinum; Moosbitter.

Licheninum.

Form u. Gabe. In Pulver, weingeistiger Lösung, zu gr. x—xx täglich.

2471. *Ry.* Cetrarini
 Gummi mimosae āā gr. ij
 Sacchari albi 3ß.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. viij.
S. Aller 2 Stunden 1 Pulver und zwar in der Apyrexie zu nehmen.
Anwend. Gegen Wechselfieber.

Müller.

Limax rufus L. Rothe Wegschnecke.

Form u. Gabe. In Brühen, Gallerten, 8—12 Stück täglich.

2472. *Ry.* Limac. rufos viij.
 Secentur in partes et probe eluantur cum aquae ferv. Dein coque cum

Aquae commun. q. s. per trihorium.

Sub finem coct. adde

Herb. fumariae

Rad. helenii āā 3ij.

Ebulliant per ¼ hor. Colat. ℥jß.

S. Täglich 4mal 1 Tasse voll lauwarm zu trinken.

Anwend. Gegen Lungenschwindsuchten, Abzehrungen.

Lini semina. Leinsamen.

(Von *Linum usitatissimum* L.)

A. Lini seminum farina; Leinsamenmehl.

Form u. Gabe. Abkochung, 3j—iij auf ℥j Wasser täglich. Gurgelwässer, Umschläge, Klystiere.

2473. Rx. Semin. lini cont. 3ij.

Coque cum

Aquae font. ℥iv ad rem. colat. ℥ij.

Adde

Succi liquirit. 3j.

M. S. Tassenweise zu trinken.

Anwend. Bei heftigen Katarrhen.

Reil.

2474. Rx. Farin. semin. lini 3ij—iij

Rad. liquirit. conc. 3ij—iij.

S. Mit 2 Nösel Wasser etwas einzukochen und das Durch- oder Abgegossene den Tag über zu verbrauchen.

Anwend. In allen katarrhalischen Zuständen.

Clarus.

2475. Rx. Decoct. semin. lini $\bar{\text{z}}\text{x}$
 Kali nitrici $\bar{\text{z}}\beta$
 Mellis despum. $\bar{\text{z}}\text{ij}$.

M. S. Alle Stunden eine halbe Tasse voll zu nehmen.

Anwend. Bei entzündlich-katarrhalischen Affektionen der Lungen und der Harnwerkzeuge.

Marcus.

2476. Rx. Semin. lini rec. $\bar{\text{z}}\beta$
 Specier. ad infus. pector. $\bar{\text{z}}\text{ij}$.
 M. f. species.

S. Brustthee.

Berends.

2477. Rx. Decoct. semin. lini $\bar{\text{z}}\text{vj}$
 Sacchari albi $\bar{\text{z}}\beta$
 Succu citri $\bar{\text{z}}\text{ij}$.

M. S. Umgeschüttelt, zum Ausspülen des Mundes und zum Gurgeln.

Collutorium acidulum Swediauri.

Anwend. Bei leichten Entzündungen der innern Wände des Mundes.

2478. Rx. Farin. semin. lini
 „ „ hordei $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{z}}\text{iiij}$.

Coque ex

Aquae font. q. s. ut f. cataplasma.

S. Umschlag.

Anwend. Erweichender Breiumschlag.

Richard.

B. Lini oleum; Leinöl.

Form u. Gabe. Innerlich pur, in Emulsion oder mit Fleischbrühe, zu $\mathfrak{z}\beta-j$. Aeusserlich zu Salben, Linimenten, Klystieren, $\mathfrak{z}j-ij$.

2479. Rx. Olei lini rec. $\mathfrak{z}ij$
 Gummi mimos. q. s.
 Aquae chamomill. $\mathfrak{z}v$.
 F. l. a. emuls. Adde
 Magnes. sulphuricae $\mathfrak{z}j$
 Succ. citri rec. $\mathfrak{z}vj$
 Extr. opii aquos. gr. ij
 Syrup. rhoeados $\mathfrak{z}j$.

M. S. Umgeschüttelt, alle Viertelstunden 1 Esslöffel voll bis zur Wirkung.

Anwend. Gegen hartnäckige Stuhlverstopfung bei eingeklemmten Brüchen.

Richter.

2480. Rx. Magnes. sulphur. $\mathfrak{z}j$.
 Solve in
 Aquae font. $\mathfrak{z}vij$.
 Adde
 Olei lini rec. $\mathfrak{z}iij$
 Tinct. opii simpl. gutt. xvij
 Syrup. papav. $\mathfrak{z}j$.

M. D. S. Umgeschüttelt, alle halbe Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Zu gleichem Zwecke in der Bleikolik.

Richter.

2481. Rx. Semin. lini $\mathfrak{z}\beta$.
 Coque ex
 Aquae font. $\mathfrak{z}x$ ad rem. col. $\mathfrak{z}v$. Adde

Olei lini $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. S. *Klystier*.

Anwend. Erweichendes, einhüllendes Klystier.

Berends.

2482. *Ry.* Flor. chamomill. $\mathfrak{z}\text{ij}$

Semin. lini cont. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Coque cum

Aquae font. q. s.

Colat. $\mathfrak{z}\text{vj}$ adde

Magnes. sulphur. $\mathfrak{z}\beta$

Olei lini rec. $\mathfrak{z}\text{j}\beta$.

M. S. *Zum Klystier*.

Anwend. Bei hartnäckiger Verstopfung.

Reil.

2483. *Ry.* Olei lini rec. $\mathfrak{z}\text{iv}$

Album. ovor. ij .

M. f. liniment.

S. *Die verletzten Stellen damit öfters zu bestreichen oder Leinwand damit zu tränken und überzuschlagen.*

Anwend. Gegen Verbrennungen zweiten Grades.

Mynsicht.

Liquiritiae radix. Süssholzwurzel.

(*Von Glycyrrhiza glabra L.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Trochisken, Pillen, Bissen, zu $\mathfrak{z}\text{j}$ — $\mathfrak{z}\beta$, mehrmals; im Aufguss, seltener Abkochung, $\mathfrak{z}\text{ij}$ — iv auf $\mathfrak{z}\text{iv}$. Succus et Extract. liquirit.

zu ʒj, öfters, in *Pulver, Lattwerge, Pillen, Bissen, Solution. Syrup und Paste. Elixir, theelöffelweise.*

Man vermeide Metallsalze und Säuren.

2484. *Ry.* Rad. althaeae ʒß
 „ gramin. ʒjß
 „ liquiritiae ʒvj.
 Conc. M. f. species.

S. Zwei gehäufte Esslöffel voll mit $1\frac{1}{2}$ Quart Wasser $\frac{1}{4}$ Stunde lang zu kochen.

Anwend. Zum gewöhnlichen Getränk bei katarthalischen Affektionen.

Berends.

2485. *Rv.* Succ. liquirit. dep. ʒvj.
 Solve in
 Aquae foeniculi ʒvj.
 Adde
 Liquor. ammon. anis. ʒiij
 Tinct. opii croc. ʒß.

M. D. S. Täglich 4mal 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei heftigem Husten.

Schubarth.

2486. *Ry.* Sulphur. stibiat. aurant. gr. j
 Succ. liquirit. dep. ʒij
 Aquae foeniculi ʒv
 Syrup. althaeae ʒj.

M. S. Umgeschüttelt, alle 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Zu gleichem Zwecke.

Berends.

2487. R_y. Aquae foeniculi $\mathfrak{z}\text{v}$
 Elixir. e succo liquirit. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Syrup. liquirit. $\mathfrak{z}\beta$.

M. S. Umgeschüttelt, Theelöffelweise.

Anwend. Bei Brustaffektionen der Kinder.

Lobelia inflata L. Indischer Tabak.

Form u. Gabe. In Pulver, zu gr. β — ij , 2—3mal.
 Tinktur, zu 5—30 Tropfen, 2—6mal.

2488. R_y. Tinct. lobeliae inflat. $\mathfrak{z}\text{j}\beta$.

S. Während des Anfalles auf Zucker zu 10, 15—
 20 Tropfen.

Anwend. Gegen Asthma.

Werneck.

2489. R_y. Tinct. lobeliae inflat. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Decocti rad. althaeae $\mathfrak{z}\text{vj}$.

M. S. Aller 2—3 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Als Auswurf beförderndes Mittel nach Katarrhen,
 bei Blennorrhöen der Lunge.

Werneck. Radius.

Lycopodium. Bärlapp.

(Johannisgürtel. Von *Lycopodium clavatum* L.)

A. *Lycopodii herba*; Bärlappkraut.

Form u. Gabe. In Abkochung, $\mathfrak{z}\text{j}$ — ij mit $\mathfrak{z}\text{j}\beta$
 auf $\mathfrak{z}\frac{3}{4}$, täglich.

2490. Rx. Amygdal. dulc. $\bar{3}\beta$
 Decoct. herb. lycopod. ($\bar{3}\beta$) $\bar{3}\text{viiij}$
 Gumm. mimos. q. s. ut f. emulsio.

Admisce

Elect. e senna $\bar{3}\text{j}$.

M. S. Alle halbe Stunden 1 Esslöffel voll.

Anwend.. Gegen Harnverhaltung.

Rodewald.

2491. Rx. Herb. lycopodii $\bar{3}\text{iiij}$.

Conc. S. Zwei gehäufte Esslöffel voll mit $\frac{1}{2}$
 Quart Wasser zur Hälfte eingekocht und aller
 10 Minuten eine Tasse warm zu trinken.

Anwend. In gleichen Fällen.

Rodewald.

B. Lycopodii semina; Bärlappsamen.

(Hexenmehl, Blitzpulver, Streupulver.)

Form u. Gabe. In Lattwerge, Schüttelmixtur,
 Emulsion, zu $\bar{3}\beta$ — $\bar{3}\beta$, einigemal. Aeusserlich Streu-
 pulver.

2492. Rx. Semin. lycopodii $\bar{3}\text{ij}$
 Syrup. althaeae $\bar{3}\text{i}\beta$
 Aquae simpl. $\bar{3}\text{ij}$.

M. S. Umgeschüttelt, aller 2 Stunden 2 Theelöffel.

Anwend. Bei Strangurie, Dysurie und Ischurie kleiner Kinder.

Hufeland.

2493. Ry. Semin. lycopodii $\bar{3}j$ — ijj
Syrup. althaeae $\bar{3}j\beta$.

M. S. Täglich 3—4mal einen Theelöffel.

Anwend. Gegen Harnstrenge oder Harnverhaltung.

Berends.

2494. Ry. Semin. lycopodii $\bar{3}\beta$
Pulp. prunor. $\bar{3}ijj$.
M. f. electuar.

S. Umgerührt, zweistündlich einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Dysurie, Strangurie u. Ischurie Erwachsener.

Hufeland.

2495. Ry. Semin. lycopod.
Gummi mimos. pulv. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$
Syrup. amygdal. dulc. rec. expr. q. s.
ut f. electuar.

D. S. Umgerührt, zweistündlich einen Theelöffel.

Anwend. In gleichen Fällen.

Henschel.

2496. Ry. Zinci oxydat. albi $\bar{3}j$ — ij
Semin. lycopod. $\bar{3}j$.
M. f. pulvis.

S. Zum Einstreuen.

Anwend. Gegen Wundsein der Kinder.

Berends.

2497. Ry. Semin. lycopodii
Zinci oxydati albi $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$

Adipis suilli $\overline{3}\beta$.
M. f. exacte; f. unguentum.

Salbe.

Anwend. Gegen Wundsein der Kinder mit Exulceration.

Rosenstein.

2498. Ry. Semin. lycopod.
Zinci oxydati albi $\overline{a}a$ 3β
Ungt. rosati $\overline{3}j$.
M. f. unguentum.

S. Salbe.

Anwend. Gegen wunde Brustwarzen, feuchte Flechten u. s. w.

Hufeland.

M.

Magnesia. Talkerde, Bittererde.

A. *Magnesia calcinata*; gebrannte
Bittererde.

(*Magnesia usta, pura, Terra Salis amari*;
reine Magnesia.)

Form u. Gabe. In Pulver, Trochisken, Bissen,
Schütteltrank, zu gr. v—xx, einigemal.

Man vermeide Säuren und saure Salze, Alaun, bern-
steins. Ammonium, Metallsalze und alkaloidische Stoffe.

2499. Rx. Semin. hyoscyami ʒj
Amygdal. dulc. excort. ʒß
Aquae ceras. nigr. ʒviij.
F. l. a. emulsio; colat. admisce
Sacchari albiss. ʒvj
Magnesiae ustae ʒj.

D. S. Umgeschüttelt, alle 1—2 Stunden einen
Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei Kardialgie und Vomiturition von zu grosser Reiz-
barkeit des Magens und Säure.

2500. *Ry.* Magnesiae ustae 3ß
 Aquae foeniculi 3jß
 Tinct. rhei aquos.
 Sacchari albi āā 3ij.

M. S. Umgeschüttelt, alle 1 — 2 Stunden einen Kaffeelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei Säure in den ersten Wegen.

2501. *Ry.* Magnes. calcinatae 3ß
 Cort. aurant.
 Sacchari albi āā 3j.
 M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Täglich 3—4 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Magensäure.

2502. *Ry.* Magnes. ustae
 Pulv. rad. rhei
 Elaeosacch. cinnamom. āā 3ß.
 M. f. pulv. Div. in ij part. aequal.

S. Binnen einer Stunde beide Pulver in Wasser zu nehmen.

Vogel.

2503. *Ry.* Magnes. calcinatae 3ijß
 Pulv. rad. rhei
 „ visci querni
 „ fol. aurant. āā 3j.
 M. f. pulv. subtiliss.

S. Täglich 3mal eine Messerspitze voll.

Pulvis antepilepticus Marchionis reformatus.

Anwend. Gegen Epilepsie, besonders bei Kindern, wenn Säure in den ersten Wegen vorhanden ist.

Baldinger.

2504. *Rx.* Magnes. ustae $\bar{3}j$
 Chocolatae pulv. $\bar{3}ij$
 Sacchari albi $\bar{3}v$
 Mucilag. gummi tragacanth. q. s.
 ut f. pasta, ex qua formentur morsuli ad pon-
 dus $\mathfrak{z}\beta$.

S. Zuweilen ein Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Säure, Sodbrennen, Magenkrampf.

Chevallier.

**B. Magnesia carbonica; kohlensaure
 Bittererde.**

(*Magnesia subcarbonica, alba, Edinburgensis,
 Salis amari; weisse, Edinburger, lockere,
 leichte Talkerde oder Magnesia.*)

Form u. Gabe. In *Pulver, Trochisken, Bissen, Lattwerge, Schüttelmixtur*, zu $\mathfrak{z}\beta$ — $j\beta$, einigemal.

Man vermeide Säuren, saure Salze — wenn man nicht die Kohlensäure entbinden will —, Alkalien, alle löslichen Salze, deren Base mit Kohlensäure eine unlösliche Verbindung eingeht, Metallsalze.

2505. *Rx.* Magnes. carbon.
 Acidi tartarici $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$
 Sacchari albi $\bar{3}\beta$.
M. f. pulvis.

S. Theelöffelweise mit Wasser während des Auf-
 brausens zu nehmen.

Pulvis aërophorus Hufelandi.

Anwend. Gegen Erbrechen, gastrisch-gallige Zustände.

Hufeland.

2506. *Ry.* Magnes. carbon.
Acidi tartarici āā gr. x.

M. S. Auf einmal zu nehmen.

Anwend. Bei Gallenanhäufungen, Sodbrennen, Koliken von Säure und Blutanhäufung.

Jahn.

2507. *Ry.* Magnes. carbon. 3j
Flaved. cort. aurant.
Pulv. semin. foeniculi
Sacchari albi āā 3ij.

M. f. pulvis.

D. S. Täglich viermal einen Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Säure, saures Erbrechen, Durchfall u. s. w.

Rosenstein.

2508. *Ry.* Sacchari albi 3vij
Magnes. carbon. 3j
Pulv. rad. ipecacuanh. gr. iij
Olei citri l. anisi gutt. vj—x.
M. f. pulv. D. ad vitrum.

S. Drei- bis viermal eine Messerspitze oder einen Kaffeelöffel voll.

Pulvis antacidus Vogleri.

Anwend. Gegen Sodbrennen, Keuchhusten, schleimige Blasen- hämorrhoiden, weissen Fluss, Nachtripper, Strangurie u. s. w.

2509. *Ry.* Magnes. carbonicae
Sapon. medic.
Rad. rhei opt.
Sacchari albiss. āā 3ij

Olei foeniculi aether. gutt. ij.
M. f. pulvis.

D. S. Täglich 1—3 mal eine Messerspitze voll zu geben.

Pulvis infantum Pharm. Sax.

Anwend. Gegen Säure und Verdauungsbeschwerden, Kolik u. s. w. bei Kindern.

2510. *Ry.* Magnes. carbon. $\mathfrak{z}\text{ij}$
Flaved. cort. aurant.
Semin. foeniculi
Sacchari albi $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\beta$.
M. f. pulvis.

D. S. Täglich 4—5 mal eine Messerspitze oder einen Theelöffel.

Pulvis galactopoeus Rosensteinii.

Anwend. Zur Verbesserung und Vermehrung der Milchabsonderung bei stillenden Frauen.

Rosenstein.

2511. *Ry.* Magnes. carbon. $\mathfrak{z}\text{j}$
Aquae menthae crisp. $\mathfrak{z}\text{iiij}$
Syrup. cort. aurant. $\mathfrak{z}\beta$.

M. S. Umgeschüttelt, zweistündlich einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Sodbrennen.

Berends.

2512. *Ry.* Magnes. carbon. gr. xv.
Aquae menthae crisp. $\mathfrak{z}\text{j}\beta$

Syrup. croci $\text{℥}\beta$
 Laudan. liquidi gutt. ij—iv.

M. S. Umgeschüttelt, Theelöffelweise zu geben.

Anwend. Gegen heftige Durchfälle der Kinder vom Zahnen, Erkältung und scharfen Giften.

Schäffer.

2513. *Ry.* Magnes. carbon.
 Sacchari albi $\overline{\text{aa}}$ $\text{℥}\text{ij}$
 Mucilag. gummi mimosae q. s.
 F. trochisci xij.

S. Von Zeit zu Zeit ein Stück im Munde zergehen zu lassen.

Trochisci antacidi Todii.

Anwend. Gegen Sodbrennen.

Tode.

2514. *Ry.* Croci gr. xv
 Semin. anisi vulg. $\text{℥}\text{j}$
 Magnes. carbon. $\text{℥}\text{j}\beta$
 Syrup. rhei q. s.
 ut f. electuar.

Umgerührt, Theelöffelweise.

Anwend. Gegen Blähungen, Säure und Verdauungsbeschwerden der Kinder.

Richter.

C. Magnesia sulphurata; Schwefelmagnesia.

(*Magnesiumschwefelleber.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Plätzchen, Lösung, zu gr. v—xv, 2—3mal täglich. Bei Vergiftungen ℥j—ij, in schnell folgenden Zwischenräumen.

Man vermeide dieselben Verbindungen, welche bei Kali sulphuratum angegeben sind.

2515. R_y. Magnes. sulphuratae ℥j

Acidi tartarici ℥ij

Sacchari albi ℥iv.

M. f. pulv. Div. in xij part. aequal. D. in charta cerata.

S. *Aller 3 Stunden ein Pulver während des Aufbrausens.*

Anwend. Gegen Quecksilberspeichelfluss.

Sundelin.

2516. R_y. Magnes. l. Kali sulphurat. gr. xvij

Olei cacao ℥ij

Sacchari albi ℥iij

Olei amygdal. dulc. ℥β.

M. S. *Theelöffelweise.*

2517. R_y. Magnes. l. Kali sulphurat. ℥β

Aquae foeniculi ℥vj.

Cola et adde
 Sacchari albi $\mathfrak{z}^{\text{xv}}$.
 F. syrupus.

S. *Theelöffelweise.*

Anwend. Beides gegen chronische Hautausschläge, Keuchhusten, alte Katarrhe, Krämpfe von unregelmässiger Menstruation, Drüsenkrankheiten. Nach Chaussier, der diese Formel für Kinder bestimmte und blos auf Kali sulphuratum bezog.

Radius.

D. Magnesia sulphurica; schwefelsaure Talkerde.

(*Sal amarum, catharticum, Anglicum, Epso-
 mense, Sedlitzense, Suidschiitzense, Magnesia
 vitriolata, Sulphas Magnesiae; Bittersalz, En-
 glisches, Epsomer, Seidlitzer, Suidschiitzer
 Salz*)

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, Lösung, Emulsion, Mixtur, zu $\mathfrak{ij}$ — iv als Digestivmittel, 2—3mal täglich; zu $\mathfrak{z}\beta$ — ij als Abführungsmittel, in einige Portionen vertheilt. Klystier $\mathfrak{z}\beta$ — ij .

Man vermeide Alkalien und ihre Salze mit schwächeren Säuren, Kalk- und Baryt-Salze, essigs. Blei, Kalkwasser.

2518. R_y. Magnes. sulphuricae $\mathfrak{z}\text{j}\beta$
 „ „ carbonicae $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 M. f. pulv. D. in scatula.

S. Zweistündlich einen Theelöffel.

Anwend. Als Abführmittel.

Berends.

- 2519.** Rx. Sal. amari $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Nitri depur.
 Flor. sulphur.
 Caul. dulcamar. $\text{āā } \mathfrak{z}\text{j}$.
 M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.
S. Aller 3 Stunden ein Stück mit Wasser zu nehmen.

Anwend. Gegen Hämorrhoidalbeschwerden mit herpetischer oder rheumatischer Komplikation.

Jahn.

- 2520.a.** Rx. Magnes. sulphuricae $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Natri carbon. acid. $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 M. f. pulv. D. ad chart. ceratam.
S. No. 1.

- 2520.b.** Rx. Acidi tartari puriss. pulv. $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 D. ad chartam.

S. No. 2.

Von jedem ein Pulver in ohngefähr $\mathfrak{z}\text{viij}$ Wasser zu schütten und während des Aufbrausens zu trinken.

**Pulveres Sedlitzenses s. Aqua temperans
 Anglorum.**

Anwend. Bei grosser Hitze und namentlich auf Reisen ein treffliches Kühlmittel, welches gleichzeitig die Absonderungen der Nieren, der Leber, des Darmes befördert.

- 2521.** Rx. Magnesiae sulphuricae $\mathfrak{z}\beta\text{—j}$
 Aquae destill. $\mathfrak{z}\text{vj—xij}$
 Oxymell. simpl. $\mathfrak{z}\text{j}$ (vel Succ. citri $\mathfrak{z}\beta$).
S. S. Aller 2 Stunden eine halbe Tasse voll zu nehmen.

Anwend. Als mässiges Purgirmittel.

L. W. Sachs.

Aehnlich bei Scharlach.

Stieglitz.

2522. *Ry.* Aquae destill. simpl. c. magnes. sulphuric. saturat. $\mathfrak{Z}\text{vij}$
 Acid. sulph. dilut. Ph. Edinb. $\mathfrak{Z}\beta\text{—j}$.

S. *Esslöffelweise.*

Anwend. Mildes, aber sicheres Abführmittel, wovon 2—3 Esslöffel gewöhnlich hinreichen.

James Henry.

Troschel lässt es in Wasser nehmen und die Menge der Schwefelsäure mindern, wenn mehr als ein Löffel genommen werden muss.

2523. *Ry.* Magnes. sulphuricae $\mathfrak{Z}\text{j}$
 Decoct. malti ($\mathfrak{Z}\text{ij}$) $\&\text{ijj}$
 Tartari stibiati gr. ijj
 Tinct. opii croc. $\mathfrak{Z}\text{j}$.

S. S. *Aller 2 Stunden 1 Obertasse bis Oeffnung erfolgt.*

Anwend. Bei entzündlichen Krankheiten des Hirns, der Augen, bei krampfhafter Verstopfung des Unterleibes.

Reil.

2524. *Ry.* Magnesiae sulphuricae $\mathfrak{Z}\text{j}\beta$
 Aquae foeniculi $\mathfrak{Z}\text{viij}$.

S. S. *Esslöffelweise bis 3—5 Stuhlgänge erfolgt sind.*

Anwend. Bei primären syphilitischen Affektionen, zu Anfange der Kur einen Tag um den andern und später jeden dritten Tag.

Fricke. Kluge.

2525. *Ry.* Magnes. sulphuricae $\mathfrak{Z}\text{ij}$
 Mannae $\mathfrak{Z}\text{j}$
 Emulsionis amygdal. $\mathfrak{Z}\text{iv}$.

S. S. *Aller 2 Stunden 1 Ess- oder Kinderlöffel voll.*

Anwend. Antiphlogistisches Abführmittel, z. B. bei Hirnentzündung.

Wendt.

2526. *Ry.* Sal. amari $\bar{3}j$
Tart. stibiati gr. iij.

Solve in

Aquae chamomill. $\bar{3}iij$

Syrup. cichorei $\bar{3}iij$.

M. S. Auf einmal zu nehmen. (?)

Anwend. Im Rothlauf.

Fritze.

2527. *Ry.* Magnes. sulphuricae
Tinct. rhei aquos. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$
Aquae melissae $\bar{3}iv$.

S. S. Zweimal täglich 2 Esslöffel.

Anwend. Als gelindes Abführmittel bei Hämorrhoidalbeschwerden, blinden Hämorrhoiden u. s. w.

Hildebrand.

2528. *Ry.* Sal. amari $\bar{3}iij$
Aquae sambuci $\bar{3}iij$
Vini stibiati $\bar{3}j$
Spir. Mindereri
Syrup. althaeae $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}iij$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Bei Gastricismen zu Anfange hitziger Hautausschläge, besonders der Rose und des Scharlachs.

Jahn.

2529. *Ry.* Olei amygdal. rec. $\bar{3}j\beta$
Gummi mimos. q. s.
Aquae font. $\bar{3}vij$.
F. l. a. emulsio, in qua solve
Magnes. sulphuricae $\bar{3}j\beta$.

M. S. Zweistündlich 1 mässige Obertasse voll bis zur Wirkung.

Anwend. Als Abführmittel bei entzündlicher Reizung des Darmkanals.

Berends.

2530. *Ry.* Magnes. sulphuricae $\text{℥vj} - \text{℥ij}\beta$
 Decocti avenae ℥vj
 Oxymell. simpl.
 Olei lini rec. $\text{āā } \text{℥j}$.

M. S. Klystier.

Anwend. Um Ausleerungen zu befördern.

Berends.

2531. *Ry.* Decocti avenae decort. ℥viij
 Magnes. sulphuricae ℥ij
 Sapon. medic. $\text{℥}\beta$.

S. S. Zum Klystier.

Majoranae herba. Majorankraut.

(*Mairan. Von Origanum Majorana L.*)

Form u. Gabe. Im Aufguss $\text{℥j} - \text{ij}$ auf ℥iij .
 Aeusserlich zu Niesepulver, Kräutersäckchen, infundirt zu
 Mund- und Gurgelwässern, Umschlägen, zu Bädern $\text{℥ij} -$
 ij . Aether. Oel, 1—3 Tropfen. Salbe (*Butyrum s. Un-*
guentum majoranae) kleinen Kindern bei Stockschnupfen
 in die Nasenwurzel gerieben.

2532. *Ry.* Pulv. herb. majoranae
 „ flor. lavandulae
 „ sacchari albi $\text{āā } \text{℥j}$
 „ flor. convallar. maj.
 Sapon. venet. exsicc. $\text{āā } \text{℥}\beta$
 Olei bergamott.

„ caryophyll. āā gutt. ij .
M. f. pulv. subtiliss.

S. Schnupfpulver.

Pulvis errhinus Hufelandi.

Anwend. Bei örtlichen Leiden der Nasenschleimhaut, Stock-

schnupfen u. s. w., bei allen serösen, katarrhalischen, rheumatischen, metastatischen Kopfschmerzen, Augen- und Gehirnkrankheiten dieser Klasse, Taubheiten u. s. w.

Hufeland.

2533. Rx. Olei majoranae gutt. xx
 Axung. porci $\bar{3}$ j.
 M. f. unguent.

S. Auf den Unterleib einzureiben.

Anwend. Bei Blähungsbeschwerden.

Malvae flores et herba. Malven- blüthen und Blätter.

(Von *Alcea rosea* L. und *Malva vulgaris* s.
rotundifolia L.)

Form u. Gabe. Selten innerlich in Abkochung, $\bar{3}$ ij—vj mit $\bar{3}$ ix auf $\bar{3}$ vj. Aeusserlich zu Mund- und Gurgelwässern, Kollyrien, Einspritzungen, Bähungen, Kataplasmen.

2534. Rx. Decocti flor. malvae $\bar{3}$ vj
 Extr. opii aquosi $\bar{2}$ j.

S. S. Zu lauwarmen Umschlägen über die Augen.

Jüngken.

2535. Rx. Flor. malvae vulg. $\bar{3}$ ij
 Ebull. per v minut. c. aquae commun. q. s.
 Colat. $\bar{3}$ vj refriger. adde
 Spirit. camphor. gutt. vj.

M. D. S. Mehrmals täglich in der lau erwärm-

ten und umgeschüttelten Flüssigkeit das Auge zu baden, auch Kompressen damit getränkt überzuschlagen.

Anwend. Gegen Hypopion.

Janin.

2536. *Ry.* Decocti herb. malvae (3ij) ℞j
Liqu. ammon. acet. 3jß
Tinct. opii crocat. 3iij.

M. S. Mittelst Kompressen lauwarm überzuschlagen.

Berends.

2537. *Ry.* Decoct. flor. malvae (3ß) 3v
Lact. vaccini 3j
Hydrargyr. muriat. corr. gr. j—ij.

S. S. Antisyphilitisches Mund- und Gurgelwasser.

Hôp. des Vénér.

2538. *Ry.* Herbae malvae 3j
„ meliloti
Flor. chamomill. vulg.
Semin. lini āā 3ß.
Conc. cont. coque cum
Lact. vaccini q. s., ut f. l. a. cataplasma.

S. Erweichender Breiumschlag.

Manganesium oxydatum nigrum. Schwarzes Braunsteinoxyd.

(*Manganum oxydatum nativum, Magnesia nigra s. vitrariorum; Graubraunsteinerz, schwarzes Manganoxyd.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, Plätzchen, Pillen, zu gr. $\text{ij} - \text{x}$, einigemal täglich. Aeusserlich als Salbe, $\text{3j} - \text{ij}$ auf 3j Fett.

2539. Rx. Fol. digital. purp. gr. j
Oxydi manganes. nigri gr. ij
Rad. liquirit. 3ß .
M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj .

S. Aller 4 Stunden 1 Pulver.

Pulveres diuretici cum Manganessio Brerae.

Anwend. Gegen Wassersucht mit chlorotischer Komplikation.

Brera.

2540. Rx. Oxydi manganes. nigri gr. ij
Magnes. ustae 3ß .
M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj .

S. Aller 3 Stunden 1 Stück.

Anwend. Gegen Bleichsucht.

Brera.

2541. Rx. Oxydi manganes. nigri gr. xiv
Extr. sabinae

Extr. aloes āā ʒß.
M. f. l. a. boli vj.

D. S. Den Tag über zu verbrauchen.

Anwend. Bei Amenorrhöe, die mit Bleichsucht verbunden ist.

Brera.

2542. *Ry.* Manganes. oxydat. nigr. ʒiij
Axungiae porci ʒj.
M. f. unguent.

D. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Flechten und chronische Hautausschläge.

Silvy. Villars.

Manna. Manna.

(Von Fraxinus Ornus L.)

Form u. Gabe. In Lattwerge, Lösung in Wasser, Milch, Thee, Kaffee, Molken, zu ʒß—ij, mit andern Abführmitteln. Syrup Kindern ʒj—ij, 2—3mal.

2543. *Ry.* Mannae calabr. ʒß
Infus. fol. sennae (ʒj) ʒij
Natri sulphurici ʒß.

S. S. Den dritten Theil oder die Hälfte auf einmal zu nehmen.

Anwend. Ein gelindes Abführmittel für Kinder.

2544. *Ry.* Mannae calabr.
Magnes. sulphuric. āā ʒiij
Aquae fervid. ʒij.

Sol. colat. adde
 Tinct. rhei aquos. ℥iij
 Syrup. cichorei ℥j .

M. S. *Aller 2 Stunden 2 Theelöffel voll.*

Anwend. Als Abführung für Kinder von drei Jahren.

2545. *Ry.* Decocti althaeae ℥iv
 Mannae calabr.
 Magnes. sulphur. āā ℥β .

S. S. *Aller 1 — 2 Stunden 1 Esslöffel oder mehr zu nehmen.*

Anwend. Ein mildes Abführmittel bei gereiztem Zustande des Darmkanals, bei Ausschlagsfiebern u. s. w.

2546. *Ry.* Mannae elect. ℥j .
 Solve in
 Aquae foeniculi ℥iij .
 Cola et adde
 Liqu. ammon. anisati ℥j .

M. D. S. *Umgeschüttelt, stündlich 1 Esslöffel voll.*

Anwend. Bei Katarrhalbeschwerden der Kinder.

Rosenstein. Stark.

2547. *Ry.* Rad. salep ℥β .
 Solve in
 Aquae fervid. ℥iij .
 Adde
 Mannae electae ℥β
 Extr. hyoscyami gr. ij
 Syrup. croci ℥j .

M. D. S. *Umgeschüttelt, öfters einen Theelöffel voll zu nehmen.*

Anwend. Bei katarrhalischer Reizung der Luftwege, Reizhusten der Kinder.

Hufeland.

2548. Rx. Mannae electae $\overline{3}\beta$
 Magnesiae carbonicae $\overline{3}j$
 Kali nitrici dep. $\overline{3}\beta$
 Extr. hyoscyami gr. ij.

Solve in

Aquae foeniculi $\overline{3}ij$
 Syrup. althaeae $\overline{3}\beta$.

M. S. Umgeschüttelt, stündlich 2 Theelöffel voll.

Anwend. Bei Zahnfleber mit Krämpfen.

Hufeland.

2549. Rx. Olei amygdal. dulc. rec. expr. $\overline{3}\beta$
 Mellis q. s. ad subactionem
 Syrup. mannae $\overline{3}\beta$.

M. f. linctus.

S. Gut umgeschüttelt, 1—2 Theelöffel voll zu geben.

Anwend. Als Abführung für kleine Kinder.

Kämpf.

2550. Rx. Syrup. mannati $\overline{3}\beta$
 Tinct. rhei aquos. $\overline{3}ij$.

M. S. Theelöffelweise.

Anwend. Abführsaft für Neugeborene.

2551. Rx. Mannae calabr. $\overline{3}vj$
 Aquae font. q. s.

Liquefiant leni igne. Cola fervide et infunde in modulum pro morsulis; refriger. discinde in tabul. pond. $\overline{3}ij$.

S. Aller 2 Stunden eine Morselle.

Anwend. Als Brust- und Eröffnungsmittel.

Phöbus.

Marrubii albi herba. Weisser Andorn.*(Von Marrubium vulgare L.)*

Form u. Gabe. *Frisch ausgepresster Saft, $\bar{3}j - ij$ täglich. Im Aufguss, $\bar{3}\beta - j$ auf $\bar{3}vj$, esslöffelweise, oder als Thee $\bar{3}j - ij$ auf 2 Tassen. Extrakt in Lösung, Pillen, Bissen, zu $\bar{3}\beta - j$, 3 — 4mal täglich. Zu Klystieren aufgegossen.*

2552. Ry. Herb. marrub. albi $\bar{3}\beta$.

Infunde

Aquae ferv. q. s. per $\frac{1}{4}$ hor.

Colat. $\bar{3}vj$ adde

Spirit. sal. ammon. anisat. $\bar{3}\beta$

Mellis despum. $\bar{3}j$.

M. S. *Aller 3 Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.*

Anwend. Bei chronisch - katarrhalischer Brustaffektion.

2553. Ry. Extr. marrub. albi $\bar{3}ij$

„ dulcamar. $\bar{3}j\beta$

Aquae foeniculi $\bar{3}v$

Liqu. ammon. anisat. $\bar{3}ij$

Syrup. althaeae $\bar{3}j\beta$.

M. S. *Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.*

Anwend. Gegen chronische Brustkatarrhe

Berends.

2554. Ry. Extr. marrub. albi $\bar{3}iiij$.

Solve in

Decoct. lichen. island. concentr. $\bar{3}vj$.

Adde

Syrup. senegae 3vj

Elixir. ammoniato-opiati 3ij.

M. D. S. Alle Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei atonischen Blennorrhöen der Lungen.

Schubarth.

2555. *Ry.* Extr. marrub. albi
Kali tartarici āā 3ij
Aquae melissae 3iij.

S. S. Auf 2mal zu verbrauchen.

Beil.

2556. *Ry.* Extr. marrub. albi
„ myrrhae aquosi
Gummi ammoniaci āā 3ij
Sulphur. stibiat. aurant. 3j
Succi liquirit. 3iij.

M. f. pil. gr. ij. Consp. rad. liquirit.

S. Täglich 3—4mal 2—3 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei dem auf örtlicher Schwäche und Atonie der Lungen beruhenden Asthma zur Beförderung des Auswurfes.

Richter.

2557. *Ry.* Extr. marrubii
„ myrrhae
Gummi kino āā 3ij
Ferri sulphurici 3j.

M. f. pil. gr. ij. Consp. rad. irid. flor.

S. Täglich 3mal 8 Stück.

Anwend. Bei chronischen Brustkatarrhen, chronischen Schleimflüssen der Blase, des Mastdarms.

Waitz.

Mari veri herba. Amberkraut,*(Katzenkraut. Von Teucrium Marum L.)*

Form u. Gabe. Selten in Pulver, Lattwerge, zu ʒj — jß, 2 — 3 mal; im Aufguss als Thee ʒj — ij auf 2 Tassen oder ʒij — iv auf ʒiv, essöffelweise. Schnupfpulver.

2558. Ry. Herb. mari veri
 „ marrubii albi
 „ melissae
 „ menth. crispae āā ʒj.

Conc. M. f. species.

S. Morgens und Abends einen Esslöffel voll zum Aufguss.

2559. Ry. Pulv. herb. mari veri ʒij — iv.

S. Täglich 3 — 5 mal eine Prise zu nehmen.

Anwend. Gegen Nasenpolypen.

Mayer.

Mastiche. Mastix.

(Gummi s. Resina Mastiches. Von Pistacia Lentiscus L.)

Form u. Gabe. Nur noch äusserlich zum Kauen, zu Zahnpulver, Zahnkitt, Räucherungen, Pflastern, Salben, Waschungen. Spiritus, äusserlich.

2560. Ry. Mastiches pulv. ʒij
 Bals. peruvian. ʒß

Gummi mimos. 3ij
 Aquae flor. aurant. 3vj.
 F. emulsio, cui adde
 Tinct. myrrhae 3ij.

M. S. Umgeschüttelt, als Mundwasser.

Anwend. Gegen üblen Geruch von kariösen Zähnen.

Phoebus.

2561. *Ry.* Mastiches
 Conchar. praep. āā 3ij
 Rad. irid. florent. 3β
 Olei rosar. gutt. iij.
 M. f. pulv. subtiliss. D. in vitro.

S. Zahnpulver.

Lockstädt.

2562. *Ry.* Mastiches
 Cerae albae
 Zingiberis āā 3β.
 F. l. a. trochisci pond. 3β.

S. Zum Kauen.

Anwend. Bei üblem Geruch von kariösen Zähnen.

Augustin.

2563. *Ry.* Mastiches pulv. 3ij
 Aether. sulphuric. 3β.
 Solve et decanta. D. in vitro orif. modice amplo,
 bene clauso.

S. Zahnkitt.

Anwend. Man tränkt ein aus Baumwolle gedrehtes Kügelchen damit, und bringt es in den zuvor gereinigten Zahn.

Henry.

2564. *Ry.* Mastiches pulv. ʒj .

Solve in

Spirit. vini rectific. ʒij .

Adde

Olei cinnamom. gutt. ij.

S. Wie das vorige zu gebrauchen.

Anwend. Zu gleichem Zwecke.

Linderer.

2565. *Ry.* Spirit. mastiches compos.

„ serpylli

„ roris marini

„ menth. pip. āā ʒβ .

M. S. Früh und Abends den Unterleib damit zu waschen.

Anwend. Gegen Blähungen.

Hufeland.

Mel crudum et despumatum.

Roher und abgeschäumter Honig.

(*Von Apis mellifica L.*)

Form u. Gabe. In Lösung, Mixturen, Lattwer-
gen, ʒβ—j , 2—3 mal. Aeusserlich zu Klystieren ʒj—ij ,
Stuhlzäpfchen, Umschlägen, Mund- und Gurgelwässern,
Pinselsäften.

Man vermeide concentrirte Säuren, Chlor, kaustische
Alkalien, viele Metallsalze.

2566. *Ry.* Mellis despumati ʒj

Aquae commun. ʒj .

S. S. Tassenweise zu trinken.

Hydromel.

Oxymel simplex; einfacher Sauerhonig.

Form u. Gabe. Zum Getränk, zu Mixturen, Latt-
wergen; zu Mund- und Gurgelwässern, Klystieren $\mathfrak{zj} - \mathfrak{ij}$.

2567. Rx. Decocti radices graminis $\mathfrak{vi}$
Oxymell. simplicis $\mathfrak{ziv}$.

M. D. S. Tassenweise zu trinken.

Anwend. Als kühlendes und eröffnendes Getränk in fieberhaf-
ten und entzündlichen Krankheiten.

2568. Rx. Decocti hordei $\mathfrak{xxvj}$
Oxymell. simpl. $\mathfrak{zj}$.

M. S. Zum Gurgeln.

Anwend. Bei Halsentzündungen.

2569. Rx. Seri lact. ex tartar. depur. parat. $\mathfrak{ziv}$
Kali nitrici $\mathfrak{zj}$
Oxymell. simpl. $\mathfrak{z\beta}$.

M. D. S. Zum Klystier.

Reil.

Meliloti herba et summitates.

Steinkleekraut und Spitzen.

(Von *Melilotus officinalis* Lam.)

Form u. Gabe. Innerlich (selten) als Aufguss, $\mathfrak{zj}$
— $\mathfrak{ij}$ auf 2 Tassen, oder $\mathfrak{zj} - \mathfrak{iv}$ auf $\mathfrak{zvj}$, esslöffelweise.
Umschlag, Bähungen, Pflaster.

2570. Rx. Herb. meliloti
„ hyoscyami

Herb. conii macul.

„ althaeae āā 3j.

Conc. M. f. species.

S. Mit Milch zu einem Breiumschlage gekocht und lauwarm überzuschlagen.

Anwend. Gegen entzündliche Drüsengeschwülste.

2571. Ry. Emplastr. de meliloto

„ digital. purp.

„ cicut.

„ saponis āā 3ij

„ hydrargyr. ciner 3j.

Mal. M. f. emplastrum.

S. Auf Leder messerrückendick zu streichen.

Anwend. Gegen chronische Drüsengeschwülste.

Melissae citratae herba.

Citronenmelisse.

(*Von Melissa officinalis L.*)

Form u. Gabe. Im Aufguss, 3j—ij auf 2 Tassen, oder 3ij—iv auf 3vj, esslöffelweise. Aeusserlich zu Kräutersäckchen und infundirt zu Umschlägen. Aquae melissae composita s. carmelitana 3j—iiij.

2572. Ry. Herb. melissae 3ij

Semin. foeniculi 3vj

Rad. liquiritiae 3ß.

C. C. M. f. species.

S. Zum Theeaufguss.

Anwend. Als Vehikel für andere Arzneien.

Meloe majalis et Proscara- baeus L. Maiwurm.

(*Vermes majales.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, Mixtur,
zu gr. j—vj, 4—6mal täglich.

2573. *Ry.* Pulv. scarab. majal. gr. j

Camphorae gr. ij

Nitri depurati gr. vj

Sacchari albi gr. x.

M. f. pulv. Disp. tal. dos. vj.

S. Aller 2 — 4 Stunden ein Pulver in Milch mit
allmäliger Steigerung bis Harnstrenge erfolgt.

Anwend. Gegen Hundswuth.

2574. *Ry.* Meloas melle conditos ij

Mellis despum. $\mathfrak{z}$ j

Ferri sulphurici fact. $\mathfrak{z}\beta$

Fuliginis splendent. $\mathfrak{z}\beta$

Conter. in mort. exact. in pult., dein addantur
sensim

Aceti crudi $\mathfrak{z}$ ij.

M. S. Haustus antilyssus Ph. Sax.

Mixtura contra morsum canis rabidi.

2575. *Ry.* Meloas majal. viij

Theriac. $\mathfrak{z}\beta$

Ammon. carbon. pyro-oleosi $\mathfrak{z}$ ij

Camphorae $\mathfrak{z}$ j

Liqu. Mindereri ℥viiij .

M. exacte.

S. Stündlich 1—1½ Esslöffel.

Anwend. Gegen Hundswuth u. als kräftiges Harn- u. Schweiss-
treibendes Mittel überhaupt.

Selle.

2576. R_y. Meloas majal. x
Pulv. rad. valerianae
" " pimpinellae
" " agrimoniae
" visci querni āā ℥β
Roob sambuci q. s.
F. electuar.

S. Aller 2 Stunden einen gehäuften Kaffeelöffel
voll.

Anwend. Gegen Wasserscheu.

Kemme.

Menthae crispae herba.

Krausemünzkraut.

(Von *Mentha crispa* L.)

Form u. Gabe. Aufguss, ℥ij — iv auf ℥vj , ess-
löffelweise, oder als Thee; Wasser esslöffelweise. Aeuser-
lich zu Kräuterkissen, Umschlägen, Bädern ℥vj , Klystier
 ℥β . Aether. Oel, 1—3 Tropfen, 2—3mal. Einreibung,
künstlicher Balsam, zu Pflastern.

2577. R_y Herb. menth. crispae ℥iv
Semin. carvi ℥ij

Rad. calami aromat. $\mathfrak{z}\beta$.

Conc. Cont. M. f. species.

D. S. Einen Löffel voll auf 2 Tassen kochenden Wassers.

Anwend. Gegen Colica flatulenta.

Vogt.

2578. Rx. Aquae menthae crispae
 „ chamomill. vulg. $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Syrup. rhoeados
 „ chamomillae $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{z}\beta$.

M. S. Theelöffelweise.

Anwend. Gegen Blähungsbeschwerden der Kinder.

2579. Rx. Herb. menthae crispae
 „ majoranae $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{z}\text{vj}$
 Sapon. med. $\mathfrak{z}\text{iiij}$.
 C. C. f. species.

S. Den dritten Theil mit $\mathfrak{g}\text{j}$ heissen Wassers aufgegossen 3mal täglich zum Klystier.

Anwend. Gegen Colica flatulenta.

Vogt.

Menthae piperitae herba.

Peffermünzkraut.

(Von *Mentha piperita* L.)

Form u. Gabe. Im Aufguss, $\mathfrak{z}\text{ij}—\text{iv}$ auf $\mathfrak{z}\text{vj}$, esslöffelweise, oder als Thee; Wasser esslöffelweise. Bad $\mathfrak{z}\text{iv}—\text{vj}$. Klystier $\mathfrak{z}\beta$. Aether. Oel $\frac{1}{2}—2$ Tropfen, 2—3mal. Peffermünzölzucker, Peffermünzküchelchen; äusserlich zu Einreibungen, Zusatz zu Pflastern.

2580. Ry. Elaeosacch. menth. piperit. $\bar{3}$ ij.

Solve in

Aquae menth. piperit. $\bar{3}$ v

Spirit. sulphurico-aether. $\bar{3}$ j.

S. Stündlich einen Esslöffel.

Anwend. Bei typhösen Fiebern mit Torpidität der Verdauungsorgane.

Richter.

2581. Ry. Herb. menth. piperit. $\bar{3}\beta$.

Infunde cum

Aquae bullient. q. s.

Stent in digest. per $\frac{1}{2}$ hor. vase clauso.

Colat. $\bar{3}$ vj refriger. adde

Aquae cinnamom. vinos. $\bar{3}$ j.

M. D. S. Stündlich eine halbe Tasse voll zu nehmen.

2582. Ry. Herb. menth. piperit.

Flor. lavandul. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ij

Rad. calami aromat.

Cort. salic. laureae $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ j β

Semin. carvi $\bar{3}$ j.

C. C. M. S. Mit 3 Quart Wasser angebrüht zu einem Bade.

Anwend. Zur Stärkung.

Berends.

2583. Ry. Olei menth. piperit. aether.

„ carvi aether. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ j

Tinct. opii crocat. $\bar{3}\beta$

Olei olivar. $\bar{3}$ j.

M. S. Erwärmt auf den Unterleib einzureiben.

Anwend. Gegen Colica flatulenta der Kinder.

Hanke.

2584. *Rx.* Olei menth. piperit. ℥ij
 Liqu. ammon. caustic. ℥ij.
 Solut. adde
 Naphthae sulphur. ℥j.

M. S. In die Umgegend des Auges tropfenweise einzureiben, auch auf der Hand gegen das Auge verdunsten zu lassen.

Anwend. Gegen Lähmungen der Augenlider, Amblyopie und Amaurosis von verminderter Sensibilität.

v. Gräfe.

Mezerēi cortex. Seidelbastrinde.

(Kellerhals-, Pfefferstrauch-Rinde. Von *Daphne Mezereum* L.)

Form u. Gabe. In Abkochung, 3ß — ij mit ℥xvj auf ℥xij eingekocht, 4 mal täglich tassenweise. Aeusserlich in Substanz als Exutorium, 1'' in □ auf die äussere Haut gelegt; zu Gurgelwässern, Injektionen, Katalasmen und Salben.

2585. *Rx.* Cort. mezerei
 Rad. althaeae āā ℥ij.

C. M. S. Mit einer Kanne Wasser 2 Finger breit einzukochen und täglich zu trinken.

Anwend. Gegen nächtliche Knochenschmerzen.

Hufeland.

Gegen Entzündung der Knochenhaut.

Brodie.

2586. *Rx.* Cort. mezerei 3ß
 Ligni sassafras 3jß

Rad. sarsaparill. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Caul. dulcamar. $\mathfrak{z}\text{ijj}$.

M. f. species.

S. *Zum Trank.*

Anwend. Gegen dyskrasische Hautausschläge und Schleimflüsse, veraltete Syphilis mit Merkurialkrankheit u. s. w.

Choulant.

2587. R $\mathfrak{y}$. Cort. mezerei $\mathfrak{z}\text{ij}$ —iv
 Rad. bardanae $\mathfrak{z}\text{j}$.

Coque cum

Aquae comm. $\mathfrak{L}\text{iv}$ ad colat. $\mathfrak{L}\text{ijj}$, sub finem
 coct. addendo

Caul. dulcamar.

Herb. millefol.

Rad. liquirit. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\beta$.

Colat. S. *Drei bis viermal täglich eine Tasse.*

Anwend. Zu ähnlichem Zwecke.

2588. R $\mathfrak{y}$. Cort. mezerei $\mathfrak{z}\text{ijj}$
 Specier. lignor. $\mathfrak{z}\text{iv}$.

M. f. species.

S. *Holzthee.*

Anwend. Gegen syphilitische Knochenkrankheiten.

Fuchs.

2589. R $\mathfrak{y}$. Cort. mezerei $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Rad. sarsaparill. $\mathfrak{z}\text{ijj}$.

Coque cum

Aquae font. $\mathfrak{L}\text{ijj}$ ad colat. $\mathfrak{L}\text{ij}$.

Sub finem coct. adde

Rad. liquirit. $\mathfrak{z}\text{j}$.

S. *Drei- bis viermal ein halbes Pfund täglich zu verbrauchen.*

Anwend. Gegen veraltete Syphilis, Knochenleiden und chronische Exantheme.

Swediaur.

2590. *Ry.* Adipis suilli $\mathfrak{3}\nu$
 Cerae flavae $\mathfrak{3}\beta$.
 Liquefactis adde
 Cort. mezerei incisi et paux. aquae humect. $\mathfrak{3ij}$.
 Coque usque ad humoris evaporationem, cola
 et cum refrikerint, tere exactissime.

D. S. Salbe.

Anwend. Zum Offenhalten von künstlichen Geschwüren, zumal wo Kanthariden leicht Strangurie machen; nöthigenfalls noch durch Euphorb. $\mathfrak{3}\beta$ zu verstärken.

Ph. Gall.

Millefolii herba et summitates.

Schafgarbenkraut und Spitzen.

(Von *Achillea Millefolium* L.)

Form u. Gabe. Im Aufguss oder leichter Abkochung, $\mathfrak{3j} - ij$ auf $\mathfrak{8j}$ Wasser, halbtassenweise. Presssaft, $\mathfrak{3ij} - iij$ täglich. Bähungen, Einspritzungen, Klystiere $\mathfrak{3j} - ij$. Bäder $\mathfrak{8ij}$. Extrakt, $\mathfrak{2j} - ij$ mehrmals täglich.

2591. *Ry.* Herbae millefolii $\mathfrak{3j}\beta$
 Magnes. sulphuricae $\mathfrak{3j}$
 Semin. anisi $\mathfrak{3j}$.

C. C. S. Mit $\mathfrak{8j}$ kochenden Wassers aufzugießen, $\frac{1}{2}$ Stunde an einer heissen Stelle ziehen zu lassen, dann in eine Flasche zu giessen und täglich 2 — 3 mal $\frac{1}{2} - \frac{3}{4}$ Tasse voll durchzuseihen und zu trinken.

Anwend. Gegen träge Absonderungen im Unterleibe, Verschleimung, Hämorrhoidalstockungen u. s. w.

Radius.

2592. *Ry.* Succi rec. expr. herb. millefol.
 „ „ „ „ taraxaci
 „ „ „ „ fumariae āā 3j.
 Succos colatos et decantatos misce; adde
 Elaeosacch. menth. pip. 3jβ.

S. S. Umgeschüttelt, an einem Morgen zu ver-
 brauchen.

Phoebus.

2593. *Ry.* Succi rec. expr. herb. millefol.
 „ „ „ „ fol. farfarae āā 3ij.
 Succos colatos et decantatos misce; adde
 Aquae foeniculi 3ij.

M. D. S. Umgeschüttelt, 2stündlich 2 Esslöffel.

Anwend. Bei leichten Lungenblennorrhöen.

Phoebus.

2594. *Ry.* Extr. millefolii
 „ saponariae āā 3ij
 Aquae menth. pip. 3ij
 Elaeosacch. menth. pip. 3jβ.

M. D. S. Täglich 4 mal 1 Esslöffel voll zu neh-
 men.

Anwend. Bei Flatulenz und Schwäche der Verdauungsorgane.

Reil.

2595. *Ry.* Extr. millefolii
 „ valerianae āā 3ij
 Aquae menth. pip. 3iv
 Spirit. sulphurico-aether. 3j.

M. D. S. Täglich 4—6 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. In ähnlichen Fällen.

Richter.

2596. *Ry.* Extr. millefolii $\bar{3}j$
 Natri boracici $\bar{2}j$
 Aquae chamomill. $\bar{3}vj$.

M. S. *Aller 2 Stunden 2 Esslöffel.*

Anwend. Gegen Menstrualverhaltung.

v. Hildenbrand.

2597. *Ry.* Extr. millefolii $\bar{3}j$
 Ferri pulverati $\bar{3}ij$.

M. f. cum pulv. cort. cinnamom. q. s. pil. gr. iij.
Consp. cinnamom.

S. *Täglich 3mal 3—5 Stück zu nehmen.*

Anwend. Gegen übermässigen Hämorrhoidalfluss.

Quarin. Jahn.

2598. *Ry.* Summitat. millefolii
 Flor. chamomill. vulg. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$.
F. ebullitio. In colat. $\bar{3}viij$ solve
 Natri boracici $\bar{3}ij$
 Mellis rosati $\bar{3}j$.

M. S. *Gurgelwasser.*

Anwend. Bei geschwüriger Bräune.

Vogt.

2599. *Ry.* Summitat. millefolii. $\bar{3}iij$.
Infunde

Aquae fervid. q. s. ad colat. $\bar{3}iij$; adde
 Liquor. myrrhae $\bar{3}j$.

M. S. *Täglich einigemal in den Gehörgang langsam einzuspritzen.*

Anwend. Gegen atonische Otorrhoe.

Berends.

Millepēdes. Kellerwürmer.

(*Schaben, Asseln, Maueresel. Oniscus
Asellus.*)

Form u. Gabe. *Frisch in Lattwergen, Conserven,
8—20—50—100 Stück täglich; als Presssaft ℥j auf ℥vj
Rheinwein, 2 Esslöffel täglich einigemal. Getrocknet in
Pulver, gr. x—xxx.*

2600. *Ry. Millepedarum ℥j
Mellis despum. q. s.
ut f. electuar. molle.*

*D. S. Aller 2 Stunden 2 Theelöffel voll zu neh-
men.*

Anwend. Gegen Brust- und Bauchwassersucht.

2601. *Ry. Milleped. vivar. paul. contus. ℥ß
Vini albi optimi ℥iij.
Macera per xij horas et per linteum exprimens
cola.*

S. Täglich 3mal 1 Esslöffel.

Vinum millepedatum Ph. Edinb.

Anwend. Gegen Amaurose, Gicht, Wassersucht.

2602. *Ry. Succi millepedarum expressi
Liqu. kali acetici āā ℥ß
Aquae petroselini ℥iv
Syrup. cort. aurant. ℥j.*

*M. D. S. Aller 2 Stunden 2 Esslöffel voll zu
nehmen.*

Anwend. Gegen frisch entstandenen erethistischen Hydrops.

Richter.

2603. R_y. Conserv. cochleariae $\overline{3}\beta$
 Pulv. milleped. $\overline{3}ij$
 Sal. ammon. mart. gr. xv
 Syrup. commun. q. s.
 F. electuar.

S. *Früh und Abends 1 Kaffeelöffel voll.*

Anwend. Gegen Brust- und Bauchwassersucht.

J. A. Schmidt.

Mimosae gummi. Mimosengummi.

(*Gummi Acaciae, Gummi arabicum, Gummi senegal*; *arabisches, Senegalgummi. Von mehreren Acaciaarten: A. Ehrenbergiana, tortilis Heyne u. s. w.*)

Form u. Gabe. In *Pulver, Lösung, Emulsion, Schleim, $\overline{3}\beta$ —ij, 2—3mal. Aeusserlich Pulver, Mund- und Gurgelwässer, Augewasser, Klystiere, Salbe.*

Man vermeide Säuren, Chlor, Borax, Weingeist, Kalkwasser, mehrere Metallsalze, gerbestoffhaltige Flüssigkeiten.

2604. R_y. Mucil. gummi mimosae
 Aquae flor. tiliae $\overline{aa} \overline{3}j\beta$.

M. S. *Stündlich 2 volle Theelöffel.*

Anwend. Gegen heberhafte Diarrhöe der Kinder.

Wendt.

2605. R_y. Pulv. gummi mimosae $\overline{3}\beta$
 Amygdal. dulc. excort. $\overline{3}j\beta$

Aquae fontan. ℥j.
F. l. a. emulsio.

D. S. Tassenweise zu verbrauchen.

Anwend. Als kühlendes, einhüllendes Getränk in fieberhaften und entzündlichen Krankheiten.

2606. *Ry.* Pulv. gummi mimosae ʒß
Amygdal. dulc. excort. No. iij
Sacchari albi ʒij.
Terantur sub continua agitat. Adde
Olei amygdal. dulc. rec. expr. quantum cum
hac massa uniri potest
Aquae fontanae ʒviiij.
F. l. a. emulsio.

Colat. S. Tassenweise zu verbrauchen.

P. Frank.

2607. *Ry.* Gummi mimosae ʒß
Olei amygd. dulc. ʒjß
Aquae chamomill. ʒjß.
F. emulsio, cui adde
Sacchari albiss. ʒij
(Tinct. thebaic. gutt. j—ij).
M. S. Stündlich oder 2stündlich 1 Theelöffel voll
Anwend. Gegen Durchfall kleiner Kinder.

Radius.

2608. *Ry.* Pulv. gummi mimos. ʒij
„ „ tragacanth.
„ rad. liquirit. āā ʒj
Sacchari albi ʒij.
M. f. pulvis.

S. Theelöffelweise.

Pulvis gummosus.

Anwend. Zur Stillung von Reizhusten,

2609. *Ry.* Gummi mimosae
Colophonii āā 3ß.
M. f. pulvis.

S. Auf die blutende Fläche zu streuen.

Anwend. Zur Blutstillung aus Blutegelstichen oder kleineren parenchymatösen Flächen.

Vogt.

Moschus. Bisam, Moschus.

(*Moschus orientalis.* Von *Moschus moschifer* L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Mixture, Emulsion, gr. ß—ij—x, 3—6mal. Klystier; künstlicher Balsam; Waschpulver.

2610. *Ry.* Moschi optimi gr. xxiv
Sacchari albi 3j.
M. f. pulv. Div. in part. vj aequal. D. in charta cerata.

S. Alle Stunden 1 Pulver zu geben.

2611. *Ry.* Moschi genuini gr. ij
Laudani puri gr. ß
Gummi mimosae ʒj
Sacchari albi 3ij.
M. f. pulvis. Div. in vj part. aequal. D. ad chartam ceratam.

S. Aller 3 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Bei Keuchhusten ohne Fieber.

Goelis.

- 2612.** R_y. Moschi genuini gr. ix
 Sulphur. stibiati aurant.
 Zinci oxydati albi āā gr. iij
 Sacchari albi 3β.
 M. f. pulv. Div. in vj part. aequal. D. in charta
 cerata.
 S. *Aller 2 Stunden 1 Pulver.*
Anwend. Gegen Keuchhusten.

Hinze.

- 2613.** R_y. Moschi genuini gr. vj
 Ammon. carbon. pyro-oleosi 3β
 Elaeosacch. valerianae 3j.
 M. f. pulv. Div. in vj part. aequal. D. in charta
 cerata.
 S. *Aller 2 Stunden 1 Pulver.*
Anwend. Als Erregungsmittel.

Berends.

- 2614.** R_y. Moschi gr. vj
 Ammonii carbonici gr. iv
 Sacchari albi 3iij.
 Misce terendo et adde
 Aquae flor. chamomillae 3jβ.
 M. D. S. *Umgeschüttelt, stündlich 1 Theelöffel.*
Anwend. Gegen Krämpfe der Säuglinge.

Wendt.

- 2615.** R_y. Moschi genuini gr. ij—iij
 Liqu. ammon. succin. 3j
 Aquae foeniculi 3β
 Syrup. althaeae 3j.
 M. terendo.
 S. *Aller 2 Stunden 1 Theelöffel voll.*
Anwend. Gegen Krämpfe ganz junger Kinder, als: krampfhaftes
 Engbrüstigkeit, Krampfzeitraum des Keuchhustens, und
 manche andere Krankheiten mit dem Charakter der Schwäche.

Tourtual.

2616. *Ry.* Moschi orientalis gr. xij.

Solve in

Aquae menth. pip. $\bar{3}$ ij

Syrup. cort. aurant. $\bar{3}$ j.

M. D. in vase clauso.

S. Alle Stunden 1 Kaffeelöffel.

Anwend. Bei Epilepsie, Veitstanz, Kardialgie, nervösem Starrkrampf.

Brera.

2617. *Ry.* Moschi genuini gr. vj—xij

Castorei gr. xij—xxiv

Asae foetidae $\bar{3}$ ß.

M. f. c. suff. q. Tinct. valerian. pil. xxiv.

Consp. lycop. D. ad vitrum.

S. Gegen Abend, Nachts und Morgens 4 Stück.

Anwend. Gegen nervöse Unruhe und Schlaflosigkeit.

Berends.

2618. *Ry.* Infus. rad. valerian. min. ($\bar{3}$ ij) $\bar{3}$ iv

Moschi genuini gr. viij

Liqu. ammon. pyro-oleos. $\bar{2}$ ij

Tinct. ambrae $\bar{3}$ ij

Syrup. flor. aurant. $\bar{3}$ ß.

M. S. Aller 2 Stunden 2 Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Millar'sches Asthma.

Wendt.

2619. *Ry.* Moschi genuini gr. iij—iv.

Tere exacte cum

Aquae foeniculi $\bar{3}$ vj

Syrup. papav. rhoeados $\bar{3}$ j

Liqu. ammon. succin. $\bar{2}$ j.

M. S. Umgeschüttelt, aller $1\frac{1}{2}$ Stunden 1 Theelöffel voll.

Anwend. Bei Krämpfen der Kinder.

Vogt.

2620. *Ry.* Moschi gr. x
 Gummi ammoniaci c. mucilag. gummi mimos.
 trit. $\mathfrak{z}$ j
 Elixirii e succo liquirit. gutt. xv—xx
 Syrup. senegae $\mathfrak{z}$ iiij.

M. S. Alle Stunden 1 Kinderlöffel voll.

Anwend. Bei Angina spasmodica infantum.

Lentin.

2621. *Ry.* Moschi gr. vj
 Sacchari albi $\mathfrak{z}$ j.
 Misce terendo et adde
 Liqu. cornu cervi succ. gutt. LX
 Aquae flor. sambuc. $\mathfrak{z}$ v
 Syrup. emulsivi $\mathfrak{z}$ j.

M. S. Alle halbe oder ganze Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Bei den im Stadio florescentiae zurückgetretenen Masern bei hohem Grade der Asthenie.

Hufeland.

2622. *Ry.* Moschi genuini gr. x
 Rad. valerian. sylvest. conc. $\mathfrak{z}$ ß
 Amyli $\mathfrak{z}$ ß.

M. f. species. Disp. tal. dos. iij. D. ad vitrum.

S. Aller 4—6 Stunden 1 Theil mit kochendem Wasser übergossen zum Klystier.

Anwend. Bei versatilem Nervenfieber mit Krämpfen, wo das Schlucken unmöglich ist.

Vogt.

Myristica aromatica Rxbg. Mus- katenbaum.

A. Macis. Muskatblüthe.

(Samendecke [*Arillus*] der Muskatnuss.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Mor-
sellen, zu gr. v—x. Aetherisches Oel, 1—3 Tropfen,
mehrmals. Tinktur, 20—60 Tropfen.

2623. R̄. Macidis ʒij
Magnes. carbonicae
Sacchari albi āā ʒij.
M. f. pulvis.

D. S. Aller 2 Stunden 1 Messerspitze voll zu
nehmen.

Anwend. Bei Verdauungsschwäche und Säure in den ersten
Wegen.

2624. R̄. Pulv. semin. anisi
„ „ foeniculi āā ʒiij
„ cort. cinnamomi ʒj
„ macidis ʒij
Sacchari albi ʒj.
M. f. pulvis.

D. S. Aller 2 Stunden 1 Theelöffel voll mit Was-
ser zu nehmen.

Anwend. In gleichen Fällen und in Koliken.

Heister.

2625. Rx. Olei macidis 3ß
Spirit. sulphurico-aether. 3jß.

S. S. *Aller 2 Stunden 12 Tropfen auf Zucker zu nehmen.*

Anwend. Gegen Blähungsbeschwerden, Blähungskolik.

Kraus.

2626. Rx. Tinct. macidis 3iij
„ opii simpl. 3vj.

M. D. S. *Täglich 4 mal 30 Tropfen zu nehmen.*

Anwend. Bei einem hohen Grade von Atonie des Darmkanals mit Durchfall.

Vogel.

B. Nux moschata; Muskatennuss.

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Mor-sellen, zu gr. v — x, mehrmals; äusserlich zu Umschlä-gen. Aether. Oel und Balsam zu Linimenten, Salben, Pflastern.

2627. Rx. Pulv. nucis moschatae gr. iv
Sacchari albi ʒj.

M. f. pulv. Disp. tal. dos. vj.

S. *Täglich 3—4 Pulver mit Wasser zu nehmen.*

Anwend. Bei Verdauungsschwäche.

Vogel.

2628. Rx. Magnes. carbon. 3ij
Pulv. nucis moschatae
„ cort. aurantior.

Pulv. rad. rhei

„ sacchari albi āā 3j.

M. f. pulvis.

D. S. Täglich dreimal einen Kaffeelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei Schwäche der Verdauung, Flatulenz, Koliken.

Meyer.

2629. *Rx.* Olei nucis moschatae
Ungt. rosat. āā 3ij
Mixt. oleoso-balsam. 3ß—j
Tinct. opii simpl. 3j.
M. f. unguentum.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen chronischen Durchfall der Kinder; ferner bei Verdauungsschwäche, Blähungen u. s. w.

Wendt.

2630. *Rx.* Olei nucis moschatae 3ß
Bals. nucis moschatae 3j
Spirit. juniperi 3jß.

M. S. In das Rückgrath einzureiben.

Anwend. Gegen anhaltenden Durchfall.

2631. *Rx.* Olei terebinth.
Liqu. ammon. caustic. āā 3j
Olei nucistae 3iij.
M. perfecte.

S. Zum Einreiben in die Magengegend und den ganzen Unterleib.

Anwend. Gegen Magenerweichung, bei Unthätigkeit, Aufgetriebenheit des Unterleibes, gegen Lähmungen.

Pitschaft.

Myrrha. Myrrhe.

(*Gummi-Resina Myrrhae. Von Balsamodendron Myrrhae Nees.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Trochisken, Lattwerge, Emulsion, zu gr. v—xv, 2—3 mal täglich. Aeusserlich Pulver, Salbe, Pflaster. Extrakt zu gr. v—xv, einigemal. Liqueur s. Liquamen myrrhae zu Mund- und Gurgelwässern, Wundwässern, Pinselsäften, Einspritzungen, Salben. Tinktur zu 20—40 Tropfen; äusserlich zu Mund- und Gurgelwässern, Verbandwässern, Zahntinkturen, Pinselsäften, Einspritzungen, Salben und Linimenten.

Man vermeide concentrirte Mineralsäuren, Weinsäure, Salzbilder, kaustische Alkalien, Gold-, Silber-, Kupfer-, Blei-Salze, Chloreisen.

2632. R_y. Pulv. myrrhae ʒβ
Sacchari lactis 3β.

M. f. pulvis.

D. S. Auf einmal zu nehmen.

Anwend. In der Schleimschwindsucht.

Fr. Hoffmann.

2633. R_y. Extr. myrrhae aquosi gr. ij—iv
„ digital. purp.
„ hyoscyami āā gr. β
Sacchari lactis ʒβ.

M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.

S. Aller 3 Stunden ein Pulver.

Anwend. Bei chronischen Lungenleiden, besonders in der Schleimschwindsucht.

Marcus.

2634. *Ry.* Extr. myrrhae aquosi gr. xij
 Lapid. cancror. ppt. 3ß
 Sacchari albi 3jß.
 M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

S. *Aller 3 Stunden ein Pulver.*

Anwend. Gegen asthenischen Schleimauswurf nach Keuchhusten; gegen chronische Schleimflüsse.

Wendt.

2635. *Ry.* Myrrhae 3ij
 Kali carbon. 3j
 Ferri sulphur. cryst. 3ß
 Camphorae gr. xvj
 Mucilag. gummi mimos. q. s.
 F. pil. lx. Consp. lycopod.

D. S. *Täglich 3mal 2—4 Stück.*

Anwend. Gegen Schleimflüsse.

Griffith.

2636. *Ry.* Myrrhae pulv. 3ijß
 Rad. scillae pulv.
 Extr. hyoscyami āā gr. xv
 „ liquirit. q. s.
 F. pil. xc. Consp. rad. irid. flor. D. in vitro.

S. *Täglich 3mal 6 Stück.*

Anwend. Zur Beförderung des Auswurfes bei Schleimasthma.

2637. *Ry.* Galbani depur.
 Catechu pulv. āā 3j
 Myrrhae 3ij
 Extr. trifol. fibrin. q. s.
 F. pil. clxxx. Consp. lycop. D. in vitro.

S *Täglich 3mal 8 Stück.*

Anwend. Bei chronischen Schleimflüssen.

3638. *Ry.* Sperm. ceti
 Terebinth. venet. $\overline{aa}$ $\overline{3ij}$.
 Mixtis adde
 Myrrhae pulv. $\overline{3j}$
 Olibani pulv. q. s.
 F. pil. gr. $\overline{ij}$. Consp. lycop.
S. Aller 3 Stunden eine Pille.

Pilulae balsamicae Boerhaavii.

Anwend. Gegen Schleimschwindsucht.

2639. *Ry.* Myrrhae pulv. $\overline{3j}$
 Gummi mimos. pulv. $\overline{3ij}$.
 Fiat cum
 Syrup. simpl. $\overline{3j}$
 Infus. flor. chamomil. vulg. $\overline{3vj}$
 l. a. emulsio, cui adde
 Ferri sulphurici cryst. gr. xv
 antea in
 Aquae cinnamom. simpl. $\overline{3j}$
 soluta.
*M. D. S. Umgeschüttelt, aller 3 Stunden 2 Ess-
 löffel*
 Anwend. Bei Amenorrhoe.

P. Frank.

2640. *Ry.* Extr. myrrhae $\overline{3j}$
 Sacchari lactis $\overline{3\beta}$.
 Solve in
 Infus. semin. phellandr. aquat. ($\overline{3\beta}$) $\overline{3vj}$.
*D. S. Umgeschüttelt, aller 2 Stunden einen Ess-
 löffel voll.*

2641. *Ry.* Lichenis island. $\overline{3\beta}$
 Radicis colombo $\overline{3ij}$.

Coque cum

Aquae commun. q. s. ad colat. ℥iij.

Admisce

Aquae calcar. vivae ℥j

Extr. myrrhae ℥jβ

Syrup. diacodii ℥iij.

M. S. Täglich 4—5mal einen Esslöffel voll.

Anwend. Gegen langwierige Durchfälle nach Ruhren, welche von Geschwüren im Mastdarme herrühren.

Jahn.

2642. *Ry.* Extr. myrrhae ℥β
Decocti chinae ℥viij.

M. S. Zum Gurgeln.

2643. *Ry.* Pulv. myrrhae
„ catechu
„ sanguin. draconis āā ℥iij
„ caryophyllor.
„ saponis albi āā ℥j.
Contere pedetentim addendo
Mellis albi ℥β.
M. f. electuar.

S. Zum Bestreichen des Zahnfleisches.

Anwend. Gegen Auflöckerung, Schloffheit und Bluten des Zahnfleisches.

2644. *Ry.* Extr. myrrhae pulv. ℥j
Mellis rosati ℥j
Spir. muriatico-aether. ℥j.

M. D. S. Zum Bestreichen des Zahnfleisches.

Linimentum gingivale mundificans.

Disp. Fuld.

2645. *Ry.* Tinct. myrrhae
Liquam. myrrhae $\overline{aa}$ $\overline{3ij}$.

M. S. Mittelst Baumwolle auf den schmerzhaften Zahn zu bringen.

Tinctura odontalgica Güntheri.

Anwend. Gegen Zahnschmerzen jeder Art.

2646. *Ry.* Tinct. myrrhae $\overline{3j}$
Ungt. basilici $\overline{3j}$.
M. f. unguentum.

S. Zum Verbande.

Anwend. Zur Verbesserung der Eiterung und Beförderung der Granulation.

Rust.

2647. *Ry.* Tinct. myrrhae
Aquae calcis $\overline{aa}$ $\overline{3j}$.

M. S. Zum äusserlichen Gebrauch.

Anwend. Gegen luxurirende und skorbutische Geschwüre.

Kirkland.

2648. *Ry.* Tinct. myrrhae $\overline{3ij}$
Acidi phosphorici $\overline{3j}$
Infus. herb. sabinae ($\overline{3\beta}$) $\overline{3vj}$.

M. S. Zum Einspritzen und als Verbandwasser.

Anwend. Bei kariösen Geschwüren.

2649. *Ry.* Tinct. myrrhae ʒij
 Mellis rosati ʒvj
 Vini gallici ʒiij.

M. S. Täglich einigemal in den Gehörgang vorsichtig einzuspritzen.

Anwend. Gegen atonische Otorrhöe.

Tode.

2650. *Ry.* Plumbi acetic. ʒβ—j.
 Solve in
 Aquae destill. ʒvj.
 Adde
 Liqu. myrrhae
 Tinct. opii simpl. āā ʒij.

M. S. Ein wenig erwärmt und umgeschüttelt täglich 2—3mal einzuspritzen.

Anwend. Bei sehr hartnäckigem Fluor albus.

2651. *Ry.* Myrrhae
 Catechu āā ʒj
 Solve in
 Aquae calcar. ustae ʒiv.

M. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Bei asthenischem Tripper und weissem Fluss.

2652. *Ry.* Gummi-res. myrrhae ʒj
 Olei amygdal. dulc. rec. expr. ʒj.
 Leni calore commixtis adde
 Bals. peruvian. nigri ʒβ.
 M. f. linimentum.

D. S. Zum öfteren Bestreichen wunder Brustwarzen.

Vogt.

2653. *Rx.* Myrrhae
 Cort peruvian. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{z}\beta$
 Camphorae $\bar{z}\beta$.
 M. f. pulv. subtiliss.

D. S. Zum Aufstreuen.

Anwend. Bei brandigen Geschwüren und beim Brande.

N.

Naphtha aceti. Essignaphtha.

(*Aether aceticus; Essigäther.*)

Form u. Gabe. Rein auf Zucker, in Mischung, Saft, 5—15—40 Tropfen, in kleineren Gaben öfters täglich. Aeusserlich als Reizmittel, Einreibung an den Schläfen bei Ohnmachten; ferner zum Einathmen, um eine Narkosis hervorzurufen, wie diess in neuester Zeit vorzugsweise mittelst des *Aether sulphuricus* bewirkt wird.

Man vermeide concentrirte Salpeter-, Schwefel-, Salzsäure, Chlor, Jod, kaustische Alkalien, mineralische Mittel, Luft, Wärme.

2654. *Rx.* Naphthae aceti
Tinct. valerian. aether.
„ opii simpl. āā 3j.

M. S. Aller 2 Stunden 10—30 Tropfen.

Anwend. Ein sehr flüchtig durchdringendes Krampfmittel, z. B. bei heftigem Erbrechen u. s. w.

Richter.

2655. *Rx.* Naphthae aceti
Tinct. castorei $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}j$
Olei valerianae gutt. v.

M. D. S. Viertelstündlich 20 Tropfen bis der
Krampfanfall vorüber.

Anwend. Bei hysterischen, hypochondrischen Krämpfen.

Phoebus.

2656. *Rx.* Naphthae aceti $\mathfrak{z}j$
Liqu. ammon. acetici
Aquae flor. aurantior. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}j$
Syrup. ribium $\mathfrak{z}iij$.

M. S. Stündlich einen Esslöffel.

Anwend. Als flüchtig reizendes Schweissmittel.

Jahn.

2657. *Rx.* Naphthae aceti
Tinct. cinnamom. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}j\beta$
Aquae cinnamom. $\mathfrak{z}iij$
Syrup. cort. aurant. $\mathfrak{z}j$.

M. D. S. Aller Viertelstunden einen Esslöffel.

Anwend. Gegen erethische Blutungen der Gebärmutter.

Schneider.

Natrum. Mineralisches Laugensalz.*(Natron, Soda.)*

A. Natrum aceticum; essigsaures Natrum.

(Terra foliata tartari crystallisata; krystallisirte Blättererde.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Lösung, 3ß—j, einigemal. Das verwitterte in Pulver zu ʒj—ij.

Man vermeide starke Säuren und diejenigen Salze solcher Säuren, welche eine schwächere Basis als Natrum enthalten, ferner Kalisalze mit schwächeren Säuren.

2658. Rx. Natri acetici 3v

Camphorae

Nitri āā 3ij

Roob sambuci q. s.

F. pil. cxx. Consp. lycopod.

S. Früh und Abends 2 Stück.

Pilulae antilacteae.

Anwend. Zur Verminderung der Milchsekretion.

Bories.

B. Natrum arsenicicum; arseniksaures Natrum.

Form u. Gabe. Lösung, gr. $\frac{1}{24}$ — $\frac{1}{12}$, täglich.

2659. R_y. Natri arsenicici gr. j
Aquae destill. $\mathfrak{z}$ j.
S. filtra.

S. Täglich $\mathfrak{z}$ j von dieser Solution zu geben und nach und nach auf $\mathfrak{3}\beta$, selbst bis zu $\mathfrak{3}j$ zu steigen. Pearson gab sie bis zu $\mathfrak{3}ij$. Gewöhnlich giebt man das Mittel in einem schleimigen Vehikel oder in einer schwach narkotischen Mixtur.

Aqua arsenicalis Pearsoni.

Anwend. Bei Krebs, Wechselfiebern, verschiedenen Nervenleiden, Chorea, Epilepsie, Migräne, Prosopalgie, chronischen hartnäckigen Hautausschlägen, namentlich Ekzem, Impetigo, Pemphigus, Herpes præputialis u. s. w.

Ueberhaupt soll nach Fodéré dieses Präparat der Fowler'schen Solution vorzuziehen sein.

C. Natrum boracicum; Borax.

(Borax, Boras natricus cum Aqua, Natrum subboracicum; basisch boraxsaures Natrum.)

Form u. Gabe. In Pulver, Trochisken, Lösung, Bissen, Lecksaft, zu $\mathfrak{z}\beta$ — $j\beta$, einigemal; äusserlich zu Mund-, Gurgel-, Augenwässern, Pinselsäften, Einspritzungen, Waschwässern, Salben.

Man vermeide Mineralsäuren, Bernsteinsäure, reines und kohlensaures Kali, Salmiak, Weinsteinrahm, Alaun, schwefels. Magnesia, Kalk-, Baryt- und Metallsalze.

2660. *Ry.* Natri boracici ʒij
 Flaved. cort. aurant.
 Elaeosacch. foeniculi āā ʒjß
 Sacchari albi ʒiij.

M. f. pulvis.

S. Täglich 3mal 2 Theelöffel.

Anwend. Gegen verhaltenen Monatsfluss.

J. C. Stark.

2661. *Ry.* Boracis gr. xv—xx
 Nitri depur. gr. iv—v
 Elaeosacch. foeniculi gr. x.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. viij.

S. Aller 1½ Stunden ein Pulver, bis sie verbraucht sind.

Anwend. Bei zu schwachen Wehen. Erfolgt nach dem Verbrauche keine Wirkung, so macht man eine Pause von 3—6 Stunden und giebt die Pulver dann von Neuem.

Wigand.

2662. *Ry.* Boracis. ʒj
 Croci ʒß
 Olei Cinnamomi gutt. ij.
M. f. pulv. Div. in ij part. aequal.

S. Stündlich ein Pulver.

Anwend. Bei Unthätigkeit der Geburtswehen.

Wedel.

2663. *Ry.* Natri boracici
 Aquae amygdal. amar. conc. āā ʒj
 „ melissae ʒiv.

S. S. Stündlich einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Menstrualkolik, vor und während der ersten Tage der Periode.

Pitschaft.

2664. *Ry.* Natri boracici $\mathfrak{z}\text{j} - \text{j}\beta - \text{ij}$.
 Aquae foeniculi $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Syrup. althaeae $\mathfrak{z}\text{j}$.

S. S. Aller 2 Stunden einen Theelöffel.

Anwend. Bei Magensäure, Schwämmchen.

Berends.

2665. *Ry.* Natri boracici $\mathfrak{z}\text{j}$
 Sacchari lactis $\mathfrak{z}\beta$
 „ „ albi $\mathfrak{z}\text{j}$.
 Solve in
 Seri lactis. vacc. $\mathfrak{z}\text{j}$.

S. Aller 2 Stunden eine halbe Obertasse.

Anwend. Bei dem mit der Menstruation vicariirenden Blut-
 speien.

Herrmann.

2666. *Ry.* Boracis $\mathfrak{z}\text{j}$
 Spirit. cornu cervi $\mathfrak{z}\beta$
 Mellis puri
 Syrup. pectoral. $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. S. Theelöffelweise.

Anwend. Bei vielem zähen Schleim im Halse und daher ent-
 standenem Würgen und Erbrechen.

Weickard.

2667. *Ry.* Boracis pulv. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Sacchari albi $\mathfrak{z}\beta$
 Mucilag. gummi tragacanth. q. s.
 ut f. trochisci torrendi xxx. Consp. saccharo
 lactis pulv.

D. S. Täglich 4—6mal ein Stück im Munde zer-
 gehen zu lassen.

Anwend. Bei Aphthen.

Phoebus.

2668. *Ry.* Natri boracici ℥ij
 Aquae salviae ℥vj
 Mellis rosati ℥j .

S. S. Zum Ausspülen des Mundes.

Anwend. Bei Aphthen.

Vogt.

2669. *Ry.* Natri boracici ℥j—ij
 Mellis rosati ℥j .

M. S. Zum Auspinseln des Mundes.

Anwend. Bei Aphthen.

Vogt.

2670. *Ry.* Natri boracici ℥j
 Sacchari albi ℥ij .
M. f. pulvis.

S. Zweimal täglich auf die Brustwarze der Mutter oder Amme zu streuen, unmittelbar vor dem Anlegen, und eine Messerspitze voll auf die Zunge des Kindes einzureiben.

Anwend. Bei Schwämmchen der Säuglinge.

Kluge.

2671. *Ry.* Natri boracici ℥j
 Aquae flor. sambuci ℥iv .

S. S. Mit Läppchen überzulegen.

Anwend. Gegen skrofulöse Lichtscheu.

Ehrhardt. Rust.

2672. *Ry.* Natri boracici 3ß
 Sacchari albi 3j
 Aquae rosarum 3j.

S. S. Täglich einigemal einige Tropfen in's
 Auge fallen zu lassen.

Anwend. Gegen Flecken der Hornhaut.

Plenk. G. A. Richter.

2673. *Ry.* Natri boracici 3j
 Tinct. opii 3ß
 Aquae rosarum 3iv.

S. S. Augewasser.

Anwend. Gegen rheumatische Lichtscheu.

Fricke.

2674. *Ry.* Natri boracici
 Zinci sulphuric. cryst.
 Alum. usti āā gr. x
 Sacchari albiss. ʒj.
 M. f. pulv. subtiliss.

S. In's Auge zu blasen.

Anwend. Gegen Hornhautflecke.

Beer.

2675. *Ry.* Natri boracici 3ß
 Aquae flor. aurant.
 „ rosar. āā 3ß.

S. M. S. Täglich 3—4mal zum Betupfen der
 Flecke oder Pusteln.

Anwend. Gegen Leberflecke, Hitzblätterchen während der
 Menstruation. Mit noch einmal so viel Wasser gegen Pru-
 rigo pudendi und gegen rothe Nasen.

Hufeland.

2676. *Ry.* Natri boracici
Sevi cervini
Cetacei
Cerae albae $\overline{aa}$ $\overline{3ij}$
Aquae rosar. q. s.
F. unguentum.

S. Salbe.

Anwend. Gegen spröde Haut.

Walther.

2677. *Ry.* Natri boracici $\overline{3ij}$
Ungt. rosati $\overline{3j}$.
M. f. Unguentum.

S. Salbe.

Anwend. Gegen erfrorene Glieder.

Hufeland.

Gegen Flechten.

Pitschaft.

D. Natrum carbonicum depuratum;
gereinigtes kohlensaures Natrum.

(*Natrum subcarbonicum, Sal alcali minerale,
Soda depurata; mildes Natrum, gereinigte
Soda, Mineralalkali.*)

Form u. Gabe. In Pulver und Pillen (wozu man sich des getrockneten bedient), Lösung, zu gr. viij — xx, des getrockneten zu gr. iv — viij, mehrmals täglich. Aeusserlich zu Mund- und Waschwässern, Einspritzungen, Salben.

Man vermeide Säuren — ausgenommen in Saturation —, saure Säfte und Salze, Kalkpräparate, die meisten, namentlich Metallsalze, alkaloidische Vegetabilien, Aqua communis.

2678. *Ry.* Natri carbonici sicci 3ij
Tartari depurati 3vj
Sacchari albi 3ß.

M. f. pulvis.

S. Theelöffelweise während des Aufbrausens zu nehmen.

Pulvis aërophorus Vogleri.

Anwend. Gegen Sodbrennen, Erbrechen, hypochondrische Beschwerden, träge Gallen-, Hämorrhoidal- und Menstrual-Absonderung.

Vogler.

2679. *Ry.* Natri carbon. sicci 3jß
Elaeosacch. citri 3ij
Sacchari albi 3vj.

M. f. pulvis.

D. S. Aller 3 Stunden einen Theelöffel.

Anwend. Als Digestivmittel.

Berends.

2680. *Ry.* Natri carbon. sicci
Pulv. rad. rhei āā 3ß
Elaeosacch. macis 3j.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Täglich 3mal ein Pulver.

Anwend. Bei Kropf und Drüsengeschwülsten.

2681. *Ry.* Natri carbonici sicci
Sapon. medic. āā 3j
Extr. liquirit. q. s.

F. pil. xxx. Consp. pulv. croci.

Täglich 3mal 3 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei Harnsteinen.

Beddoes.

2682. *Rx.* Natri carbonici sicci
 Sapon. medic. āā ʒij
 Extr. trifol. fibr. q. s.
 F. pil. gr. ij. Consp. liquirit.
D. S. Täglich 3mal 3—10 Stück zu nehmen.
Anwend. Als auflösendes, absorbirendes, lithontriptisches Mittel.

Berends.

2683. *Rx.* Natri carbonici depurat. ʒij—iv
 Aquae destill. ʒviij.
S. S. Täglich 2mal einen Esslöffel voll in einem halben Glase Wein oder gewürzhaftem Thee zu nehmen.
Anwend. Gegen Kropf und andere Drüsengeschwülste. Oft mit bitteren Mitteln.

Peschier.

2684. *Rx.* Natri carbonici depurat. ʒj
 Extr. absinthii ʒij
 Aquae menthae piperit. ʒiv
 Syrup. cort. aurant. ʒj.
M. S. Täglich 4mal einen Esslöffel voll zu nehmen.
Anwend. In der Gicht.

Richter.

2685. *Rx.* Natri carbonici depurat.
 „ nitrici āā ʒβ.
 Solve in
 Aquae destill. ʒviij.
D. S. Stündlich einen Esslöffel.
Anwend. Bei entzündlich-galliger Ruhr.

Velsen.

2686. *Ry.* Natri carbonici depurat. 3j
Sapon. med. 3ij
Aqua destill. 3xij.

S. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Zur Auflösung der aus Harnsäure bestehenden Blasensteine.

Hôp. de Montpellier.

2687. *Ry.* Solut. saturatae natri carbon. crudi 3j—iv.

S. Waschwasser, täglich 3—4 mal zu gebrauchen.

Anwend. Gegen Prurigo der äusseren Genitalien der Frauen. Man steigt mit dem Natrum, bis es Reiz hervorbringt, und muss die Waschungen wenigstens noch 14 Tage nach beseitigten Zufällen anwenden.

Trousseau.

2688. *Ry.* Natri carbonici crudi 3ij
Camphorae 3ij
Sacchari albi 3ij.

Terendo affunde sensim

Aqua communis 8ij.

D. S. Mit Charpie überzulegen.

Anwend. Gegen schwammige Geschwüre mit kallösen Rändern.

Saviard.

2689. *Ry.* Natri carbonici crudi 3ij
Calcis extinct. 3j
Extr. opii aquos. gr. x
Axungiae 3ij.

M. f. unguentum.

S. Ein bis 2 Quentchen einzureiben.

Anwend. Gegen die verschiedenen Arten von Prurigo.

Biett.

E. *Natrum bicarbonicum*; doppelt kohlen-
saures Natrum.

(*Soda s. Natrum carbonicum acidulum s. per-
fecte saturatum s. neutrale*; säuerliches, ge-
sättigtes kohlen-saures *Natrum*.)

Form u. Gabe. In *Pulver*, *Pillen*, *Plätzchen*,
Lösung, zu gr. v—x—xxx, 2—4mal.

Man vermeide dieselben Verbindungen wie bei *Natrum carbonicum*.

2690. *Rx.* *Natri carbon. aciduli* gr. xv

Elaeosacch. citri ʒß.

M. f. pulv. Disp. tal. dos. iv.

S. Stündlich 1 *Pulver* mit einem kleinen *Esslöffel*
*Citronensaft*es während des *Aufbrausens* zu
nehmen.

Anwend. Gegen leichte Verdauungsbeschwerden. Wird von
schwachen Digestionsorganen besser vertragen als die ge-
wöhnlichen Brausepulver.

Phoebus.

2691. a. *Rx.* *Natri bicarbonici* ʒß

D. tal. dos. vj ad caps. albas S. No. a.

2691. b. *Rx.* *Acidi tartarici* gr. xxv

D. tal. dos. vj ad caps. coeruleas. S. No. b.

S. Ein *Pulver* b. im blauen *Papier* in ʒviij *Was-
ser* aufzulösen, dann ein *Pulver* a. im weissen

Papier hinzuzufügen, umzurühren und während des Aufbrausens zu trinken.

Anwend. Als Kühlmittel und gegen leichte Verdauungsbeschwerden.

Sodapulver der Engländer. Man kann im Wasser vorher etwas Zucker auflösen lassen, um es limonadenartig zu machen.

2692. *Rx.* Acidi tart. pulv. part. iij
Natri bicarbon. part. iv
Sacchari albiss. part. vij.
Seorsim in pulverem subtiliss. redactae et perfecte exsiccatae commisceantur et in vitro bene clauso dispensentur.

S. Theelöffelweise in Wasser während des Aufbrausens zu gebrauchen.

Pulvis aërophorus Cod. med. Hamb.

Anwend. Das beste Brausepulver nach

Ericke.

2693. *Rx.* Catechu
Pulv. nucis moschatae
Natri bicarbon. āā gr. vj
Acidi tart. gr. iij
Sacchari albi ʒß.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. xij.

S. Aller 3 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Gegen Lienterie.

Neumann.

2694. *Rx.* Natri bicarbon.
Sapon. med. āā ʒij
Bismuth. praec. nitr. ʒj

Extr. aloes gr. iij.

M. f. pil. gr. iij. Consp. lycop.

S. Täglich 3mal 8 Stück.

Anwend. Gegen Magenkrampf, Kolikschmerzen, die mit Säurebildung, mangelhafter Gallenabsonderung u. s. w. verbunden sind.

Fricke.

2695. *Ry.* Natri carbon. aciduli

Extr. cardui bened. āā 3ij.

M. f. l. a. pil. gr. ij. Consp. lycop.

D. S. Täglich 3mal 10 Stück.

Anwend. Bei Lithiasis.

Schneider.

2696. *Ry.* Natri bicarbon.

Sapon. med.

Pulv. zingiber. āā 3ij.

M. f. c. aquae destill. q. s. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Täglich 3mal 10—15 Stück.

Anwend. Gegen Sodbrennen. Nach

Neumann.

2697. *Ry.* Natri bicarb. 3j

Sacchari albi 3ij

(Olei menth. pip. l. cass. cinnamom. gutt. vj)

Mucil. gumm. tragacanth. q. s.

F. trochisci ivc, pulv. cinnamom. conspergendi, non torrendi.

D. S. Aller Viertelstunden (3—5mal) 1 Stück.

Anwend. Gegen Magensäure, Verdauungsschwäche überhaupt.

Phoebus.

2698. *Ry.* Natri bicarbon. $\mathfrak{3ij}$
 Syrup. simpl. $\mathfrak{3j}$
 Aquae destill. $\mathfrak{3viiij}$.

S. S. Früh und Abends 1 Esslöffel.

Peschier's Kropfmittel.

Anwend. Gegen Drüsenkröpfe, die auf der Luströhre sitzen, verschiebbar, aber hart und gewöhnlich rundlich sind.

Plieninger.

2699. *Ry.* Natri bicarbon. $\mathfrak{3ij}$
 Aquae meliss $\mathfrak{3vj}$
 Syrup. cinnamomi $\mathfrak{3\beta}$.

S. S. Umgeschüttelt, täglich 4mal 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Kropf- und Drüsengeschwülste.

Hufeland.

2700. *Ry.* Natri bicarbon. $\mathfrak{3ij\beta}$
 Extr. gentian. $\mathfrak{3\beta}$
 Aquae menth. pip. $\mathfrak{3v}$
 Tinct. rhei aquos. $\mathfrak{3vj}$
 Spirit. sulphurico-aether. $\mathfrak{3ij}$.

S. M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Sodbrennen und Dyspepsie nach dem Missbrauche geistiger Getränke.

Vogt.

2701. *Ry.* Natri bicarbon. $\mathfrak{3iij}$
 Syrup. fumariae $\mathfrak{8j}$.

M. D. S. Morgens und Abends 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei Lichen, Eczema, Prurigo.

Bielt.

F. Natrum chloratum; Chlornatrium.

Form u. Gabe. Innerlich selten; Lösung, Pillen, zu gr. v — xv, 3 — 4mal. Pinselsaft, ℥j — jß auf ℥j; Waschwasser, ℥j — ij auf ℥vj; Klystier, ℥j — jß auf ℥viij; Bad, ℥xviij.

Man vermeide kohlen-saures Kali, Ammoniak, Salpetersäure, salpeters. Silberoxyd, organische, auch Farb- und Riechstoffe, Aether, Weingeist. Die Auflösung des Chlornatriums ist vor Licht zu schützen.

2702. Rx. Mellis rosar. ℥j
Decocti hordei ℥iij
Natri chlorati ℥j — iij.

S. S. Gurgelwasser.

Anwend. Gegen Geschwüre im Munde.

Hôp. des enf. à Paris.

2703. Rx. Natri chlorati ℥ß
Aquae destill. simpl. ℥ij.

S. M. S. Zum Bepinseln und Auflegen mittelst Charpie.

Anwend. Gegen Wasserkrebs.

Hermes.

2704. Rx. Natri chlorati ℥ij
Aquae destill. simpl. ℥iv.

S. S. Zum Waschen.

Anwend. Gegen Jucken der weiblichen Genitalien.

Darling.

2705. *Ry.* Natri chlorati liquor. gutt. xxiv
Decoct. althaeae ℞j.

M. S. Zum Klystier.

Anwend. Bei typhösen Fiebern.

Chomel.

G. Natrum chloricum; chlorsaures
Natrium.

(*Natrium muriaticum oxygenatum, oxymurianticum; hyperoxygenirt-salzsaures Natrium.*)

Form u. Gabe. Wie bei *Kali chloricum*.

Dieselben Verbindungen sind auch hier zu vermeiden, sowie Kalisalze mit schwächeren Säuren, *Kali sulphur. acid.*, Hitze.

2706. *Ry.* Natri chlorici ʒβ—iv
Aquae destill. ʒiv.

S. S. Alle Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Wechselfieber.

Lalesque. Gouzeé.

Scheint vorzüglich bei Anschoppungen im Unterleibe günstig zu wirken. Die letzten Gaben sind kurz vor dem zu erwartenden Anfalle zu nehmen.

H. *Natrium muriaticum*; salzsaures Natrium.

(*Natrium chloratum*, *Sal culinare*, *commune*;
Chlornatrium, *Küchensalz*, *gemeines Salz*.)

Form u. Gabe. In Pulver, Lösung, zu $\mathfrak{ij}$ — $\mathfrak{vj}$, mehrmals täglich. Augen-, Gurgel-, Waschwasser, $\mathfrak{ij}$ — $\mathfrak{iv}$ auf $\mathfrak{℥j}$; Klystier $\mathfrak{ij}$ — $\mathfrak{iv}$; Bad für einen Erwachsenen $\mathfrak{℥iij}$ — $\mathfrak{vj}$; Umschlag, Bähung.

Man vermeide Schwefelsäure, Salpetersäure, Alaun, viele Metalloxyde und Salze.

2707. *Rx.* *Natri muriatici* $\mathfrak{q. v.}$

S. *Aller Viertelstunden 1 Theelöffel voll.*

Anwend. Gegen Blutspeien, Blutbrechen.

Rush. Kopp. Clarus u. A.

2708. *Rx.* *Natri muriatici* $\mathfrak{ij}$
Aquae fontanae $\mathfrak{ix}$.

S. S. *In möglichst kurzer Zeit zu verbrauchen.*

Anwend. Gegen Bluthusten.

Wo nöthig Aderlass und einige Tage hindurch Citronenlimonade, welcher auch Kochsalz beigemischt wird.

L. W. Sachs.

2709. *Rx.* *Natri muriatici* $\mathfrak{ij}$ — $\mathfrak{iv}$
Aquae fontan. $\mathfrak{℥j}$.

S. S. *Fomentation.*

Anwend. Gegen asthenische Augenentzündung.

Burdach.

2710. *Ry.* Solut. natri muriat. conc. q. s.

S. Zum Bepinseln.

Anwend. Gegen Hornhautflecke.

Tittmann.

2711. *Ry.* Natri muriatici
Conch. praepar. āā 3j.
M. f. pulv. subtiliss.

S. Täglich 2—3 mal ein wenig davon in's Auge zu bringen.

Anwend. Gegen leukomatöse Verdunkelung der Hornhaut.

Kranz.

2712. *Ry.* Natri muriatici 3j
Aquaе fontan. 8iij
Aceti crudi 3iv.

M. S. Waschwasser.

Anwend. Täglich einigemal zum Waschen des Halses, der Arme oder auch des ganzen Körpers zur Beförderung der Ausdünstung in Fiebern.

Berends.

2713. *Ry.* Natri muriatici 3iij
Aquaе font. 3vj
Aceti
Spirit. frumenti āā 3iij.

S. M. S. Zu Bähungen.

Anwend. Bei Quetschungen.

Vogt.

2714. *Ry.* Farin. semin. lini
 Micae panis albi $\bar{a}\bar{a}$ $\&j$
 Solut. saturat. natri muriat. q. s.
 Coque ad consistent. cataplasma.

S. Umschlag.

Anwend. Gegen skrofulöse Geschwülste, besonders Verdickungen der Gelenke. Gegen Wasserbruch der Kinder, wo man Oxymel scillit. dazu setzt. Reizt er zu sehr, so vertauscht man ihn einige Zeit mit einem erweichenden Umschlage.

Ellis.

2715. *Ry.* Infus. flor. chamomill. $\bar{z}vj$
 Natri muriatici $\bar{z}\beta$
 Sapon. albi $\bar{z}ij$.

S. D. S. Zum Klystier.

Anwend. Eröffnendes Klystier.

2716. *Ry.* Natri muriatici
 Alumin. crudi $\bar{a}\bar{a}$ $\&ij\beta$
 Kali nitrici $\bar{z}xvj$.
 Aquae font. $\&vL$.

S. D.

Anwend. Bad zur Bewahrung und Erhaltung der Leichname.

Im Winter muss die Flüssigkeit auf der Baumé'schen Salzwage 7 Grad zeigen, im Sommer 12.

Gannal.

2717. *Ry.* Olei nucum jugland. $\bar{z}j$
 Natri muriatici $\bar{z}ij$
 Fellis tauri rec. $\bar{z}ij\beta$.

Digere leni calore per xxxvj horas, tunc terendo misce exacte. F. unguent.

D. S. Umgerührt mit Werg aufzulegen.

Anwend. Auf skrofulöse Geschwülste.

Roncalli.

I. Natrum nitricum; salpetersaures Natrum.

(Nitrum cubicum; kubischer Salpeter.)

Form u. Gabe. In Lösung, gr. v—xx, mehrmals täglich.

Man vermeide dieselben Verbindungen wie bei Kali nitricum dep. (Weinsteinsäure ausgenommen), auch Kalisalze mit schwächeren Säuren.

2718. *Ry.* Natri nitrici ℥ij—vj
Decocti althaeae ℥vj—viij.

S. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Ruhr.

Velsen.

Bonorden rühmt dieses Mittel als unfehlbar, wenn es gleich Anfangs gegeben wird.

2719. *Ry.* Decocti althaeae ℥ij
Natri nitrici ℥β
Sacchari candi ℥ij.

S. S. Stündlich 2 Theelöffel.

Anwend. In allen fieberhaften Krankheiten kleiner Kinder ein vortreffliches Mittel.

Fricke.

K. *Natrum phosphoricum*; phosphorsaures
Natrum.

(*Sal mirabile perlatum*; *Perlsalz*.)

Form u. Gabe. In Pulver, Lösung, zu gr. v—xx
als Auflösungs- und gelindes Reizmittel, 2—3mal; als
Abführmittel $\mathfrak{z}\beta$ —j, 1—2mal.

Man vermeide Schwefelsäure, Salpetersäure, Salzsäure,
kaustisches Kali, Kalisalze mit schwächeren Säuren, alka-
lisch-erdige, erdige und Metallsalze, Kalkwasser.

2720. *Ry.* *Natri phosphorici* $\mathfrak{z}j$
 Elaeosacch. macidis $\mathfrak{z}ij$.
 M. f. pulvis.

S. Auf 2mal in Fleischbrühe.

Anwend. Ein nicht unangenehm schmeckendes, nicht schwä-
chendes Abführmittel.

2721. *Ry.* *Natri phosphorici* $\mathfrak{z}ij$ — $iiij$
 „ *carbon. dep.* $\mathfrak{z}j$
 Elaeosacch. foeniculi $\mathfrak{z}\beta$.
 M. f. pulvis.

S. Täglich 3—4mal 1 Theelöffel.

Anwend. Als mild auflösendes, die Verdauung beförderndes Mittel.

Berends.

2722. *Ry.* *Natri phosphorici*
 Magnesiae carbonicae
 Flor. sulphur.
 Pulv. semin. foeniculi $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{z}ij$

Camphorae rasae gr. iv—viij.
M. f. pulv. Div. in xvj part. aequal.

S. Aller 3 Stunden 1 Pulver mit Schafgarbenthee.

Anwend. Bei Hämorrhoidalkongestionen mit Schwäche.

Richter.

2723. *Ry.* Natri phosphorici $\bar{3}j$
Aquae cerasor. $\bar{3}iv$
Syrup. cerasor. $\bar{3}j$.

S. M. S. Stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Als Abführmittel für Damen.

Phoebus.

2724. *Ry.* Infus. herb. digital. purp. ($\bar{3}j$ — $\bar{3}\beta$) $\bar{3}vj$
Natri phosphorici $\bar{3}\beta$
Syrupi cerasor. $\bar{3}j$.

M. S. Umgeschüttelt, 2stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen erethische Lungenreizung mit phthisischer Disposition.

Formey.

2725. *Ry.* Decocti fuci carageen ($\bar{3}ij$) $\bar{3}vj$
Natri phosphor.
Syrup. emulsivi $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$.

S. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Bei Lungengeschwür mit Bluthusten und Unterleibsstockungen.

Clarus.

2726. *Ry.* Infus. herb. chenopodii (℥β) ℥iv
 Natri phosphorici
 Syrup. rubi idaei āā ℥β.

M. D. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Als ausgezeichnet lösendes und Digestivmittel.

L. W. Sachs.

L. Natrum sulphuricum; schwefelsaures
 Natrum.

(*Sal mirabile Glauberi, Soda vitriolata; Glau-
 ber-, Wundersalz.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Lösung, als auflösen-
 des Mittel zu ℥β—j, 2—4mal; als Abführmittel ℥β—ij,
 1—2mal.

NB. Wenn man es in Pulverform verordnet, so giebt
 der Apotheker das getrocknete oder verwitterte Salz (*Na-
 trum sulph. siccum s. delapsum*), welches noch einmal so
 stark ist.

Man vermeide kaustisches Kali, Kalisalze mit schwä-
 cheren Säuren (ausgenommen Tart. depur.), Kalkwasser,
 Kalk-, Baryt-, Blei-, Quecksilber-, und Silbersalze.

2727. *Ry.* Natri sulphurici ℥jβ
 Aquae font. purae ℥xvj
 Succu citri ℥β
 Sacchari albi ℥iij.

S. S. Als Getränk.

Anwend. Abführende Limonade.

Berends.

2728. Ry. Natri sulphur. cryst. $\bar{\text{z}}\text{j}$
 Aquae fontan. $\bar{\text{z}}\text{iv}$
 Syrup. cerasor. $\bar{\text{z}}\beta$.

*M. D. S. Die Hälfte auf einmal zu nehmen,
 dann alle Stunden 1 Esslöffel voll.*

Anwend. Abführendes Mittel.

Richter.

2729. Ry. Natri sulphur. cryst. $\bar{\text{z}}\text{j}$
 Sacchari albi $\bar{\text{z}}\beta$
 Succ. citri rec. $\bar{\text{z}}\text{j}\beta$.
 Decocti avenae decort. tenuioris mens. j.

S. M. S. Aller 2 Stunden 1 Tasse voll zu nehmen.

Anwend. Abführmittel.

Reil.

2730. Ry. Natri sulphur. cryst.
 Mannae electae $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{z}}\text{j}$.
 Solve in
 Aquae bullient. $\bar{\text{z}}\text{iiij}$.

D. S. Alle Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Abführmittel.

Vogel.

2731. Ry. Natri sulphurici cryst. $\bar{\text{z}}\text{ij}$
 Extr. taraxaci liquidi $\bar{\text{z}}\text{j}$
 Aquae communis $\bar{\text{z}}\text{j}$
 Syrup. cichor. cum rheo $\bar{\text{z}}\beta$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Theelöffel voll.

Anwend. Bei Gelbsucht Neugeborener mit Stuhlverstopfung.

Goelis.

2732. *Ry.* Natri sulphur. sicci $\mathfrak{z}\text{j}$
 Tartari depur. $\mathfrak{z}\beta$
 Sacchari albi $\mathfrak{z}\text{vj}$.
M. f. pulvis.

D. S. Aller 2 Stunden 2 Theelöffel voll in Wasser zu nehmen.

Anwend. Abführendes Pulver.

Berends.

2733. *Ry.* Natri sulphurici $\mathfrak{z}\text{iv}$
 Opii puri gr. ij.
M. f. pulv. Div. in iv part. aequal.

S. Täglich 2—3mal 1 Pulver.

Anwend. Bei Blutungen oder Entzündungen nach vorhergegangenen Aderlässen, und wenn die Plethora vera gehoben ist.

Pitschaft.

2734. *Ry.* Macidis $\mathfrak{z}\text{j}$
 Natri sulphurici sicci $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Rad. colombo $\mathfrak{z}\beta$.
M. f. pulvis.

D. S. Zweistündlich eine Messerspitze.

Anwend. Digestivmittel bei Verschleimungen der ersten Wege.

2735. *Ry.* Natri sulphurici $\mathfrak{z}\text{j}$
 Fol. sennae concis. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. S. Mit 3 Tassen Wasser anzubrühen und alle halbe Stunden eine halbe Tasse zu trinken.

Anwend. Als Abführmittel.

Mufeland.

2736. *Ry.* Natri sulphurici $\mathfrak{z}\text{j}$
 Fol. sennae

Summitat. millefol.

„ centaur. minor. āā 3ß

Semin. foeniculi 3iij.

M. f. species.

S. In ein Tuch gebunden und mit einem halben Maass siedenden Wassers infundirt, die Nacht über stehen gelassen und entweder nüchtern des Morgens oder, wo diess nicht vertragen wird, zwei Stunden nach dem Frühstücke eine halbe oder ganze Tasse voll davon getrunken.

Anwend. Gegen chronische Blutflüsse während der Schwangerschaft und nach derselben.

Oesterlen.

2737. *Rx.* Decocti hordei 3vj
Natri sulphurici 3j
Olei lini 3ij.

M. S. Zum Klystier.

Anwend. Als eröffnendes Klystier.

Nicotianae folia s. herba. Tabaksblätter.

(Von Nicotiana Tabacum L.)

Form u. Gabe. In Aufguss (seltener in Abkochung), zu 3ß — j auf 3iv, stündlich esslöffelweise; in Pulver, Pillen, gr. 3 — ij, 2 — 4mal. Klystier, 3j — ij auf 3viij infundirt; Waschwasser, 3j — ij auf 8j — ij. Extrakt in Pillen, Lösung, Pulver, gr. 3 — ij, 3 — 4mal.

2738. *Rx.* Fol. nicotian. concis. 3j.
Infunde per xx sexagesimas in
Aquae fervid. 3ij.

Filtra et adde
Alcohol rectific. ℥ij .

S. Täglich 2—3 mal 40—80 Tropfen in Thee oder Hafergrütze zu nehmen.

Infusum nicotianae Fowleri.

Anwend. Gegen Asthma und Brustwassersucht.

Fowler.

Auch gegen Dysurie empfohlen von

Kopp.

2739. *Ry.* Fol. nicotianae ℥β—j .

Infunde cum

Aquae ferv. q. s. ad col. ℥iv

Syrup. cinnamomi ℥β .

M. S. Aller 2—3 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Brust- und Herzbeutelwassersucht, Krampfhusten mit und ohne Tuberkeln, Oedem.

Radius.

2740. *Ry.* Fol. nicotianae ℥β—j .

Infunde cum

Aquae ferv. q. s.

Colat. refriger. ℥iv adde

Syrup. emulsiv. ℥j .

M. S. Stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen krankhafte Pollutionen.

Daneben kalte Waschungen des Nackens und Hinterhauptes, Beseitigung der Ursachen, das Tragen einer Bleiplatte auf dem Hinterhaupte während der Nacht.

Pitschaft.

2741. *Ry.* Fol. nicotianae ℥j .

Infunde cum

Aquae ferv. q. s.

Colat. refriger. $\bar{3}vj$ adde

Syrup. emulsiv. $\bar{3}j$.

S. Umgeschüttelt, Kindern von 1—2 Jahren einen grossen Kaffeelöffel voll, älteren 2 dergleichen, und 8—10jährigen 1 Esslöffel voll stündlich zu geben.

Anwend. Gegen Keuchhusten.

2742. R_y. Fol. nicotianae $\bar{3}ijj$

Rad. rhei $\bar{3}ij$.

Ebulliant cum

Aquae commun. q. s. ad colat. $\bar{3}viij$.

S. Stündlich 1 starken Esslöffel.

Anwend. In verzweifelten Fällen von Brucheinklemmung.

Die erste Dosis wird meist weggebrochen, die folgenden aber nicht.

Richter.

2743. R_y. Fol. nicotianae $\bar{3}j$

Rad. angelicae v. calami arom. $\bar{3}ijj$

„ liquirit. $\bar{3}\beta$.

Infunde

Aquae fervid. q. s. ad colat. $\bar{3}viij$.

S. Aller $1\frac{1}{2}$ Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Im Keuchhusten, bei Epilepsie, Paralysen und anderen hartnäckigen Nervenübeln mit grossem Erfolge angewendet von

Fischer.

2744. R_y. Fol. nicotianae gr. ij

Tartari emetici gr. j

Sacchari albi $\bar{3}ij$

Gummi arabici $\bar{3}\beta$.

M. f. pulv. Div. in xx part. aequal.

S. Aller 2 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Gegen Keuchhusten.

Oft ein Brechmittel vorher. Bisweilen den Tabak in einer Wallrathemulsion.

Pitschaft.

2745. *Ry.* Fol. nicotian. pulv.
 Conserv. rosar. āā 3j
 Mucilag. gumm. mimos. q. s.
 F. pil. Lx. Consp. lycop.
S. Täglich 2—4mal 1—3 Stück oder auch mehr,
 bis Uebelkeit erfolgt.

Anwend. Gegen Wassersucht.

Augustin.

2746. *Ry.* Extr. nicotianae 3jß
 Vini antimonii 3ß
 Aquae cinnamomi 3j.
M. S. Täglich 4mal 60—80 Tropfen.

Anwend. Gegen Bauchwassersucht.

Himly in Schol. clin. Gotting.

2747. *Ry.* Fol. nicotianae 3jß
 Liquor. ammon. acet. 3iij
 Aquae fervid. 3jß.
 Dig. per. $\frac{1}{4}$ hor.
Cola. S. Zu einigen Tropfen in's Auge zu träufeln.

Anwend. Gegen Mydriasis.

Sundelin.

2748. *Ry.* Fol. nicotianae 3ij
 Aquae fontan. 8ij.
 Coque per $\frac{1}{2}$ hor. Filtra.

S. Zu Fomentationen.

Aqua nicotianae nosocomii Ludoviciani
 Paris.

Anwend. Gegen Krätze, besonders gegen Krätzflechte.

2749. *Ry.* Herbae nicotianae $\bar{z}$ ij
 Aquae fontan. $\bar{z}$ xvj.
 Ebulliant per $\frac{1}{4}$ hor. Colat. adde
 Kali carbonici $\bar{z}$ j.

S. Zum Waschen des Kopfes oder Ueberschlagen mittelst Kompressen, nachdem die Haare abgeschoren worden sind.

Anwend. Gegen Tinea.

Marryat. Niemann.

2750. *Ry.* Succī nicotianae
 Cerae flavae $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{z}$ ijj
 Resinae pini $\bar{z}$ jß
 Terebinthinae $\bar{z}$ j
 Olei myrrhae q. s. ut f. ceratum.

S. Zum äusserlichen Gebrauch.

Anwend. Gegen hartnäckige Flechten ohne Entzündung und Schmerz.

P. Frank. Consbruch.

2751. *Ry.* Fol. nicotianae $\bar{z}$ j—ij.
 Infunde cum
 Aquae fervid. q. s. ad colat. $\bar{z}$ vij
 Olei lini $\bar{z}$ j.

S. Zu 2 Klystieren.

Anwend. Bei eingeklemmten Brüchen, heftigen Krämpfen.

2752. *Ry.* Fol. nicotianae $\bar{z}$ ß.
 Diger. per $\frac{1}{2}$ hor. in
 Aquae ferv. $\bar{z}$ vijj—x.

Colat. *S.* Klystier.

Anwend. Gegen Askariden.

Thomas.

Beim Ileus.

Hufeland.

Pitschaft rathet halb so viel Tabak zum Klystier bei eingeklemmten, nicht zurückzubringenden Brüchen.

Nux vomica. Brechnuss.

(*Krähenauge. Von Strychnos Nux vomica L.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, zu gr. j—x, 1—2mal; (Aufguss und Abkochung selten und unzweckmässig). Extrakt in Pulver, Pillen, geistiger Lösung, zu gr. ß—ij, 2—3mal. Tinktur zu 10—15 Tropfen einigemal; äusserlich zum Einreiben.

Man vermeide Säuren, Salzbilder, Jodkalium, Metallsalze, Gerbestoff.

2753. R. Nucum vomicar. gr. xvij—xxiv
Rad. ipecacuanhae gr. xxiv
„ rhei 3j
Conchar. praep. ʒij
Elaeosacch. menth. piperit. 3ij.
M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

S. Aller 3—4 Stunden ein Pulver in warmem Melissenthee.

Anwend. Gegen Magenkrampf.

Vogt.

2754. R. Nucis vomicae gr. j
Magnes. carbonicae ʒß.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. viij.

S. Täglich 4mal ein Pulver.

Anwend. Bei Gastralgien mit Brechneigung, Aufstossen, Flatulenz, verdorbenem Geschmack u. s. w.

Die doppelte Dosis wurde auch mit Erfolg in der Bleikolik angewendet.

Seraphinen-Hospital zu Stockholm.

2755. R_y. Pulv. nucis vomicae gr. iij
 Gummi mimosae
 Sacchari albi āā ʒß
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.

S. *Täglich 3mal ein Stück zu nehmen.*

Anwend. In der Dysenterie.

Hufeland.

2756. R_y. Extr. nucis vomicae gr. j—ij
 Aquae destill. ʒij.

S. S, *Aller 4 Stunden 6—10 Tropfen.*

Anwend. Gegen Mastdarmvorfall kleiner Kinder. Bei grösseren 15 Tropfen, für Säuglinge genügen 2—3 Tropfen. In hartnäckigen Fällen verbindet man es mit Ratanhiaextrakt.

Schwartz. Hufeland.

2757. R_y. Extr. nucis vomicae spirit. gr. ij—iv—vj
 Aquae melissae ʒvj
 Mucilag. gummi mimos. ʒß.

M. S. *Aller 2 Stunden 2 Esslöffel.*

Anwend. Gegen Epilepsie, Lähmung der unteren Gliedmaassen.

v. Hildenbrand.

2758. R_y. Extr. nucis vomicae spirit. gr. xxiv
 Camphorae ʒj
 Tinct. pyrethri ʒj.

S. S. *Täglich 4mal 2 Tropfen mit Arnikathee.*

Anwend. Gegen Lähmungen.

Vogt.

2759. *Ry.* Extr. nucis vomicae spirit. gr. vj—xij
 Tinct. colocynth. $\bar{3}j$
 „ pimpinellae $\bar{3}iij$.

S. S. Täglich 2—3 mal 30 Tropfen mit Arnika-
 thee.

Anwend. Bei Lähmungen, namentlich der unteren Extremitäten.

Phoebus.

2760. *Ry.* Extr. nucis vomicae aquos. $\bar{3}\beta$
 Mucilag. gummi arab. $\bar{3}\beta$
 Aquae menthae crispae $\bar{3}vj$
 Syrup. althaeae $\bar{3}j$.

S. S. Zweistündlich einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Ruhr.

Hufeland.

2761. *Ry.* Cortic. cascarillae $\bar{3}j$ —ij.
 Infunde

Aquae fervid. q. s.

Colat. $\bar{3}ij$ —iij adde

Extr. nucis vomicae aquosi gr. j—ij

Mucilag. gummi mimos.

Syrup. althaeae $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$.

M. S. Umgeschüttelt, alle 2 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Bei Diarrhöen der Kinder mit grosser Erschöpfung, mangelhafter Ernährung, bedeutend gesteigerter Empfindlichkeit des Darmkanals, Unterleibskrämpfen, beständigem Drängen und tenesmodischen Stühlen, selbst mit Aftervorfall.

A. Richter

2762. *Ry.* Extr. nucis vomicae spirit. $\mathfrak{z}$ j.
 „ Liquirit. $\mathfrak{z}$ vij.
 M. f. pil. Lxxx. Consp. irid. flor.

S. Täglich 2—3mal 2—6 Stück.

Anwend. Gegen Lähmungen, hämorrhoidalischen Kopfschmerz, Blasenschwäche und daher rührendes unfreiwilliges Pissen.

Radius.

2763. *Ry.* Extr. nucis vomicae
 Pulv. nucis vomicae $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{z}$ j.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Morgens und Abends 6 Stück allmählig steigend.

Anwend. Bei rheumatischer Lähmung der Extremitäten.

Trinius.

2764. *Ry.* Pulv. nucis vomicae
 Extr. nucis vomicae $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{z}$ j.
 M. f. pil. xxx. Consp. rad. althaeae.

S. Aller 2—3—4 Stunden ein Stück.

Anwend. Gegen Kopfgicht, Schwindel und andere Kopfsaffektionen. Sehr sensible Personen können oft nur 1—2 Stück vertragen. Wenn diese Zufälle fieberlos von Stuhlverstopfung begleitet werden, kann man Extr. aloes aquos. gr. xv—xxx zusetzen.

Kopp.

2765. *Ry.* Hydrargyr. muriat. mit.
 Sulphur. stibiat. aurant. $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{z}$ j
 Extr. nucis vomicae spirit. gr. v
 „ arnicae

Gummi asae foetidae āā 3ij.
M. f. pil. gr. iij. Consp. lycop.

S. Täglich 2mal 5 Stück.

Anwend. Gegen Lähmungen mit abwechselnden Konvulsionen
in Folge von Rückenmarksentzündung.

Clarus.

2766. *Ry.* Tinct. nucis vomicae
„ cantharid. āā 3ij
Naphthae phosphoratae 3ij.

*M. S. Täglich 3—4mal 30 Tropfen mit Arnika-
thee.*

Anwend. Gegen Lähmungen reizloser Subjekte.

Vogt.

2767. *Ry.* Extr. nucis vomicae spirit. gr. viij
Alcohol vini 36° 3ij
Ammonii concentr. 3ß.

M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Lähmungen.

Magendie.

2768. *Ry.* Tinct. nucis vomicae
„ flor. arnicae
„ colocynthidis
„ pyrethri āā 3ß.

*M. S. Morgens und Abends davon reichlich in's
Rückgrath u. s. w. einzureiben.*

Anwend. Gegen Rückenmarksschwäche und paralytische Af-
fektion.

Kopp.

Strychnium; Strychnin.

(*Strychninum*, *Strychnia*; *Brechnuss-Alkaloid*, *Krähenaugenbitter*.)

Form u. Gabe. In Pillen, Bissen, Lösung, zu gr. $\frac{1}{12}$ — $\frac{1}{4}$, 2mal täglich. Endermatisch zu gr. $\frac{1}{8}$ —1, allmählig steigend, 1—2mal täglich.

Man vermeide bei dem Strychnin und seinen Salzen dieselben Verbindungen, welche bei *Nux vomica* angegeben worden sind.

2769. Rx. Strychnii puri gr. ij
Conserv. rosar. rubr. 3ß.
F. pil. xxiv. Consp. lycopod.

S. Ein bis zwei Stück früh und Abends.

Anwend. Gegen Lähmungen.

Magendie.

2770. Rx. Strychnii puri gr. β
Magnes. albae 3ß
Rad. rhei
Sacchari albi āā 3j.
M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

S. Täglich 3—4 Pulver.

Anwend. Gegen Hypochondrie und Hysterie.

Fuchs.

2771. Rx. Aquae destill. 3ij
Strychnini pur gr. j

Sacchari albi 3ij
Acid. acetici gutt. ij.

S. S. *Früh und Abends einen Theelöffel.*

Anwend. Gegen Lähmungen.

Magendie.

2772. R. Strychnii puri gr. iv
Acid. acetici dilut. 3j
Spirit. vini 3vj.

S. S. *Täglich 4mal 4 Tropfen und allmählig damit steigend.*

Anwend. Gegen Bleilähmung.

Seraphinen-Hospital zu Stockholm.

2773. R. Strychnii gr. ij (—iv—viij)
Acid. acetici dilut. 3j
Aquae destill. 3j.

M. S. *Täglich einigemal einige Tropfen in's Auge zu träufeln.*

Anwend. Gegen schwarzen Staar.

Henderson.

2774. R. Strychnii gr. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$
Sacchari albi gr. iij.
Terantur invicem, ut fiat pulv. subtiliss. Dent.
tal. dos. iv.

S. *Abends ein Pulver 'auf die durch ein Blasenpflaster wund gemachte Hautstelle einzustreuen.*

Anwend. Gegen Neuralgien und Paralysen.

Wenn Toxikations - Erscheinungen eintreten, so wendet man Morphium aceticum an.

2775. *Ry.* Unguent. epispastici (ex Cort. mezerei, Adeps et Cera flav.) ℥iv
Cerati ℥v
Strychnii puri in spirit. vini rectific. q. s.
solut. gr. iv.

M. f. unguentum; D. in olla.

S. Salbe.

Anwend. Gegen Amaurose durch Lähmung des Sehnerven.

Man legt auf die durch ein Vesicatorium wund gemachte Stelle zu beiden Seiten der Schläfe (wenn beide Augen amaurotisch sind), oder nur auf der Seite des kranken Auges, gr. xij von der Salbe Morgens und Abends auf Löschpapier gestrichen auf, und steigt allmählig mit der Dosis des Strychnins.

Miquel.

Strychnium aceticum; essigsaures Strychnin.

Form u. Gabe. Wie beim reinen Strychnin. Die Strychninsalze sind mit noch grösserer Vorsicht anzuwenden als das Strychnin.

2776. *Ry.* Strychnii acetic. gr. iij
Alcohol. 3j
Aquae cinnamomi 3vij.

S. S. Zweimal täglich 5 Tropfen.

Anwend. Gegen Paraplegie.

Lüders.

2777. R_y. Strychnii acetic. gr. jß
Alcohol. perfect. ʒß.

S. S. Zu 3 — 4 — 20 — 30 Tropfen vor Schlafengehen.

Anwend. Gegen Knochenschmerzen.

Fricke.

Strychnium nitricum; salpetersaures
Strychnin.

Form u. Gabe. Wie bei dem essigsauren Strychnin.

O.

Oleum animale foetidum. Stin- kendes Thieröl.

(*Oleum Cornu Cervi foetidum, pyro-animale, animale empyreumaticum; Hirschhornöl, Knochenöl.*)

Form u. Gabe. In ätherischer Lösung, Pillen, in Emulsion oder schleimigem Vehikel, zu 5—20 Tropfen, 2—3mal. Klystier, Ricchmittel, Einreibung, Liniment, Salbe.

Man vermeide concentrirte Salpeter-, Schwefelsäure, Salzbilder, Alkalien, empfindliche Metallsalze.

2778. Rx. Olei animal. foetidi 3ß
Spirit. sulphurico-aeth. 3ij.

M. S. Aller 2—3 Stunden 15—30 Tropfen.

Anwend. Gegen chronischen Gelenkrheumatismus.

Horn.

2779. R_y. Olei animal. foetid. ℥j
 Vitell. ovi j.
 Terendo misce cum
 Infus. semin. cinae (℥β) ℥vj.
 F. emulsio.

S. Zum Klystier.

Anwend. Gegen Würmer.

Sobernheim.

2780. R_y. Olei animal. foetidi ℥β
 Liqu. ammon. caust. ℥ijβ
 Olei chamomill. cocti ℥iiijβ.

M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen schmerzhaftes, krampfhaftes Zufälle.

Reil.

Oleum animale aethereum.

Aetherisches Thieröl.

(*Oleum anim. Dippelii, Ol. C. C. rectificatum, pyro-animale depuratum; Dippel'sches Oel, rectificirtes Hirschhornöl, Thieröläther.*)

Form u. Gabe. Rein, oder mit Weingeist oder Aether, in Emulsion, Mixturen, zu 5—15—30 Tropfen, 3—4mal. Riechmittel, Klystier, Liniment, Salbe.

Dieselben Verbindungen wie bei dem vorigen zu vermeiden, ausserdem Licht.

2781. R_y. Olei animal. aether. ℥j
 Spirit. sulphurico-aether. ℥iiij.
 M. S. Täglich 4mal 20—30 Tropfen.
 Anwend. Gegen Veitstanz, Starrsucht u. s. w.

Richter.

2782. *Ry.* Olei animal. aether. $\bar{3}j$
Liqu. valerian. Lentini $\bar{3}\beta$.

S. S. Täglich 4 mal 40—60 Tropfen mit etwas Wein zu nehmen.

Anwend. Gegen Epilepsie und manche andere Krämpfe.

2783. *Ry.* Olei animal. aether. $\bar{3}j$
„ terebinth. rectific. $\bar{3}iij$.

M. D. S. Täglich 2—3 mal 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen den Bandwurm.

Chabert.

2784. *Ry.* Olei animal. aether. $\bar{3}j$
„ cajeputi $\bar{3}\beta$.

M. S. Zu 5—10—15 Tropfen auf einmal zu nehmen.

Anwend. In atonischer und zurückgetretener Gicht.

Augustin.

2785. *Ry.* Olei animal. aether. $\bar{3}j$
„ amygdal. $\bar{3}vj$
Sapon. terebinth. $\bar{3}\beta$.

M. f. liniment. D. in vitro clauso et charta nigra obducto.

S. Zum Einreiben.

Sundelin.

Ononidis radix. Hauhechelwurzel.(Ochsenbrechwurzel. Von *Ononis spinosa* L.)

Form u. Gabe. Selten in Pulver, besser in Abkochung (oder Aufguss), $\text{℥}\beta - \text{j}\beta$ auf $\text{℥}\text{vj} - \text{xij}$ Wasse täglich.

2786. **Ry.** Rad. ononidis
Summitat. genistae
Bacc. juniperi $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\text{℥}\beta$
Semin. petroselini
„ anisi $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\text{℥}\text{ij}$.

C. C. M. f. species.

S. Eine Handvoll mit einer Kanne Wasser zu kochen. Zum Getränk während eines Tages.

Species diureticae s. hydragogae.

Anwend. In der Wassersucht.

Cerutti.

2787. **Ry.** Rad. ononidis
Herb. virgae aureae $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\text{℥}\beta$.
C. f. species. D. tal. dos. vj .

S. Mit 4 Tassen heissen Wassers als Thee bereitet zum täglichen Verbräuche.

Anwend. Gegen Nierensteine.

Muhrbeck.

2788. **Ry.** Rad. ononidis conc. $\text{℥}\text{j}$.
Coque cum

Aquae font. per $\frac{1}{2}$ hor. Colat. $\text{℥}\text{j}$ adde

Oxymell. scillit. $\text{℥}\beta$.

S. Alle Stunden eine halbe Tasse voll.

Anwend. Gegen Nierensteine, Blasenkatarrh.

v. Hildenbrand.

Ovum gallinaceum. Hühnerei.

A. Ovi Albumen; Eiweiss.

Form u. Gabe. Mit Wasser verdünnt als einhüllendes Getränk. Gegen Metall-, besonders Quecksilbersublimatvergiftungen aller 2—3 Minuten 1 Eiweiss mit Wasser. Zu Schnee geschlagen gegen Durchfall, mit Gewürzen zu Augen-, Mundwässern, Linimenten.

Man vermeide Säuren, Salzbilder, starke Basen, viele Erd- und Metallsalze, Gerbestoff, Kreosot, Weingeist, Hitze.

2789. Rx. Albumen ovi j
Aquae rosar. q. s.
F. conquassando spuma.

S. In die Augen zu tröpfeln.

Anwend. Gegen Augenentzündungen.

Richter.

2790. Rx. Sacchari albi $\bar{\text{z}}\beta$
Album. ovor. vj.
Admisce agitando
Aquae fervid. $\bar{\text{z}}\text{xviii}$
„ flor. aurant. $\bar{\text{z}}\text{j}$.

D. S. Aller $\frac{1}{4}$ Stunden den Mund damit auszuspülen, ausserdem 2stündlich 2 Esslöffel davon zu verschlucken.

Anwend. Gegen den durch Quecksilber, besonders durch Sublimat hervorgerufenen Speichelfluss.

Benard.

2791. *Ry.* Olei lini $\bar{3}$ ij
 Albumen ovi j—j β .
 M. intime f. unguent.

S. Salbe.

Unguentum ad ambusta Mynsichti.

Anwend. Gegen Verbrennungen.

B. Ovi Vitellus; Eidotter, Eigelb.

Form u. Gabe. Roh oder gekocht, oder in Brühen, Emulsion, 1—3 Stück. Klystier, Liniment, Salbe.

Man vermeide concentrirte Mineralsäuren, Chlor, Jod und Jodkalien, starke Basen, salpetersaures Quecksilber.

2792. *Ry.* Vitellum ovi β —j
 Aquae font. $\&$ ij.
 Agita in lagena vitrea donec fluidum latescens factum sit. Adde
 Salis culinaris 3β .

S. Als gewöhnliches Getränk.

Potus antatrophicus Hufelandi.

Anwend. Gegen Atrophia mesenterica der Kinder.

2793. *Ry.* Vitella ovar. ij
 Syrup. althaeae $\bar{3}$ j
 Sacchari cand. $\bar{3}\beta$.
 M. f. linctus.

S. Theelöffelweise.

Anwend. In Fiebern, wo die Mundhöhle trocken, heiss, die Zunge excoriirt ist.

G. A. Richter.

2794. *Ry.* Jusculi carnis (s. sale) ℥viiij
 Vini generos. scyath. j
 Vitella ovor. ij.

M. S. Klystier.

Anwend. Zur Ernährung.

Bernstein.

2795. *Ry.* Vitellum ovi j
 Infusi chamomill. ℥iv .

M. S. Zu einem Klystier.

Anwend. Zur Ernährung, auch zur Beseitigung mancher Durchfälle.

v. Hildenbrand.

2796. *Ry.* Juscul. carnis bovin. fort. s. sale ℥iv
 Rad. salep ℥j
 Vitellum ovi j.

S. S. Zu einem Klystier.

Anwend. Zur Ernährung.

2797. *Ry.* Vitellum ovi j
 Olei lini ℥ij .
 Misce probe agitando intime.

S. Salbe.

Anwend. Gegen Verbrennungen.

P.

Paeoniae radix. Pfingstrosenwurzel.

(Gichtrose. Von *Paeonia officinalis* L.)

Form u. Gabe. In Pulver, zu $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{ii}\mathfrak{j}$, mehrmals;
im Aufguss, $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ — $\mathfrak{j}$ auf $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$, esslöffelweise zweistündlich.
Frisch ausgepresster Saft, esslöffelweise.

2798. R_y. Pulv. rad. paeoniae
Lapid. cancror. $\mathfrak{aa}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$
Zinci oxydati gr. $\mathfrak{vj}$
Sacchari albi $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
M. f. pulv. Div. in $\mathfrak{xij}$ part. aequal.

S. Aller 2 Stunden ein Pulver.

Anwend. Gegen Krämpfe der Säuglinge.

Wendt.

2799. R_y. Pulv. rad. paeoniae gr. $\mathfrak{x}$ — $\mathfrak{xx}$
Zinci oxydat. albi gr. $\mathfrak{vii}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{xij}$

Extr. hyoscyami gr. j—ij.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. xij.

S. *Täglich 3mal ein Pulver.*

Anwend. Gegen Epilepsie.

Siedler.

Papaver somniferum L. Mohn.

A. Papaveris capita.

(C o d i a.)

Form u. Gabe. In leichter Abkochung, ℥ij—iv auf ℥iv—vj , esslöffelweise, wegen Unsicherheit des Gehaltes nicht zu empfehlen. Aeusserlich zu Gurgel-, Augen-Wässern, Einspritzungen, Fomentationen, Umschlägen, Klystieren.

2800. R_y. Capita papav. ij
Semin. lini ℥j

Coque per xv—xx sexagesimas in aqu. font. ℥vj .
Colat. adde

Syrup. mellis l. sacchari ℥ij .

S. *Zum Gurgeln.*

Anwend. Bei schmerzhaften Bräunen.

Foy.

2801. R_y. Extr. opii aquos. ℥j .
Solve in

Decoct. capit. papav. ℥vj .

S. *Zu lauwarmen Umschlägen über die Augen.*

Jüngken.

2802. Ry. Flor. verbasci
Capitum papav. āā 3ij.

Conc. M. S. Mit gleichen Theilen Milch und Wasser zu kochen, so dass es nach dem Durchsiehen 3x beträgt.

Clyster anodynus Vogleri.

Anwend. Gegen Gelbsucht, Darmgicht, Magenkrampf und Kolik, falsche Wehen vor und nach der Geburt, bei eingeklemmten Brüchen, Leibesverstopfung mit grosser Reizbarkeit der Gedärme.

Vogler.

2803. Ry. Herbae althaeae
„ verbasci āā 3j
Capit. papav. cont. 3iij.
Coque cum
Aquae fluviat. ad colat. 3viiij
Olei lini 3ß.

M. S. Klystier.

Anwend. Bei Krampf und Entzündung der Därme und in gleichen Fällen wie das vorige.

Radius.

Opium; Mohnsaft.

(*Laudanum, Meconium, Extractum thebaicum, Assion.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Plätzchen, Emulsion, zu gr. $\frac{1}{6}$ — j; bei Starrkrämpfen gr. j — iv, 2—4 mal. Aeusserlich zu Salben, Pflastern, Einspritzungen, Zahnpillen, Klystieren, endermatisch. — Extrakt ebenso, wirkt jedoch etwas schwächer.

Man vermeide starke Säuren, Salzbilder, reine und kohlen-saure Alkalien und Magnesia, Jodkalium, salzs. Natrium, Kalk, Spiessglanz, essigs. Blei, Quecksilber-, Silber-, Kupfer-, Eisen-Salze, Gerbestoff.

2804. *Ry.* Opii puri gr. β
 Sacchari albi $\mathfrak{z}\beta$.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. xij.

S. Aller 2 Stunden ein Pulver.

Anwend. Gegen Delirium tremens. Erfolgt die gewünschte Wirkung nicht, so steigt man mit dem Opium bis zu gr j und in dringenden Fällen bis zu gr. ij. Bei gastrischen Erscheinungen schickt man ein Brechmittel voran.

Barkhausen.

2805. *Ry.* Opii puri gr. ij
 Natri sulphurici sicci $\mathfrak{z}$ ij.
 M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Täglich 2—3 Pulver zu nehmen.

Anwend. Bei chronischen Blutungen aus den Lungen, der Milz, dem Pfortadersystem, wenn bei anderweitiger Indikation für das Opium geringer Grad von Plethora, namentlich aber die Expansion des Blutes dessen Anwendung bedenklich macht.

Pitschaft.

2806. *Ry.* Opii puri gr. vj
 Rad. ipecacuanhae gr. xij
 Sacchari albi $\mathfrak{z}$ j.
 M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Aller 2 Stunden ein Pulver.

Anwend. Gegen Säuferzittern. — Nachdem der entzündliche oder gastrische Zustand beseitigt, um den Aufruhr im Nervensysteme zu besänftigen und die Schlaflosigkeit zu verscheuchen. Man lässt fortfahren, bis der Kranke einschläft, oder die Zunahme seiner Leiden den ferneren Gebrauch des Mohnsaftes verbietet.

Schol. clin. Vindob.

2807. Rx. Opii gr. ij
 Hydrargyr. muriat. mitis gr. iv
 Sacchari albi 3j.
 M. f. pulv. Div. in iv part. aequal.
 S. *Aller 3 Stunden ein Pulver.*
 Anwend. Gegen Bleikolik.

v. Hildenbrand.

2808. Rx. Opii puri gr. j—ij
 Camphorae tritae gr. ij
 Sulphur. depurat.
 Sacchari albi āā 3ß.
 M. f. pulv. Div. in iv part. aequal.
 S. *Aller 3 Stunden ein Pulver.*
 Anwend. Gegen Bleikolik.

v. Hildenbrand.

2809. Rx. Opii puri gr. ij.
 Hydrargyr. muriat. mitis gr. vj
 Sacchari albi 3ij.
 M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.
 S. *Aller 2—3 Stunden ein Stück.*

Anwend. Gegen örtliche Entzündungen nach vorhergegangenen Blutentziehungen, besonders nach Pleuresieen und Pneumonien, bei weichem, kleinem Pulse, gewöhnlich am 5.—6. Tage.

Hufeland.

2810. Rx. Opii puri gr. iv
 Kali nitrici
 Sacchari lactis āā 3jß.
 M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.
 S. *Aller 2—3 Stunden ein Pulver zu nehmen.*
 Anwend. Bei Lungenentzündungen, bei Hämoptysis mit dem

Charakter des Erethismus und bei anderen subinflammatorischen Zuständen, bei noch fortdauernden Schmerzen nach hinlänglicher Anwendung antiphlogistischer Mittel.

Richter.

2811. *Rx.* Opii puri gr. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$
 Ammon. carbon. pyro-oleos. gr. iv—vj
 Piperis nigri gr. iv
 Elaeosacch. menth. gr. x.
 M. f. pulv. Disp. tal. dos. xij.

S. Aller 2 Stunden ein Pulver mit warmem Wein.

Anwend. Gegen Gangraena senilis ex erethismo.

Vogt.

2812. *Rx.* Opii puri gr. iij
 Ammonii carbon. pyro-oleosi 3ß
 Elaeosacch. valerianae 3j.
 M. f. pulv. Div. in vj part. aequal. D. in charta cerata.

S. Aller 3 Stunden ein Pulver mit Fliederthee.

Anwend. Bei nervösen, welken, rasch einsinkenden, missfarbigen und zurücktretenden Exanthemen.

Formey.

2813. *Rx.* Opii puri gr. ij—iv
 Moschi genuini gr. x—xv
 Magnes. albae gr. iv
 Sacchari lactis gr. x.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.

S. Aller 2—4 Stunden ein Pulver in warmem Thee.

Anwend. Bei Tetanus.

Vogt.

2814. *Ry.* Opii puri gr. $\frac{1}{4}$
 Rad. ipecacuanhae gr. β
 „ liquirit.
 Gummi arabici $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{z}\beta$.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj .

S. *Aller 2 Stunden ein Stück.*

Anwend. Gegen einfache rheumatische Ruhr.

Fr. Jahn.

2815. *Ry.* Olei amygdal. dulc. rec. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Pulv. gummi mimos. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Opii puri gr. ij
 Aquae flor. aurant. $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 M. f. l. a. emulsio.

D. S. *Auf 4mal zu nehmen.*

Anwend. Bei Diarrhoea dysenterica.

Reil.

2816. *Ry.* Opii puri gr. iv
 Mucilag. gummi mimos. $\mathfrak{z}\beta$
 Aquae cerasor. nigr. $\mathfrak{z}\text{iv}$
 Syrup. diacodii $\mathfrak{z}\beta$.
 M. f. emulsio.

D. S. *Aller 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.*

Marcus.

2817. *Ry.* Opii pulv.
 Rad. ipecacuanh. pulv. $\bar{a}\bar{a}$ gr. ij
 Vitella ovar. ij .
 Terendo misce sensim cum
 Aquae commun. $\mathfrak{z}\text{j}$

ut f. emulsio, cui adde
Vini stibiat $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Umgeschüttelt, 2stündlich einen Theelöffel.

Anwend. Bei katarrhalischem Husten.

Phoebus.

2818. *Ry.* Opii puri gr. vj
Extr. aquos. colocynthid. $\ni j$.
M. f. l. a. pil. vj.

S. Zur Nacht 1—3 Stück.

Anwend. Gegen venerisches Kopfwegh.

Jos. Frank.

2819. *Ry.* Opii puri gr. v
Herb. digital. purp. pulv.
Rad. ipecacuanhae pulv. $\bar{a}\bar{a}$ $\ni\beta$
Extr. enulae q. s.
F. pil. xxx. Consp. lycop.

S. Aller 3 Stunden eine Pille.

Anwend. Gegen veralteten Husten und gegen Krampfhusten.

Heim.

2820. *Ry.* Opii pulv.
Rad. ipecacuanhae pulv. $\bar{a}\bar{a}$ gr. v
Extr. cascarill. $\bar{3}j$
Catechu pulv. q. s.
F. pil. Lxxv. Consp. cass. cinnam.

S. Täglich 3mal 2 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Diarrhöe aus Atonie.

Heim.

2821. *Ry.* Opii pulv. gr. v
 Olei caryophyll. gutt. iij
 Extr. hyoscyami gr. v.
 „ belladonnae gr. x
 Rad. pyrethri q. s.
 F. pil. xxx. Consp. pulv. rad. pyrethri. D. in vitro.

S. Eine Pille in den hohlen Zahn zu drücken.

Anwend. Gegen Zahnschmerz.

Rust.

2822. *Ry.* Pulv. fol. hyoscyami
 „ flor. papav. rubri āā 3β
 Extr. opii (Beaumi) in aceto vini diffusi gr. vj.
 M. exacte. F. cum aceto epithema molle.

S. Zum Ueberschlagen.

Anwend. Gegen Kopfschmerz hysterischer Frauen.

Brera.

2823. *Ry.* Opii pulv. ʒj—3β
 Olei amygdal. 3ij
 „ chamomill. citrat. 3β.
 M. terendo. D. in vitro.

S. Umgeschüttelt, täglich mehrmals in die Augenbrauengegend einzureiben.

Anwend. Gegen Blepharospasmus bei besonders sensibeln Subjekten.

Weller.

2824. *Ry.* Opii puri g. viij
 Aquae fontan. 3j.

S. S. Zum Befeuchten der Kompresse.

Anwend. Bei gerissenen Wunden, sobald sich Entzündung einstellt, zur Verhütung grosser Schmerzen und des Starrkrampfes.

Belcher.

2825. *Ry.* Opii puri gr. xij—xiv
Aquae destill. ℥ix
Plumbi acet. liqu. gutt. ix—xviij.

S. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Gegen Tripper.

Girtanner.

2826. *Ry.* Extr. opii gr. xv.
Solve in
Aquae destill. ℥jß
„ oxymuriaticae 3ß.

M. S. Umgeschüttelt, 2mal täglich einzuspritzen.

Anwend. Bei Geschwüren der Harnröhre.

Bielt.

2827. *Ry.* Extr. opii gr. iij.
Solve in
Aquae destill. ℥ij
Mucilag. semin. cydon. ℥j.

M. S. Erwärmt und umgeschüttelt täglich mehrmals einzuspritzen.

Anwend. Schmerzstillend bei heftigem Tripper.

Wendt.

2828. *Ry.* Amyli ℥j—ij
Opii pulv. gr. ij—iv.
Bene tritur. et mixtis adde sensim
Aquae frigidae ℥ij.
Adde deinde
Aquae bullientis ℥iv—vj.

M. S. Zum Klystier.

Anwend. Bei Schmerzen vom Krebs des Mastdarms, Fistel, Striktur u. s. w.

Rennie.

2829. *Ry.* Opii puri
Hydrargyr. muriat. mitis āā gr. iij—iv.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.

S. *Mittelst Speichels in die Stirn und Augenbrauengegend einzureiben.*

Anwend. Gegen arthritische und venerische Augenschmerzen.

Rust.

Man mache den Kranken darauf aufmerksam, dass er von diesen Pulvern nichts einnehme.

2830. *Ry.* Unguent. althaeae 3j
Opii puri gr. j—iv.
M. f. unguent.

S. *Täglich 2mal erbsengross einzureiben.*

Anwend. Gegen schmerzhaftes, oder langwierige Entzündung des Thränensackes, neben innerem Gebrauch von Conium, Mezereum oder dergleichen, und täglich einige Stunden Umschlag von Milch und Semmel.

v. Ammon.

2831. *Ry.* Opii puri gr. j
Extr. belladonnae gr. ij.

M. S. *Zum Einreiben.*

Anwend. Gegen syphilitische Augenentzündung 2—3 mal täglich in Stirn- und Schläfengegend einzureiben.

v. Ammon.

2832. *Ry.* Opii puri 3ß
Extr. conii macul. 3j
Unguent. basilici 3ß.
M. exacte f. unguent.

S. *Zum Verband.*

Anwend. Gegen brandige Geschwüre.

Carus.

2833. Rx. Emplastr. opii ℥j
 „ „ byoscyami ʒß.

Mal. S. Abends auf beide Schläfen zu legen.

Anwend. Gegen Schlaflosigkeit nervöser Kranker.

Hufeland.

2834. Rx. Emplastr. albi cocti rec. par ʒiij
 Opii pulv. ʒß.

M. f. emplastr.

S. Pflaster.

Anwend. Gegen Frostballen.

Kopp.

2835. Rx. Opii puri c. paux. aquae in pulvem redacti ʒß
 Alumin. subtiliss. pulv. gr. xv
 Adipis suilli ʒß.

M. f. unguent.

S. Zum Verbande.

Anwend. Bei atonischen Bubogeschwüren.

Simon.

Tinctura Opii simplex; einfache Opium-
tinktur.

(Tinctura thebaica.)

Form u. Gabe. In Tropfen und Mixturen, zu 2—10 Tropfen, 2—3 mal; bei Starrkrampf öfter. Aeusserlich zu Mund-, Gurgel-, Augenwässern, Linimenten, Pinselsäften, Salben, Bähungen, Einspritzungen, Klystieren, Zusatz zu Umschlägen, zu ℥j—iv auf ʒj.

Bemerk. Die Tinkturen sind in verschiedenen Ländern sehr verschieden.

2836. *Ry.* Tinct. opii simpl. gutt. xx
 Aether. nitrici $\bar{3}j$
 Aquae flor. aurant. $\bar{3}vj$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Nachwehen.

Hören die Schmerzen auf, so setzt man aus, und giebt das Mittel von Neuem, wenn sie wieder eintreten. Falls gesäugt werden soll, ist dieses Mittel bedenklich.

Radius.

2837. *Ry.* Tinct. opii simpl.
 Spirit. sulphurico-aether. $\bar{a}a$ $\bar{3}j$
 Liquor. ammon. succin. $\bar{3}ij$.

M. D. S. 15 — 25 Tropfen, nach Befinden wiederholt.

Anwend. Bei hysterischen Krämpfen.

G. A. Richter.

2838. *Ry.* Tinct. opii simpl. $\bar{3}j$
 Acid. sulphurici dilut. $\bar{3}ij$
 Aquae cerasor. nigr. $\bar{3}vj$
 Syrup. rubi idaei $\bar{3}ij$.

*M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel mit Hafer-
 schleim.*

Anwend. Bei kolliquativen Schweissen.

G. A. Richter.

2839. *Ry.* Infusi rosarum $\bar{3}vj$
 Tinct. opii simpl. gutt. xx
 Syrup. cort. aurant. $\bar{3}j$.

*M. D. S. Aller 3 Stunden 1 Esslöffel voll zu
 nehmen.*

Anwend. Bei passivem Blutspucken mit Husten.

Brera.

2840. *Ry.* Tinct. opii simpl.
Aether. sulphuric. āā 3j.

M. S. In die Wange öfters einzureiben.

Anwend. Gegen Zahnschmerzen.

2841. *Ry.* Tinct. opii simpl.
Aether. sulphuric. āā 3ß
Olei caryophyll. ʒj.

M. S. Einige Tropfen mit Baumwolle auf den hohlen Zahn.

Anwend. Gegen Zahnschmerzen von hohlen Zähnen.)

Rust.

Tinctura Opii crocata; safranhaltige Opiumtinktur.

(Laudanum liquidum Sydenhami, Vinum pargoricum; flüssiges Laudanum.)

Form u. Gabe. Drei bis zehn Tropfen, 2—3mal.
Wie die einfache Tinktur.

2842. *Ry.* Tinct. opii crocatae ʒß
Syrup. althaeae
„ senegae āā 3jß.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Theelöffel.

Anwend. Zur Beförderung des Auswurfs.

Berends.

2843. Rx. Mixtur. sulphur.-acidæ ℥j
 Tinct. opii croc. ℥j
 „ cinnamom. ℥iij.

M. S. Halbstündlich 30—40 Tropfen mit etwas Haferschleim.

Anwend. In dringenden Fällen von Metrorrhagie.

Fr. Jahn.

2844. Rx. Tinct. opii crocatae
 Aether. acetic. āā ℥j
 Aquae destill. ℥v
 Syrup. flor. aurant. ℥j.

M. S. Aller 1—2 Stunden 1/2—1 Esslöffel.

Anwend. Als Analepticum.

Sundelin.

2845. Rx. Tinct. opii crocat.
 Aquae rosar.
 Mucilag. semin. cydonior. āā ℥β.

M. D. S. Täglich 4 mal einige Tropfen lauwarm in's Auge zu tröpfeln.

Vogt.

2846. Rx. Spirit. vini rectific. ℥iij
 „ „ camphor. ℥ij
 Tinct. opii crocat.
 Olei cocos butyraceae āā ℥j.

M. S. Auf Baumwolle in's Ohr zu bringen.

Anwend. Gegen Zahnschmerzen verschiedenster Art sehr wirksames Linderungsmittel.

M. E. A. Naumann.

2847. *Ry.* Tinct. opii crocat. $\bar{3}j - ij$
 Mucilag. gumm. mimos. $\bar{3}\beta$
 Aquae commun. $\bar{3}vj$.

M. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Gegen Urethralgie.

Vogt.

2848. *Ry.* Liniment. saponato-camphorat. $\bar{3}j$
 Laudan. liquidi $\bar{3}j$.

M. S. Viermal täglich so viel als eine Haselnuss
 beträgt in die Herzgrube einzureiben.

Anwend. Gegen Gastrodynie.

v. Hildenbrand.

2849. *Ry.* Unguent. althaeae $\bar{3}ij$
 Camphorae
 Laudan. liquidi $\bar{a}\bar{a} \bar{3}j$.

M. S. Täglich einigemal einige Quentchen auf
 den Unterleib einzureiben und warmen Flanell
 darüber zu binden.

Anwend. Bei allen krampfhaften Bewegungen der Gedärme.
 Oft kann man durch ihre Hülfe der Entzündung vorbeugen.

Selle.

2085. *Ry.* Amyli $\bar{3}j\beta$.
 Solve in
 Aquae commun. $\bar{3}ij$.
 Adde
 Aquae fervid. $\bar{3}ij$
 Tinct. opii crocat. gutt. v—x.

M. S. Zum Klystier.

Anwend. Anhaltendes und schmerzlinderndes Klystier gegen
 kolliquative Durchfälle.

Berends.

Morphium; Morphin.

(*Morphinum, Morphia, Opiumalkaloïd.*)

Form u. Gabe. In Pulver, nicht gern in Lösung, wie das folgende. Endermatisch.

Man vermeide Säuren, Salzbilder, Chlorkalk, salzsaures Gold, salpetersaures Silber, Quecksilber-, Kupfer-, Blei- und Eisensalze.

2851. Ry. Morphii gr. ij—iij
Sulph. stibiat. aurant. gr. iv
Extr. fol. digital. purp. gr. xij.
F. c. mucilag. gumm. mimos. pil. vj. Consp. lycop.

S. Abende 1 Pille.

Anwend. Gegen Lungenschwindsucht | zur Linderung der Leiden, und um nächtliche Ruhe zu verschaffen.

Ebers.

2852. Ry. Morphii gr. β
Aquae destill. ʒjβ
Syrup. capit. papav. ʒj.

S. D. S. Vor Schlafengehen auf einmal zu nehmen.

Anwend. Bei hartnäckiger Schlaflosigkeit, heftigen Schmerzen.

Brera.

Morphium aceticum; essigsaures Morphin.

(Acetas morphicus.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Lösung, zu gr. $\frac{1}{8}$ —j, 1—2mal. Aeusserlich anatripsologisch und endermatisch, zu gr. β —j; zu Salben, Linimenten, gr. j—iv auf $\bar{3}j$; Klystier, gr. β —j.

Man vermeide stärkere Säuren, Salzbilder, reine und kohlensaure Alkalien und Magnesia, Jodkalium, salzsaures Natrum, Eisen und Gold, salpetersaures Silber.

2853. *Ry.* Morphii acetici gr. j—iij
Syrup. sacchari $\bar{3}iij$.

S. S. Aller 3 Stunden 1 Theelöffel.

Anwend. Um Schlaf zu machen. Ueberhaupt um den unsichern Syrup. diacodii zu ersetzen.

Magendie.

2854. *Ry.* Morphii acetici gr. xvj
Aquae destill. $\bar{3}j$
Acidi acetici gutt. iij—iv
Alcohol. $\bar{3}j$.

S. S. 6—24 Tropfen zu nehmen.

Anwend. Um das flüssige Laudanum, die Opiumtinktur u. s. w. zu ersetzen.

Magendie.

2855. *Ry.* Morphii acetici gr. ij
Extr. digital. purp. gr. xvj.
M. exacte, f. pil. vj. Consp. lycop.

S. Abends 1 Pille.

Anwend. Bei Lungenschwindsucht zur Linderung der Leiden, und um nächtliche Ruhe zu verschaffen.

Ebers.

2856. *Ry.* Morphii acetici gr. j—ij.

Solve in

Aquae destill. $\bar{z}$ vj

Syrup. cort. aurant. $\bar{z}\beta$.

M. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. In der Epilepsie.

v. Hildenbrand.

2857. *Ry.* Morphii acetici gr. ij

Sacchari albi $\bar{z}$ iv.

M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. Aller 2—3 Stunden 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. Gegen Zufälle, die von zu grossen Gaben oder anhaltendem Gebrauche des Strychnins oder des Extr. nuc. vomic. spirit. entstehen.

Fricke.

2858. *Ry.* Morphii acetici gr. j

Conserv. flor. aurant. gr. xvj.

M. f. pil. viij.

S. Aller 6 Stunden 1—2 Stück zu nehmen.

Anwend. In Neuralgieen, krebshaften Affektionen u. s. w.

Edwards & Vavasseur.

2859. *Ry.* Morphii acetici gr. j

Pulv. fol. digital. purp. gr. viij

Micae panis et

Mellis despumat. q. s. ut f. pil. vj.

S. Aller 2 Stunden 1 Stück.

Anwend. Gegen zu grosse Aufregung des Gefässsystems.

Brera.

2860. *Rx.* Morphii acetici gr. xv
 Cupri sulphurico-ammoniat. 3ß
 Fellis tauri inspiss.
 Ligni quassiae pulv. āā ʒiv.
 M. f. pil. C. consp. lycop.

S. *Früh und Abends 5 Stück.*

Anwend. Gegen Diabetes mellitus.

Berends.

2861. *Rx.* Morphii acetici gr. vj—x
 Olei amygdal. dulc. 3j.
M. S. *Einigemal täglich 2—3 Tropfen in die Augenbrauengegend einzureiben.*

Anwend. Gegen Augenlidkrampf und Glaukom.

Rosas.

Gegen gichtische und rheumatische Augenentzündung.

Radius.

2862. *Rx.* Morphii acetici gr. iv
 Unguent. hydrargyr. ciner.
 „ simpl. āā 3ij.
 M. f. unguent.

S. *Zum Einreiben.*

Anwend. Bei Mutterkrebs täglich zweimal einer Erbse gross in die Schamgegend einzureiben.

v. Hildenbrand.

2863. *Rx.* Morphii acetici gr. vj—viij
 Axung. porci 3j—ij.
 M. f. unguent.

S. *Zum Einreiben auf die von der Oberhaut entblösste Stelle.*

Anwend. Gegen Nervenschmerzen, heftige rheumatische Schmerzen.

Radius.

Morphium muriaticum; salzsaures
Morphium.

(*Hydrochloras morphicus.*)

Form u. Gabe. Wie bei dem essigsauren Mor-
phium.

Morphium sulphuricum; schwefelsaures
Morphium.

(*Sulphas morphicus.*)

Form u. Gabe. Wie bei dem essigsauren Mor-
phium.

Bemerk. Wenn sich der Kranke an ein Mor-
phiumsalz gewöhnt hat, so thut ein anderes oft bessere Dienste.

2864. Rx. Morphii sulphurici gr. j—ij
Syrup. sacchari $\overline{\text{z}}$ ij.

S. S. Aller 3 Stunden einen Theelöffel.

Anwend. Zum Krampfstillen, Schlafmachen.

Magendie.

Bei tuberkulöser Lungenschwindsucht.

Radius.

2865. Rx. Morphii sulphurici gr. j
Pulv. rad. ipecacuanhae gr. ij
Olei amygdal. dulc. gutt. xij
Extr. aconiti gr. vj
Pulv. rad. liquirit.

Mellis despum. āā q. s.
F. l. a. boli vj.

S. Aller 3 Stunden ein Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen gichtische und rheumatische Schmerzen.

Brera.

B. Papaveris albi semina; Mohnsamen.

Form u. Gabe. *In Emulsion, 3iij—vj auf 3vj—viij.*

2866. *Rx.* Semin. papav. albi 3iij—vj
Aquae font. l. ceras. nigr. 3iv—viij.
Contunde. F. l. a. emulsio.
Sacchari albi 3j—iij.

M. S. Aller 2—3 Stunden eine halbe Obertasse voll zu trinken.

Emulsio papaverina. Mohnmilch.

Anwend. Als beruhigendes, einhüllendes Mittel in entzündlichen oder fieberhaften Krankheiten.

2867. *Rx.* Semin. papav. 3ij
Aquae commun. 3iij
F. l. a. emulsio. Colat. adde
Aquae laurocerasi 3ß.

M. S. Einigemal täglich, umgeschüttelt und erwärmt einzuspritzen.

Anwend. Als schmerzstillend bei heftigem Tripper.

Schlegel.

Papaveris albi oleum; Mohnöl.

Form u. Gabe. In Emulsion gleich dem Mandelöl.

2868. Rx. Olei papav. albi ℥ijß
 Pulv. gummi mimos. ℥ij
 Aquae cinnam. ℥ij
 „ fontan. ℥iv.
 F. l. a. emulsio, cui adde
 Natri phosphorici ℥j
 Syrup. althaeae ℥ß.

M. D. S. Alle Stunden 2 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Als Abführmittel.

Horn.

Pechurim faba. Muskatbohne.

(F. Pichurim; Pechurim-, Brasilianische Bohne.
 Von Laurus Pechurim L. Laurus discolor
 Hornm.)

Form u. Gabe. In Pulver, Morsellen, zu ʒß—jß,
 einigemal täglich; selten in Aufguss, ʒß—j auf 2 Tas-
 sen als Thee.

2869. Rx. Fabar. pechurim
 Sacchari albi āā ℥ß.
 M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.
 D. S. Täglich 4 Pulver zu nehmen.

Anwend. Gegen Leukorrhoe.

Pharm. paup. Hamb.

2870. *Ry.* Fabar. pechurim gr. xv
 Elaeosacch. cinnamomi ʒß.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj in charta cerata.

S. *Aller 3 Stunden ein Stück.*

Anwend. In typhösen Diarrhöen und in der Ruhr.

Voigtel.

2871. *Ry.* Sacchari albi ʒvj.
 Coque cum
 Aquae commun. q. s. ad consist. tabul.
 Adde
 Pulv. flaved. cort. aurant. curass.
 „ fabar. pechurim āā ʒiij.
 F. l. a. morsuli xxx. Dent. in scatula.

S. *Täglich 3mal ein Stück.*

Phoebus.

2872. *Ry.* Fabar. pechurim ʒj—ʒß
 Flor. lamii albi ʒjß.
 Conc. et cont. M. Dent. tal. dos. xij.

S. *Morgens, Nachmittags und Abends ein Päckchen mit einer Tasse kochenden Wassers aufzugießen und nach dem Ausziehen zu trinken.*

Anwend. Gegen weissen Fluss.

Es muss anhaltend gebraucht werden.

Kopp.

Petroleum crudum et rectificatum. Rohes und gereinigtes Steinöl.

(*Oleum petrae, Bitumen petroleum L.; Bergöl.*)

Form u. Gabe. Auf Zucker, in Pillen, Bissen, Mixturen, zu 10 — 30 Tropfen, einigemal. Aeusserlich zu Einreibungen, Waschungen, Salben, Pflastern.

Man vermeide besonders Salzbilder, namentlich Chlor.

2873. *Ry.* Petrolei rectificati $\bar{3}ij$
Tinct. rad. scillae Ph. Hass. $\bar{3}j$
Spirit. juniperi $\bar{3}vj$.

M. S. Täglich 3 — 4 mal 40 Tropfen mit einem urintreibenden Getränke zu nehmen.

Anwend. Bei Wassersucht.

Vogt.

2874. *Ry.* Olei petrae $\bar{3}\beta$
Tinct. asae foetidae $\bar{3}vj$.

M. S. Täglich 4 mal 40 Tropfen.

Anwend. Gegen Bandwurm.

Schwarz.

2875. *Ry.* Petrolei rectificati $\bar{3}\beta$
Olei terebinth. $\bar{3}j$
Spirit. juniperi $\bar{3}iv$.

M. S. Täglich 2 — 3 mal erwärmt die Lendengegend damit zu waschen.

Anwend. Gegen Wassersucht mit Torpidität der Harnorgane.

Vogt.

2876. *Ry.* Petrolei depurat. $\text{℥j}\beta$
 Ungt. nervini ℥j .
M. f. unguentum.

S. In die Lendengegend einzureiben.

Anwend. Bei Unthätigkeit der Nieren, Wassersucht.

Radius.

2877. *Ry.* Petrolei crudi $\text{℥j}\beta$
 Spirit. saponis ℥j .

M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Frostbeulen, zur Zertheilung asthenischer Geschwülste.

Saunders.

2878. *Ry.* Petrolei crudi ℥j
 Liqu. ammon. caustic. ℥ij .

M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen erfrorene Glieder.

G. A. Richter.

2879. *Ry.* Petrolei $\text{℥}\beta$
 Spirit. lavandul. ℥j
 Tinct. opii simpl. ℥ij .

M. S. Zum Waschen.

Anwend. Gegen erfrorene Glieder.

G. A. Richter.

252 PETROLEUM CRUDUM ET RECTIFICATUM.

2880. *Ry.* Petrolei 3iij
Camphorae ʒj
Ungt. cerei ʒjß.
M. f. unguentum.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen erfrorene Theile.

Sundelin.

2881. *Ry.* Petrolei ʒj
Camphorae ʒß
Alcohol. gutt. XL.

M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen chronische Krankheiten, besonders Anschwellungen der Gelenke.

Ellis.

2882. *Ry.* Resin. pini burg. ʒß.
Leni calore liquef. admisce
Camphorae trit. ʒj
Opii pulv. ʒß
Petrolei crudi q. s.
F. l. a. emplastrum.

S. Auf Leder zu streichen.

Anwend. Gegen chronischen Rheumatismus.

G. A. Richter.

Phellandrii semina. Wasser-
fenchelsamen.

(*Foeniculi aquatici semina*; Rossfenchelsamen.
Von *Phellandrium aquaticum* L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Lattwerge, zu
℥ß—ij, einigemal täglich; im Aufguss, ℥iij—vj auf ℥vj,
esslöffelweise.

2883. Rx. Semin. phellandr. aquat. ℥iij.

Inf. cum s. q.

Aquae ferv. ad colat. ℥vj.

S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel

Anwend. Gegen Lungenschwindsucht. Auch bei grossem Ere-
thismus der Blutgefässe, Blutspeien. Narkose brachte es
nie hervor.

Klose in Königsberg.

2884. Rx. Semin. phellandr. aquat. ℥ß

Herb. digital. purp. ℥ß—j.

Infunde

Aquae ferv. q. s. ad colat. ℥iv.

Spirit. nitrico-aether. ℥j

Syrup. althaeae ℥ß.

M. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Bei pituitöser Lungensucht.

Jahn.

2885. Rx. Semin. phellandr. aquat. ℥ij.

Infunde cum

Aquae ferv. q. s.

Digere per $\frac{1}{2}$ hor. vase clauso. Colat. expr. et
refrig. $\bar{3}$ vj adde

Liqu. ammon. anisati $\bar{3}$ ij

Syrup. simpl. $\bar{3}\beta$.

M. S. Stündlich 1—2 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Lungenschwindsucht.

Remer.

2886. *Ry.* Lichen. island.

Cort. chinae reg. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$.

Conc. et cont. coque in aquae font. q. s.

Sub finem coct. infunde

Semin. phellandr. aquat. cont. $\bar{3}\beta$

„ anisi stellati cont. $\bar{3}$ ij.

In colat. $\bar{8}$ j solve

Pastae althaeae $\bar{3}$ j.

M. S. Aller 3 Stunden eine halbe Tasse voll.

Anwend. Gegen chronisches Lungenleiden.

S. G. Vogel.

2887. *Ry.* Semin. phellandr. aquat. $\bar{3}$ j

Caul. dulcamar. $\bar{3}$ ij.

Coque in aquae font. q. s.

Colat. $\bar{3}$ viiij adde

Emulsionis gummi arab. $\bar{3}$ ij

Oxymell. simpl. $\bar{3}$ j.

D. S. Früh auf zweimal zu nehmen.

Anwend. In der Lungensucht, besonders um die mangelnde Vitalität der Brusthäute zu unterstützen.

Brera.

2888. *Ry.* Semin. phellandr. aquat. $\bar{3}$ j

Gummi arab. $\bar{3}$ j.

Contere sensim affundendo

Aquae $\bar{3}$ ix.

Cola, decanta et adde

Syrup. sacchari $\bar{3}$ j.

D. S. Löffelweise zu nehmen.

Anwend. Gegen hartnäckige, katarrhalische Beschwerden.

van Mons.

2889. *Ry.* Semin. phellandr. aquat.

Sacchari lactis $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ j β .

M. f. pulv. Div. in vj part aequal.

S. Täglich 3—4mal ein Pulver.

Anwend. In der Lungensucht.

Hufeland.

2890. *Ry.* Pulv. semin. phellandr. aquat.

Sacchari lactis $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ β

Gummi myrrhae $\bar{3}$ ij

Hepat. sulphur. $\bar{3}$ ij.

M. f. pulv. subtiliss. D. ad scatulam.

S. Täglich 4—6mal einen Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Lungenverschleimung als grosses und hülfreiches Expectorans.

Jahn.

2891. *Ry.* Semin. phellandr. aquat. pulv. $\bar{3}$ j

Plumbi acetici gr. vj

Extr. quassiae $\bar{3}$ j.

M. f. pil. lx. Consp. pulv. liquirit.

S. Täglich 3mal 2—4 Stück zu nehmen.

Anwend. In der chronischen Bronchitis.

Kopp.

•••••

Phosphorus. Phosphor.

Form u. Gabe. In Auflösung in Aether oder Oelen, Emulsion, zu gr. $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$, 2—3mal. Aeusserlich als Causticum, ferner zu Salben, Linimenten, gr. ij—viij auf $\mathfrak{zj}$ Fett oder Oel.

Man vermeide Licht. Beim innerlichen Gebrauche meide der Kranke saure oder leicht Säure im Körper erzeugende Speisen; beim äusserlichen Gebrauche warne man den Kranken sich keiner Flamme zu nähern.

2892. Rx. Phosphori gr. ij—iij.

Solve in

Aether. sulphurici $\mathfrak{z}\beta$

Ess. menth. piperit. $\mathfrak{zj}$.

S. Aller 3—4 Stunden 2—6—8 Tropfen auf Zucker.

Aether sulphurico-phosphoratus Lobsteinii.

Anwend. Bei Epilepsie, Lähmungen, schwarzem Staare und manchen Flechten.

Foy.

2893. Rx. Phosphori gr. ij.

Solve in

Olei terebinth. rectific. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Det. in vitro charta nigra obducto.

S. Täglich 4 mal 15 Tropfen in einer Tasse Althaeadekokt.

Anwend. Gegen hartnäckige Wechselfieber.

Hufeland.

2894. *Ry.* Phosphori gr. j.

Solve in

Olei animal. aether. $\bar{3}j$

„ caryophyllor. v. valerian. $\bar{3}j$.

M. S. Täglich 2—3mal 2—10 Tropfen.

Anwend. Bei Epilepsie, Lähmungen, schwarzem Staare u. s. w.

Löbenstein - Löbel.

2895. *Ry.* Phosphori gr. j.

Solve in

Olei cajeputi $\bar{3}j\beta$.

D. in vitro charta nigra obducto.

S. Umgeschüttelt, täglich 3mal 4—6 Tropfen in Wein.

Anwend. Gegen Paralysen.

Sundelin.

2896. *Ry.* Phosphori gr. ij

Aether. sulphur. $\bar{3}j$

Olei animal. aether. gr. x.

S. S. Täglich 3—6 Tropfen in einer Tasse Eibischthee.

Anwend. Gegen torpide Amaurose.

Rosas.

2897. *Ry.* Phosphori gr. j.

Solve leni calore in

Olei papav. rec. par. $\bar{3}j\beta$.

Adde

Gummi mimos. pulv. $\bar{3}j$

et terendo sensim misce cum

Syrup. flor. aurant. $\bar{3}j$

Aquae cerasor. $\bar{3}ij$.

D. S. Umgeschüttelt, 2stündlich einen halben bis ganzen Esslöffel.

Phoebus.

2898. *Ry.* Phosphori gr. j.
 Solve leni calore in
 Olei amygdal. $\bar{3}\beta$
 Gummi mimos. pulv. $\bar{3}ij$.
 Terendo sensim misce cum
 Syrup. zingiber. $\bar{3}j$
 Infusi serpentar. virgin. ($\bar{3}\beta$) $\bar{3}iv$.
 F emulsio, cui adde
 Spirit. sulphur.-aether. (Liqu. ammon. succin.) $\bar{3}j$.

M. S. Umgeschüttelt, aller 1—2 Stunden einen
 Esslöffel.

Anwend. Gegen Lähmungen, Epilepsie u. s. w.

Lockstädt.

2899. *Ry.* Phosphori gr. x
 Camphorae $\bar{3}ij$
 Axung. porci $\bar{3}j$
 M. exacte; f. unguentum.

S. Täglich 2mal einzureiben.

Anwend. Gegen Lähmungen.

Hufeland.

2900. *Ry.* Phosphori gr. iv
 Olei terebinth.
 „ lini $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$
 Camphorae $\bar{3}\beta$ —j.
 M. intime; f. unguentum.

S. Täglich 2mal einzureiben.

Anwend. Gegen Lähmungen und veraltete Gicht.

Hufeland.

2901. *Ry.* Phosphori gr. ij
 Olei animal. aether. $\bar{3}$ ij
 „ menth. pip. $\bar{3}\beta$ —j.

S. S. In der Augengegend einzureiben.

Anwend. Gegen nervöse Amblyopie und Amaurose, auch gegen Lähmung der Augenlider.

Löbenstein - Löbel.

2902. *Ry.* Phosphori gr. iv
 Camphorae $\bar{3}$ j— $\bar{3}\beta$
 Olei amygdal. dulc. $\bar{3}\beta$.

S. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Lähmungen, Kontrakturen.

Andr. Haase.

2903. *Ry.* Phosphori concisi gr. xv
 Olei amygdal. dulc. (Olei lini) $\bar{8}\beta$.
 Solve leni calore. Post refrig. cola.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Lähmungen.

2904. *Ry.* Phosphori $\bar{3}$ ij.
 Solve in
 Olei sabinae
 „ terebinth. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$
 Liqu. ammon. caustic. $\bar{3}$ ij.
 M. f. liniment.

S. Täglich nach dem Bade einzureiben.

Anwend. Gegen festsitzende, veraltete Gicht im Knie und Fussgelenk.

Göden.

2905. *Ry.* Phosphori gr. iij—iv
 Camphorae gr. xij
 Olei carvi destill. ℥iij.

S. S. Täglich 3 mal in die Magengegend, die Brust und zwischen die Schultern langsam einzureiben.

Anwend. Bei Keuchhusten.

Löbenstein-Löbel.

Pimpinellae albae radix. Weisse
 Bibernel-Wurzel.

(*Pimpinellwurzel. Von Pimpinella saxifraga L., Tragoselinum minus Lam.*)

Form u. Gabe. Nicht gern in Pulver, eher in Pillen, Bissen, Trochisken, zu gr. v—xv, einigemal; besonders im Aufguss, wässerigem oder geistigem, ℥ij—iv auf ℥vj, 2 stündlich esslöffelweise. Mund- und Gurgelwasser, ℥ij—iv auf ℥vj. Extrakt, in Lösung, Pillen, ℥ß—j, 3—4 mal. Tinktur, 20—60 Tropfen, einigemal.

2906. *Ry.* Rad. pimpinell. albae ℥iij.
 Infunde
 Aquae font. q. s.
 Digere per ½ hor. ad colat. ℥iv
 Syrup. althaeae ℥ß.

S. Aller 2 Stunden einen halben Esslöffel voll.

Anwend. Gegen chronische Heiserkeit und übermässige Schleimabsonderung in den Luftröhrenästen.

Radius.

2907. *Ry.* Rad. pimpinell. $\overline{3}\beta$
 Aquae commun. bullient.
 Vini gallici albi $\overline{aa}$ $\overline{3}ij$.
 Digere per $\frac{1}{4}$ hor. Colat. refriger. adde
 Spirit. cochlear. $\overline{3}\beta$.

M. D. S. Zweistündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Bei Verschleimung.

G. A. Richter.

2908. *Ry.* Rad. pimpinell. subtiliss. pulv.
 „ zingiber. subtiliss. pulv. $\overline{aa}$ $\overline{3}ij$
 Elaeosacch. caryophyllor. $\overline{3}\beta$
 Mucilag. gumm. mimos. q. s.
 F. trochisci xxx.

S. Bisweilen 1 Stück im Munde zergehen zu lassen und langsam zu verschlucken.

Anwend. Bei atonischer, paralytischer Bräune.

Vogt.

2909. *Ry.* Tinctur. pimpinell. $\overline{3}\beta$
 Kali acetici $\overline{3}ij$.

S. S. Viermal täglich 20—80 Tropfen.

Anwend. Als harntreibendes Mittel.

Burdach.

2910. *Ry.* Tinctur. pimpinellae $\overline{3}ij$
 Oxymell. scillit.
 Syrup. althaeae $\overline{aa}$ $\overline{3}j$.

M. S. Theelöffelweise langsam zu verschlucken.

Anwend. Gegen chronische Heiserkeit.

Reil.

2911. Rx. Tinctur. pimpinellae $\bar{3}\beta$.

S. 20—60 Tropfen auf Zucker langsam zu verschlucken.

Anwend. Bei den ersten Symptomen beginnender Bräune, um dem Ausbruch noch vorzubeugen.

Günther.

2912. Rx. Tinctur. pimpinellae albae $\bar{3}\beta$
Aquae amygdal. amar. conc. $\bar{3}ij$.

M. S. Aller 2 Stunden 20—30 Tropfen.

Anwend. Gegen Herzklopfen und hervorstechende Reizbarkeit der Blutgefäße u. s. w., von Hämorrhoidalanlage herührend. Ueberhaupt würdigt man die blutverdünnende und blutzertheilende Kraft der Pimpin. alba nicht genug nach

Pitschaft.

2913. Rx. Tinctur. pimpinellae albae $\bar{3}\beta$
Alumin. crudi $\bar{3}ij$
Aquae fontan. $\bar{3}x$.

M. S. Zum Gurgeln.

Anwend. Gegen erschlafenes und herabhängendes Zäpfchen.

Selle.

2914. Rx. Rad. pimpin. albae $\bar{3}\beta$
Hord. excort. $\bar{3}vj$
Coque cum
Aquae font. q. s. ad colat. $\bar{3}viii$
Tinctur. pyrethri $\bar{3}vj$
Mellis rosati $\bar{3}j$.

M. S. Gurgelwasser.

Anwend. Gegen atonische, paralytische Bräune.

Vogt.

2915. Rx. Rad. pimpinellae
Herb. salviae
Flor. malvae arbor. āā 3j.
Conc. M. S. Den 4. Theil mit 2 Tassen kochenden Wassers anzubrühen, zum Gurgelwasser.
Anwend. In ähnlichen Fällen.

Phoebus.

- 2916 Rx. Tinctur. pimpinell.
Spirit. sulphurico-aether. āā 3ij
Tinct. aromat. 3j
Olei caryophyllor. gutt. xij.
M. S. Auf Baumwolle geträpfelt in den Zahn zu bringen.
Anwend. Gegen Zahnschmerz.

2917. Rx. Rad. pimpinellae 3ij.
S. Zum Kauen.
Anwend. Gegen Zungenlähmung.

Pinus. Tanne, Fichte, Lerche.

(Von *Pinus picea* L., *Pinus Abies* L., *Pinus sylvestris* L., *Pinus Larix* L.)

A. Pinituriones; Kiefersprossen (Fichtensprossen).

Form u. Gabe. In Aufguss oder leichter Abkochung mit Wasser, Bier, Wein, 3ß—j auf 3xij.

2918. Rx. Tirion. pini
„ juniperi

Rad. ononid. āā 3ij—iij
 Semin. petroselini 3ij.
 C. C. f. spec. D. tal. dos. vj.

S. Jede Portion mit 8j Wasser abzukochen und täglich zu verbrauchen.

Anwend. Gegen Wassersucht torpider Art neben andern harn-treibenden Mitteln.

Vogt.

2919. *Ry.* Turion. pini 3ß
 Herb. absinth. 3iij
 Rad. gentian. rubr. 3ij.
 C. macer. per ij—iij dies in cerevisiae 8v. Filtr.

S. Täglich 3—4 Tassen.

Bitteres Bier.

Anwend. Als stärkendes, wurmtreibendes und harntreibendes Mittel.

2920. *Ry.* Turion. pini 3iv
 Ligni sassafras
 Semin. petroselini āā 3j
 Baccar. juniperi
 Rad. liquirit. āā 3ß.
 C. C. M. f. spec.

D. S. Den 6. Theil mit 4—5 Tassen heissen Wassers übergossen 1/2 Stunde an einer heissen Stelle ziehen gelassen, durchgeseiht, täglich zu verbrauchen.

Anwend. Bei torpider Wassersucht.

Ptoebus.

2921. *Ry.* Herb. cochlear. rec. inc. 3jß
 Rad. armorac. ras. 3ij
 Turion. pini incis. 3j

Cerevisiae ℥iv.

Macera per iil horas.

Colat. S. Täglich 3mal oder öfter 1 Weinglas.

Anwend. Antiskorbutisches Mittel.

Plenk.

B. Pini resina; Fichtenbarz.

(*Resina alba, abietina, flava, Pix burgundica; burgundisches, weisses Pech.*)

Form u. Gabe. Selten innerlich in Pillen, ʒß—j, 2—3mal. Aeusserlich zu Pflastern, Salben, Räucherungen.

2922. Rx. Picis burgund. ʒv
Mucilag. gumm. arab. q s.
F. pil. C. Consp. lycop.

S. Täglich 3mal 6—8 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Flechten. — Bei sehr reizbaren Personen und bei Neigung zu aktiven Blutflüssen zu meiden.

Ulrich.

2923. Rx. Sevi bovini ʒj
Cerae flavae ʒß
Resin. burgund. ʒj
Terebinth. ʒij
Olei olivar. ʒiiij.

M. f. unguent.

S. Auf Leinwand überzulegen.

Anwend. Bei Frostschäden.

2924. Rx. Resinae pini ʒj
Cerae flavae ʒß

Olei empyreum. tartari 3j.
Liqua simul.

S. Auf Leder zu streichen und auf das Rückgrath zu legen.

Anwend. Bei Rhachitis der Kinder.

2925. *Ry.* Emplastri cerussae
 " lithargyri comp. āā 3xv
 Picis burgund. 3x.

M. S. Heftpflaster für den Sommer.

Martius.

2926. *Ry.* Emplastri cerussae 3xx
 " lithargyri simpl.
 Picis burgund. āā 3x.

M. S. Heftpflaster für den Winter.

Martius.

2927. *Ry.* Picis burgund. 3j
 Gummi euphorbii 3ij.
 Leni calore liquatis et fere refrigeratis admisce
 Semin. sinapeos subtiliss. pulv. 3j
 Olei terebinth. 3ß.
 F. emplastr.

S. Auf Leder zu streichen.

Anwend. Als gelind ableitendes Mittel.

D'Alquen.

Colophonium; Geigenharz.

Form. *Streupulver, Pflaster.*

2928. *Ry.* Colophonii
Gumm. mimosae $\overline{aa}$ $\overline{3}\beta$.
M. f. pulv. subtiliss.

S. *Streupulver.*

Anwend. Bei veraltetem Prolapsus ani 3—4mal täglich den Mastdarm zu bestreuen.

v. Klein.

2929. *Ry.* Colophonii $\overline{3}ij$
Gummi mimosae
Carbon. ligni $\overline{aa}$ $\overline{3}\beta$.
F. pulvis.

S. *Zum Aufstreuen.*

Anwend. Gegen traumatische Blutungen, selbst aus grösseren Blutgefässen. Es wird auf Charpie gestreut und mittelst einer einfachen Binde festgehalten.

Bonnafoux.

2930. *Ry.* Colophonii pulv. $\overline{3}j$.

S. *Zum Aufstreuen.*

Anwend. Bei Hygroma patellae und bei nicht entzündlichen, kalten Anschwellungen des Kniegelenkes nimmt man Werg oder Hanf und ballt dieses in Form eines Vogelnestes, streut Colophonium dick in die Vertiefung hinein, legt diess über die Geschwulst und begiesst das Ganze mit Spirit. vini rectif. Dadurch wird eine Paste gebildet, die sich, indem man das Begiessen täglich wiederholt, ganz fest um das Knie anlegt.

List. Jak. van Lil.

C. Pix navalis; Schiffpech.

(*Resina pini empyreumatica solida; schwarzes Pech.*)

Form u. Gabe. Selten innerlich, zu gr. v — xx, einigemal in Pillen. Aeusserlich als Pflaster.

D. Pix liquida; Theer.

(*Resina pini empyreumatica liquida; flüssiges Pech.*)

Form u. Gabe. Im wässerigen Auszug, $\mathfrak{z}\text{j}$ auf $\mathfrak{z}\text{xij}$; in Pillen, gr. ij — iv — xx, 3mal täglich. Aeusserlich zu Salben, Pflastern, Dämpfen.

2931. Rx. Picis liquidae $\mathfrak{z}\text{j}$
Aquae fontanae $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Agita interdum cum spatula lignea. Decem diebus praeterlapsis decanta et filtra.

S. Theerwasser; täglich zwei- oder mehreremal tassen- oder glasweise mit Milch, Hafergrütze u. s. w. versetzt.

Anwend. Bei Katarrhen, manchen Hautkrankheiten, Skorbut.

Dupuytren benutzte es als Einspritzung bei Schleimflüssen der Blase und Harnröhre.

2932. Rx. Picis liquidae
Balsami peruviani $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\beta$
Pulv. liquirit. $\mathfrak{z}\text{j}$

„ irid. florent. $\mathfrak{z}\text{iiij}$.

M. f. pil. gr. iij. Consp. irid. flor.

S. Täglich 2mal 10 Stück.

Anwend. Bei Lungenschwindsucht.

2933. *Ry.* Picis liquidae $\bar{3}j$
 Axungiae $\bar{3}iv$
 Tinct. opii $\bar{3}j$.
 M. f. unguent.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Hautjucken.

Hôp. St. Louis.

Dieselbe Mischung, ohne Tinct. opii, wurde später mit Nutzen auch gegen Krätze, von Emery gegen Psoriasis und Lepra vulgaris angewendet. Täglich werden 2 Einreibungen über den ganzen Körper gemacht; alle 2 Tage Schwefelbäder genommen; Limonade sulphurique (16 Tropfen auf 1 Liter) als Tisane gegeben.

2934. *Ry.* Picis liquidae $\bar{3}ij$
 Axung. porci $\bar{3}j$.
 M. f. unguent.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Krätze, in Verbindung mit Schwefel- und Laugenbädern.

Duchesne - Duparc.

2935. *Ry.* Sebi ovilli
 Picis liquidae $\bar{a}a$ $\bar{3}\beta$.
 Leni calore liquefact. misce.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Bei Lepra.

Willan.

E. Terebinthina; Terpenthin.

(*Terebinthina laricina* s. *veneta*, *Terebinthina communis*; venedischer oder Lerchenterpenthin, gemeiner.)

Form u. Gabe. In Pillen, Bissen, Lattwerge, Lösung mit Weingeist oder verdünnter Schwefelsäure, Emulsion, zu gr. v—x—xx, einigemal. Aeusserlich zu Linimenten, Salben, Pflastern, Einspritzungen, Klystieren.

2936. *Ry.* Terebinth. laric. $\bar{3}$ ij
 Sapon. med. $\bar{3}$ ijj
 Pulv. rad. althaeae q. s.
 F. pil. gr. iv. Consp. lycop.

S. Täglich 2mal 5 Stück.

Anwend. Gegen weissen Fluss.

Th. Guibert.

2937. *Ry.* Terebinth. laric. $\bar{3}$ ij
 Croci orient. pulv.
 Pulv. herb. rutae $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ j.
 M. f. pil. Lxxij. Consp. cinnamom.

S. Täglich 2mal 6 Stück.

Anwend. Gegen Amenorrhöe.

Th. Guibert.

2938. *Ry.* Terebinth. laric. $\bar{3}$ j
 Cort. cascarill. $\bar{3}$ ij
 Rad. rhei opt. q. s.
 F. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Täglich 3mal 5—10 Stück.

Anwend. Gegen Schleimflüsse, Steinbeschwerden.

Mellin.

2939. *Ry.* Terebinth. laric. 3j
 Sapon. jalap. 3ß
 Extr. hyoseyam. gr. iv
 Hydrargyr. muriat. mit. gr. viij.
 M. f. pil. gr. iij. Consp. lycop.

S. Aller 3 Stunden 4 Stück; nach und nach zu steigen.

Anwend. Gegen Bandwurm.

Wird der vollständige Abgang des Wurmes durch eintägigen Gebrauch nicht bewirkt, so kann das Mittel ein paar Tage hinter einander gebraucht, und in höchst seltenen Fällen, nachdem es einige Tage ausgesetzt wurde, wiederholt werden. Während des Gebrauches bloß dünne Fleischbrühe, Kaffee, Thee u. dergl. zu genießen.

Hufeland.

2940. *Ry.* Terebinth. venet.
 Gummi ammon. āā 3ij
 Extr. aloes aquos.
 „ opii aquos. āā gr. vj
 Pulv. cinnammomi q. s.
 F. pil. cxx. Consp.

S. Täglich 2—3mal 10—15 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Bauchwassersucht.

Himly in Schol. clin. Gotting. Fuchs.

2941. *Ry.* Terebinth. venet. 3j
 Extr. liquirit. 3ij
 Sapon. albi 3ß
 Syrup. quinque radicum q. s.
 F. pil. gr. iv. Consp. lycop.

S. Täglich 3mal 3 Stück.

Anwend. Bei Gallensteinen.

Tronchin.

2942. Ry. Terebinth. latic.
 Sapon. med.
 Rad. rhei opt. āā 3j
 Syrup. simpl. q. s.
 M. f. electuarium.

S. *Täglich 3mal 1 Theelöffel voll.*

Anwend. Gegen Wassersucht.

Berends.

2943. Ry. Terebinth. latic. 3jß
 Sapon. venet. 3ij
 Pulv. cort. peruv. reg.
 Rad. serpentar. virg. āā 3iij.
 M. f. cum.
 Syrup. simpl. q. s.
 Electuarium.

S. *Täglich 3mal 1 Theelöffel.*

Anwend. Gegen atonische Wassersucht.

Berends.

2944. Ry. Terebinth. venet. 3j
 Mucil. gumm. mimos. 3ß
 Aquae petroselini 3iv
 Syrup. simpl. 3j.
 M. f. l. a. mixtura.

S. *Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll.*

Anwend. Gegen asthenische Wassersucht der Kinder.

Wendt.

2945. Ry. Aquae menth. pip. 3iv
 Terebinth. latic. 3j—3ß
 Mucil. gummi mimos. q. s.
 F. emulsio, cui adde

Aquae amygdal. amar. $\bar{3}\text{j}\beta$

Syrup. emulsivi $\bar{3}\beta$.

S. Stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen jeden Zeitraum des Trippers.

Bei reizbaren Subjekten setzt man statt des Pfeffermünzwassers einen aus Herb. hyoscyam. $\bar{3}\beta$ bereiteten Aufguss zu und Syrup. $\bar{3}\text{j}$. Fünf bis sechs solcher Mixturen reichen gewöhnlich hin.

Pitschaft.

2946. R γ . Infus. herb. conii macul. ($\bar{9}\text{j}$) $\bar{3}\text{iv}$

Terebinth. venet. $\bar{9}\text{j}$ — $\bar{3}\beta$

Mucil. gummi mimos. q. s. ut f. emulsio

Aquae amygdal. amar. concentr. $\bar{3}\text{j}$

Syrup. cinnamom. $\bar{3}\text{j}$.

S. Stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. In gleichen Fällen, wenn das Drüsensystem, die Hoden mit leiden, oder schon oft Tripper vorhergegangen war.

Pitschaft.

2947. R γ . Terebinth. venet. $\bar{3}\beta$.

Subige per

Vitellum ovi j

in

Aquae cerasor. $\bar{3}\text{vj}$

Syrup. diacodii $\bar{3}\text{vj}$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. In den letzten Stadien des Trippers.

Selle.

2948. R γ . Terebinth. $\bar{3}\text{ij}$ —iv

Mellis crudi $\bar{3}\text{j}$

Vitell. ovor. ij

Infusi chamomill. $\bar{3}\text{iv}$.

M. S. Klystier.

Anwend. Zur Beförderung der Ausleerung.

Cullen.

2949. *Ry.* Terebinth. commun. $\bar{3}vj$
 Cerae citrinae $\bar{3}j$.
 Solve leni igne. Massae adhuc calidae admisce
 Olei terebinth. $\bar{3}j$.

M. S. Zum Bestreichen der Charpie.

Balsamum terebinthinatum Frahmii.

Anwend. Gegen alte Geschwüre.

Tode. Frahm. Bernstein.

2950. *Ry.* Terebinth. venet. $\bar{3}j\beta$
 Spirit. vini rectificatiss. $\bar{3}vj$.
 Solve moderato calore.

S. Wundbalsam.

Anwend. Bei frischen Verletzungen, hauptsächlich der Nerven.

Bernstein.

2951. *Ry.* Terebinth. venet.
 Vitelli ovi $\bar{a}\bar{a}$
 M. f. liniment.

S. Auf Leinwand zu streichen.

Anwend. Gegen Drüsengeschwulst, Paedarthrocace.

Pitschaft.

2952. *Ry.* Cerae flavae $\bar{3}iv\beta$
 Olei olivar. $\bar{3}j\beta$
 Terebinth. $\bar{3}vj$.
 Solutis et colatis admisce
 Pulv. labdani $\bar{3}vj$
 „ tacamahac.
 „ mastiches $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}iij$
 Nucis moschatae $\bar{3}j\beta$
 Bals. peruviani gr. XLV
 Olei destill. menth.
 „ „ cumini $\bar{a}\bar{a}$ gr. xxij

Olei destill. caryophyllor. gr. viij.

M. f. emplastrum.

S. s. n.

Emplastrum de labdano s. stomachicum Ph.

Austr. vet.

Anwend. Bei Schwäche des Magens und der Gedärme, auch bei krampfhaften Beschwerden dieser Theile.

Sapo terebinthinatus; Terpenthinseife.

(*Balsamum vitae externum; äusserer Lebensbalsam.*)

Form u. Gabe. Aeusserlich, allein oder in Lösungen, Salben.

2953. R_y. Sapon. terebinth. $\bar{3}\beta$
Aquae menth. pip. $\bar{3}ij$
Spirit. camphor. $\bar{3}j$
Tinct. opii simpl. $\bar{3}iij$.

M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen chronische Rheumatismen, einfache Anschwellung, Oedem, Distensionen in späteren Zeiträumen.

Blasius.

Oleum terebinthinae; Terpenthinöl.

(*Spiritus s. Essentia terebinthinae; Terpenthinspiritus.*)

Form u. Gabe. Rein, in Emulsion, Mixturen, Lattwerge, zu gr. v— $\bar{3}j$, 1—2mal. Aeusserlich zu Einreibungen, Linimenten, Salben, Einspritzungen, Pflastern, Klystieren.

Man *vermeide* Salpeter-, Schwefel-, Salzsäure, Chlor, Brom, Jod, einige Metallsalze.

2954. Rx. Olei terebinth. $\mathfrak{Z}\beta$
Mellis q. s. ut f. electuar.

S. *Auf 2—3mal Abends beim Schlafengehen.*

Electuarium terebinthinatum Thompsoni.

Anwend. Gegen Bandwurm.

2955. Rx. Olei terebinth. $\mathfrak{Z}ij$
Mellis puri $\mathfrak{Z}j$.

M. S. *Früh und Abends 1 Theelöffel voll.*

Anwend. Beim Hüftweh.

Home.

2956. Rx. Olei terebinth. $\mathfrak{Z}ij$
„ ricini $\mathfrak{Z}j\beta$.

M. S. *Früh auf einmal zu nehmen.*

Anwend. Gegen Bandwurm.

Brera.

2957. Rx. Olei terebinth. $\mathfrak{Z}vj$
Pulv. gummi arab. $\mathfrak{Z}ij$
Aquae flor. chamomill. $\mathfrak{Z}vj$.
F. emulsio, cui adde
Aether. sulphur. $\mathfrak{Z}ij$.

M. S. *Morgens und Abends 2 Esslöffel.*

Anwend. Gegen Bandwurm.

L. Frank.

2958. Rx. Olei terebinth. $\mathfrak{Z}iij$
Vitelli ovi $\mathfrak{Z}j$

Aquae menthae $\mathfrak{z}$ ij
 Syrup. flor. aurant. $\mathfrak{z}$ j
 Laudan. liquid. $\mathfrak{z}\beta$.
 M. f. emulsio.

S. Täglich 3mal einen Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Neuralgien, besonders gegen Schmerzen des ischiadischen und Crural-Nerven.

Martinet.

2959. *Ry.* Olei terebinth.
 Magnes. calc. $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{z}\beta$
 Sacchari albi q. s.
 ut f. bolus.

S. Täglich 4 Bissen.

Anwend. In gleichen Fällen.

Martinet.

2960. *Ry.* Essentiae terebinth. $\mathfrak{z}$ ij
 Succu citri $\mathfrak{z}$ j
 Vini albi $\mathfrak{z}$ iv.

M. S. Auf einmal zu nehmen.

Anwend. Als Diureticum.

Pierquin.

2961. *Ry.* Olei terebinth. $\mathfrak{z}\beta$ —j
 Vitellum ovi j.
 Tere in mort. vitr. sensim addendo
 Decoct. capit. papaver. $\mathfrak{z}$ viii.

S. Klystier.

Anwend. Gegen Hüftweh, Askariden u. s. w.

Martinet.

2962. *Ry.* Olei terebinth. $\mathfrak{z}\beta$.
 Vitellum ovi j
 Decoct. rad. salep $\mathfrak{z}\text{iiij}$.

M. S. Zu einem Klystier.

Anwend. Bei langwierigem, allen Mitteln trotzendem Hämorrhoidalflusse mit grosser Schwäche.

Werneck.

2963. *Ry.* Olei terebinth. $\mathfrak{z}j$
 Vitell. ovor. ij
 Decoct. sem. avenae excort. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

D. S. Den 4. Theil umgeschüttelt und etwas erwärmt zum Klystier.

Anwend. Bei hartnäckigen Verstopfungen, Ileus, wenn keine Entzündung zu befürchten ist.

R. Williams.

2964. *Ry.* Olei terebinth. $\mathfrak{z}j$
 Vitell. ovi j
 Theriacae $\mathfrak{z}\beta$
 Lactis vaccini $\mathfrak{z}\text{iv}$.

M. S. Zu einem Klystier.

Anwend. Bei kolliquativen Durchfällen in der Lungensucht.

van Swieten.

2965. *Ry.* Olei terebinth.
 Spirit. vini camphor.
 Liqu. ammon. caustic. āā $\mathfrak{z}\beta$.

M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Oedem der Füsse.

Trümper.

Bei veralteten gichtischen Kontrakturen mit Olei terebinth. $\mathfrak{z}\beta$.

Ackermann.

2966. *Rx.* Olei terebinth. $\bar{3}j$
 Vitell. ovor. $\bar{3}ij$.
 Terendo sensim admisce.
 Aquae menth. crisp. $\bar{3}iij$.

D. S. Umgeschüttelt, in Nieren- und Blasen-
 gegend einzureiben.

Anwend. Zur Beförderung der Harnabsonderung.

Vogt.

Das Linimentum diureticum Lentini wird mit
 noch einmal so viel Pfeffermünzwasser bereitet und dürfte
 desshalb weniger zu empfehlen sein.

2967. *Rx.* Olei terebinth. $\bar{3}j$
 „ chamomill. cocti $\bar{3}ij$
 Laudan. liquid. $\bar{3}j$.

M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Ischias u. s. w., auch gegen mangelnde Urin-
 absonderung in den Nieren.

2968. *Rx.* Fol. nicotian.
 Herb. digital. purp. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j\beta$.
 Infunde
 Aquae ferv. q. s.
 Colat. $\bar{3}ij$ refriger. adde
 Olei terebinth. $\bar{3}\beta$
 Vitell. ovi j.
 F. l. a. emulsio, in qua solve
 Extr. scillae $\bar{3}\beta$.

D. S. Täglich 2—3 mal, umgeschüttelt, einen
 Theelöffel voll in die Nierengegend einzureiben.

Anwend. Bei Wassersuchten.

J. K. Schmidt.

2969. *Ry.* Liniment. volatilis
 Ungt. nervin. $\overline{aa}$ $\overline{3\beta}$
 Olei terebinth.
 Camphorae $\overline{aa}$ $\overline{3ij}$
 Laudan. liquid. $\overline{3j}$.

M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen chronischen Rheumatismus.

2970. *Ry.* Kali carbon. e ciner. clav. $\overline{3ij}$
 Sapon. hispan. albi rasi $\overline{3\beta}$.

Solve in

Aquae destill. tepidae $\overline{3v}$.

Adde

Olei terebinth. $\overline{3vj}$

„ cajeputi $\overline{3j}$

Spirit. juniperi $\overline{3\beta}$.

M. D. S. Umgeschüttelt, zu Waschungen, Einreibungen.

Liquor nervinus Peerbomii.

Anwend. Bei Lähmungen, Wassersuchten, Geschwülsten, Entzündungsresiduen u. s. w.

Ph. Hann.

2971. *Ry.* Camphorae $\overline{3\beta}$.
 Solve in
 Spirit. vini rectific.
 Olei terebinth. $\overline{aa}$ $\overline{3iv}$.

D. S. Umgeschüttelt, zum Waschen.

Anwend. Bei Phthiriasis alter Leute.

Heberden.

Piper nigrum. Schwarzer Pfeffer.*(Die Beeren von Piper nigrum L.)*

Form u. Gabe. In Substanz zu 5—20 Körnern; in Pulver, Pillen, gr. v—x, einigemal; im Aufguss, 3j—ij auf ℥j, esslöffelweise, mehrmals täglich. Aeusserlich als Kaumittel, Gurgelwasser, Pulver gegen Ungeziefer; als Zusatz zu Sinapismen.

2972. R_y. Piperis nigri
Semin. cardamomi
Rad. Zingiber.
„ calami aromat. āā 3ß.
M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.
S. Täglich 2—3 Pulver zu nehmen.
Anwend. Bei Verdauungsbeschwerden.

2973. R_y. Piperis nigri 3j
Vini albi ℥j.
Infunde.
S. Täglich 3—6 Esslöffel voll.
Anwend. Als magenstärkendes- und allgemeines Reizmittel.

Piperinum; Piperin.

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, zu gr. vj—viij—xij, täglich.

2974. R_y. Piperini gr. ij—vj—x
Elaeosacchari calami 3ß.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj in charta cerata.
S. Täglich 6mal ein Pulver.
Anwend. Gegen Wechselnieber, Dyspepsie und Anorexie.

Chiappa.

Plumbum. Blei.

(Saturnus.)

A. Plumbum aceticum; essigsaures Blei.

(*Saccharum Saturni, Plumbum oxydatum aceticum, Acetas plumbicus cum Aqua; Bleizucker, essigsaures Bleioxyd.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Lösung, Emulsion, zu gr. $\frac{1}{4}$ — ij, ein- bis zweimal. Aeusserlich zu Augen-, Mund-, Gurgelwasser, gr. j — iij auf $\overline{3j}$; Augensalbe, gr. j — ij auf $\overline{3j}$. Einspritzung, Waschwasser, Umschlag.

Man vermeide reine und kohlen-saure Alkalien, Hydrothion-, Kohlen-, Ameisen- und stärkere Säuren und Salze jener Säuren, Salzbilder, Seifen, Schwefellebern, Gerbestoff, eiweiss- oder käsehaltige Substanzen, die meisten Extrakte, Pflanzenschleim, Stärkemehl, Brunnenwasser.

2975. Rx. Plumbi acetici gr. v

Opium puri gr. gr. iij

Sacchari lactis $\overline{3ij}$.

M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

S Früh und Abends ein Pulver.

Anwend. Bei Blennorrhöen der Lungen mit Kolliquationen.

G. A. Richter.2976. Rx. Opium puri gr. $\frac{1}{4}$

Plumbi acetici gr. ij — iij

Natri acetici sicci gr. iij

Sacchari lactis gr. v.
M. f. pulv. Disp. tal. dos. xij.

S. *Alle halbe, 1—2 Stunden ein Pulver, trocken, in eine etwas weiche Oblate eingewickelt, zu verschlucken.*

Anwend. Bei lebensgefährlichen Hämorrhagieen. — Der Gebrauch darf nur so lange als Gefahr vorhanden ist, und bei zweistündlicher Anwendung höchstens 2 Tage fortgesetzt werden.

Krimer.

2977. R_y. Plumbi acetici gr. j
Extr. opii aquosi gr. ij
„ myrrhae gr. iv
Gummi mimos.
Sacchari lactis āā ʒij.
M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. *Aller 2 Stunden ein Pulver.*

Anwend. Gegen Lungenschwindsucht.

Marcus.

2978. R_y. Plumbi acetici gr. x
Extr. thebaic. gr. v—x
Pulv. rad. liquirit.
Extr. liquirit. āā ʒj.
M. exacte; f. pil. lx. Consp. lycop.

S. *Täglich 2—3mal 1—2—3 Pillen.*

Anwend. Gegen Lungenschwindsucht mit beträchtlicher Erweichung der Tuberkeln, besonders auch bei kolliquativem Schweiß und Durchfalle.

Radius.

2979. R_y. Plumbi acetici gr. v
Op_{ii} puri ʒß
Extr. millefol.

Rad. liquirit. āā 3ß.

M. f. pil. lx. Consp. lycop.

S. *Aller 4—6 Stunden 3 Stück.*

Anwend Gegen manche Fälle von Blutspeien, atonischen Gebärmutterblutfluss und Lungenschwindsucht.

Jahn.

2980. R_y. Plumbi acetici gr. vj

Pulv. rad. althaeae

Extr. polygal. amar. āā 3j.

M. f. pil. lx. Consp. lycop.

S. *Täglich 10—20 Pillen zu nehmen, 2—5 Stück auf einmal.*

Anwend. In denselben Fällen. — Nach Befinden wird Opium zugesetzt.

Kopp.

2981. R_y. Plumbi acetici

Pulv. semin. phellandrii aquat.

Extr. ligni quassiae āā 3j.

M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. *Aller 2 Stunden 2 Stück zu nehmen.*

Anwend. Bei tuberkulöser Lungenblennorrhöe.

Kopp.

2982. R_y. Plumbi acetici

Rad. ipecacuanhae āā 3ß

Opii gr. v

Syrup. simpl. q. s.

F. pil. xl. Consp. lycop.

S. *Aller 3 Stunden eine Pille zu nehmen.*

Anwend. Bei passiven Blutflüssen.

2983. *Ry.* Plumbi acetici gr. xvj
 Tinct. opii $\bar{3}j$
 Acid. acet. dilut. $\bar{3}xv$
 Aquae destill. $\bar{3}ij$.

M. S. Aller 4 Stunden einen Esslöffel voll.

Anwend. Gegen passive Blutflüsse, besonders bei bevorstehendem Abortus oder nach erfolgtem, und bei Blutbrechen.

Laidlaw.

2984. *Ry.* Plumbi acetici gr. iij
 Succ. liquirit. $\bar{3}j\beta - ij$.
 Solve in
 Aquae cerasor. $\bar{3}iv$
 Tinct. opii croc. $\bar{3}j - \bar{3}\beta$.

M. S. Aller 3 — 5 Stunden, umgeschüttelt, einen Esslöffel.

Anwend. Bei Pneumonie nach vorangeschickten Blutentziehungen; auch bei Lungenschwindsucht, — Bei aufgeregtem Blutgefäßssystem verordne man statt des Kirschwassers ein passend mit destillirtem Wasser bereitetes Infus. herb. digital. purp. ($\bar{3}\beta$) $\bar{3}iv$.

Ritscher.

2985. *Ry.* Vitellum ovi j
 Olei amygdal. dulc. rec. $\bar{3}ij$
 Mucilag. gummi mimos. $\bar{3}\beta$
 Plumbi acetici gr. ij
 Aquae cerasor. nigr. $\bar{3}iv$
 Syrup. althaeae $\bar{3}\beta$.
M. f. emulsio.

S. Aller 3 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. In der Lungenschwindsucht.

Marcus.

2986. *Ry.* Plumbi acetici gr. ij
 Aquae foenicul. $\bar{3}vj$

Tinct. opii simpl. $\bar{3}\beta$
 Syrup. cort. aurant. $\bar{3}\beta$.

M. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Richter.

2987. *Ry.* Plumbi acetici gr. viij
 Aquae rosar. $\bar{3}ij$.

S. S. Damit befeuchtete Kompressen auf die Augenlider zu legen.

Anwend. Um die Augen bei den Blattern gegen Entzündung zu schützen,

Stark.

2988. *Ry.* Plumbi acetici gr. iij
 Aquae rosar. l. foeniculi $\bar{3}\beta$.

S. S. Augenwasser.

Anwend. Bei katarrhalischen und skrofulösen Augenentzündungen.

Radius.

2989. *Ry.* Plumbi acetici gr. iij
 Aquae plantaginis $\bar{3}vj$
 Spirit. vini camphor. gutt. vj—xij.

S. S. Aller 2 Stunden einige Tropfen in's Auge zu geben.

Anwend. Gegen einfache katarrhalische Augenentzündung.

Scarpa.

2990. *Ry.* Plumbi acetici gr. iv
 Aquae destill. $\bar{\text{z}}$ iv
 Mucilag. gummi mimosae $\bar{\text{z}}$ β.

S. S. Augenwasser.

Anwend. Bei Augenblennorrhöe Neugeborener.

Wendt.

2991. *Ry.* Plumbi acetici $\bar{\text{z}}$ j
 Sulphur. praecip. $\bar{\text{z}}$ ij
 Aquae destill. $\bar{\text{z}}$ viiij.

M. S. Zum Waschen.

Anwend. Gegen hartnäckige Flechten.

Ch. Bell.

2992. *Ry.* Plumbi acetici $\bar{\text{z}}$ ij
 Aquae rosar. $\bar{\text{z}}$ xviiij
 Aceti $\bar{\text{z}}$ vj.

S. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Beim syphilitischen weissen Fluss.

Swediaur.

2993. *Ry.* Plumbi acetici gr. xxiv
 Aquae destill. $\bar{\text{z}}$ viiij.

S. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Gegen chronischen Tripper.

Bell.

2994. *Ry.* Plumbi acetici
 Zinci sulphurici $\bar{\text{a}}$ ā gr. xv.

Solve in

Aquae fervid. ℥iij.

Adde

Camphorae tritae 3ß

Opil pulv. ʒj

Gummi mimos. pulv. 3j.

M. S. Nach dem Harnlassen 1—2mal einen Fingerhut voll in die Fossa navicularis einzuspritzen und durch gelindes Zusammendrücken der Harnröhrenmündung eine Minute darin zu lassen.

Anwend. Im Nachtripper.

Kluge.

2995. *Ry.* Plumbi acetici gr. vj
Aquae destill. ℥iij
Aquae laurocerasi ʒiij.

S. S. In die Harnröhre einzuspritzen.

Anwend. Beim Tripper.

Schubarth.

2996. *Ry.* Plumbi acetici 3ij
Aceti vini ℥iij
Aquae destill. ʒij
Micae panis albi q. s.
F. cataplasma.

S. Umschlag.

Anwend. Gegen Hodenentzündung.

Girtanner.

2997. *Ry.* Plumbi acetici gr. x
Camphorae gr. iv
Butyr. rec. insulsi 3ij.
M. f. unguentum.

S. Augensalbe.

Anwend. Gegen Blepharitis glandulosa und impetiginosa.

Andreae.

2998. *Ry.* Plumbi acetici
 Extr. belladonnae āā 3ß
 Adipis suilli 3iij.
 M. f. unguentum.

S. Auf Maschen gestrichen in den After zu bringen.

Anwend. Bei Fissura ani und Mastdarmfisteln bei Personen, welche sich der Operation nicht unterwerfen wollen.

Dupuytren.

2999. *Ry.* Plumbi acetici 3j
 Kali sulphurici acid. 3iij.
 M. f. pulvis.

S. Mit Wasser zu einem Teige anzurühren und aufzuschlagen.

Anwend. Als kräftiges rothmachendes Mittel. — Man hüte sich die blossen Hände bei Bereitung des Mittels in Anwendung zu bringen.

Clarus.

3000. *Ry.* Plumbi acetici 3jß
 Albumen ovi j
 Spirit. vini camphor. 3viiij.

M. S. Zum äusseren Gebrauch.

Anwend. Gegen brandigen Decubitus.

Himly in Schol. clin. Gotting. Fuchs.

B. Plumbi acetici basici liquor; basische essigsaure Bleiflüssigkeit.

(*Acetum Plumbi, Lithargyri, saturninum, Liqu. Plumbi subacetici, Extractum Saturni s. Plumbi; Bleiessig, Bleiextrakt.*)

Form u. Gabe. Sehr selten innerlich, zu 5 — 10 Tropfen. Aeusserlich zu Augen-, Mund-, Gurgelwasser, Einspritzung, Waschung, Liniment, Salbe, Umschlag, Klystier.

Man vermeide dieselben Verbindungen wie bei dem vorigen.

3001. *Ry.* Liqu. plumbi subacetici $\mathfrak{z}$ ij.

S. Alle 4 Stunden 30 Tropfen auf Zucker.

Anwend. Gegen Hydrophobie.

Fayerman.

3002. *Ry.* Plumbi subacet. liquidi
Tinct. opii $\overline{aa}$ gutt. xxv
Aquae destill. $\mathfrak{z}$ jß.

M. S. Täglich 2—3mal 50—60 Tropfen.

Anwend. Gegen kolliquative Schweisse Schwindsüchtiger, wenn Waschungen mit warmem Essig und Wasser oder innerlich Mineralsäuren nicht helfen.

Seymour.

3003. *Ry.* Aceti plumbi gutt. xv
Aquae rosar. $\bar{3}$ vj
Spirit. flor. roris marin. $\bar{3}\beta$.

M. S. Augenwasser.

Anwend. Gegen Hasenauge alter Leute, bei der Trockenheit der Augen und bei Augenentzündungen.

Beer.

3004. *Ry.* Aceti plumbi gutt. v
Aquae sambuci $\bar{3}\beta$
Tinct. opii simpl. gutt. x.

M. S. Augentropfwasser, umgeschüttelt.

Anwend. Bei chronischen Augenentzündungen.

Rust.

3005. *Ry.* Aceti saturnini
Spirit. camphor. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ij
Aquae chamomill. $\bar{3}$ viii
Vitrioli albi $\bar{3}$ j.

S. S. Mit Läppchen überzuschlagen.

Anwend. Gegen Lippitudo.

Selle.

3006. *Ry.* Zinci sulphurici $\bar{3}$ j
Aceti saturnini $\bar{3}\beta$
Aquae destill. simpl. $\bar{3}$ x
Spirit. camphor. $\bar{3}$ ij.

S. S. Täglich 2—4 mal die Augen damit auszuwaschen.

Anwend. Gegen Ophthalmia neonatorum im 2. Stadium; späterhin wird noch Alumin. crudi $\bar{3}$ j zugesetzt.

J. A. Schmidt.

3007. Rx. Aceti plumbi ʒij
Aquae rosar. ʒiv.

M. S. Zu Augenbähungen.

Anwend. Gegen traumatische Ophthalmleen.

Rust.

3008. Rx. Liqu. plumbi acetici
Laudan. liquid.
Tinct. benzoës āā ʒj
Alcohol 22° ʒj
Aquae flor. sambuci ʒiv.

M. S. Kompressen damit zu befeuchten und aufzulegen.

Anwend. Gegen schmerzhaftes, aber nicht aufgebrochene Frostbeulen.

3009. Rx. Aceti plumbi ʒj
Extr. opii ʒj
Aquae rosar. ʒvj.

S. S. Mit Leinwand überzuschlagen.

Anwend. Gegen Brand von Erfrieren.

3010. Rx. Aceti plumbi ʒj
Aquae destill. ʒj
Spirit. camphor. ʒj.

M. S. Umgeschüttelt, einzuspritzen.

Anwend. Gegen Fluor albus.

Richter.

3011. *Ry.* Aceti plumbi $\bar{3}j$
Spirit. camphorat. $\bar{3}ij$
Infusi flor. sambuci $\bar{3}viiij$.

M. S. Umgeschüttelt, mit Läppchen umzuschlagen.

Anwend. Bei lymphatischer oder zum Brande neigender Phimosis.

Ratier.

3012. *Ry.* Cort. quercus gross pulv. $\bar{3}j$.
Coque cum
Aquae commun. $\bar{3}viiij$ ad colat. $\bar{3}iv$.
Admisce

Acet. plumbicum, quamdiu praecipitatum induritur.

Liquor filtretur per chartam bibulam. Praecipitatum in charta remanens ad consistent. unguenti tenuioris exsicca.

D. S. Zwei- bis dreimal täglich, ziemlich dick auf feine Leinwand gestrichen, auf die wunde Stelle und deren Umfang zu legen.

Anwend. Bei Decubitus.

Autenrieth.

3013. *Ry.* Olei lini $\bar{3}viiij$
Album. ovor. vj
Aceti plumbici $\bar{3}j$.
M. f. liniment.

S. Umgerührt und auf Leinwand gestrichen öfters frisch aufzulegen.

Anwend. Bei Verbrennungen.

Schwartze.

3014. *Ry.* Kali nitric. depur. $\bar{3}\beta$.
Solve in
Aquae destill. $\&j\beta$.

Adde

Aceti plumbici

Olei terebinth. rectific. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$.

M. S. Drei,- bis viermal täglich, umgeschüttelt und stubenwarm, die schmerzhaften Gelenke damit zu waschen.

Anwend. Bei der eigentlichen, erst beginnenden Arthritis.

Fehr.

3015. *Rx.* Bals. Fioravanti (Bals. vit. Hoffm.) $\bar{3}ij$

Aceti plumbi

Olei olivar. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ijj$

Acidi muriat. $\bar{3}j$.

M. S. Salbe.

Unguentum ad perniones Bertoni.

Anwend. Gegen Frostbeulen.

Berton.

3016. *Rx.* Olei lini $\bar{3}j\beta$

„ hyoscyami $\bar{3}vj$

Aceti plumbi $\bar{3}\beta-j$

Unguent. althaeae $\bar{3}j$.

M. f. unguentum.

S. Zum Verbande.

Anwend. Gegen starke Verbrennungen, nachdem durch kalte Umschläge die ersten Schmerzen gehoben sind.

3017. *Rx.* Olei olivar. $\bar{3}ijj$

Sperm. ceti $\bar{3}vj$

Cerae albae $\bar{3}ijj$

Aceti plumbi $\bar{3}\beta$.

Leni igne liquef.

M. S. Zum Verbande.

Anwend. Gegen Verbrennungen und schmerzhaftes Exkoriationen.

Carus.

3018. Rx. Aceti plumbi
Cerae albae āā 3j
Olei olivar. 3j.
M. f. unguentum.

S. Augensalbe.

Anwend. Zum Austrocknen und Kühlen.

Armstrong.

3019. Rx. Aceti plumbi 3j
Mucilag. althaeae
Unguent. rosati āā 3ß.
M. diu terendo.

S. Salbe.

Anwend. Gegen entzündete Hämorrhoidalknoten.

Vogt.

Aqua Plumbi; Bleiwasser.

(*Aqua saturnina.*)

Form. Nur äusserlich, zu Waschungen, Bähungen, Einspritzungen, Umschlägen.

3020. Rx. Aquae plumbi
Liqu. ammon. acetic. āā 3iv.

M. S. Lau erwärmt mit Tüchern überzuschlagen.

Anwend. Bei entzündlichen lymphatischen Ausschwitzungen in äusseren Theilen.

Vogt.

Aqua vegeto-mineralis Goulardi;
Goulardisches Wasser.

Form. Nur äusserlich, zu Waschungen, Umschlägen.

3021. R_y. Aquae vegeto-miner. Goulardi ℥iv
Tinct. opii vinos. ℥j.

M. S. Zu Bähungen.

Anwend. Gegen leichte Grade neuer Frostbeulen.

C. Plumbum carbonicum; kohlensaures
Blei.

(*Cerussa alba, Oxydum Plumbi album; Blei-
weiss, kohlensaures Bleioxyd.*)

Form. Nur äusserlich, als Streupulver, zu Salben,
Pflastern.

Man vermeide Säuren, Schwefelverbindungen, Jodkalium,
salzsaure Salze.

3022. R_y. Pulv. cerussae ℥j
„ cortic. quercus ℥j.
M. bene.

S. Zum Einstreuen.

Anwend. Gegen skrofulöse Geschwüre.

Swediaur.

3023. R_y. Cerussae ℥v
Plumbi acetici ℥j
Camphorae ℥vj

Tinct. opii $\bar{3}j$
 Olei lini $\bar{3}j$
 Axungiae $\bar{3}ij$.
 M. f. unguentum.

S. Salbe.

Anwend. Gegen Frostbeulen.

Thomson.

3024. Rx. Cerussae subt. pulv.
 Litharg. subt. pulv.
 Lapid. calam. pulv. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j\beta$.
 Coque cum
 Olei olivar. $\bar{3}iv$ ad emplastr.
 Tunc perpet. agitat. adde
 Pulv. olibani $\bar{3}j$
 „ mastich. $\bar{3}ij$.

M. S. Pflaster.

Emplastrum consolidans.

Anwend. Zur schnelleren und besseren Vernarbung von Wunden und Geschwüren.

Bernstein.

D. Plumbum iodatum; Jodblei.

(*Plumbum iodidum, hydroiodicum, Protoioduretum Plumbi; hydriodsaures Blei.*)

Form u. Gabe. In Pillen, Bissen, gr. $\frac{1}{4}$ —v, täglich. Salbe, $\bar{3}j$ auf $\bar{3}j$.

3025. Rx. Plumbi iodati $\bar{3}\beta$
 Conserv. rosar. q. s.
 F. pil. cxx. Consp. lycop.

S. Täglich 2mal eine Pille zu nehmen.

Anwend. Gegen Skrofeln.

Cottreau.

3026. *Ry.* Plumbi iodati $\overline{3}j$
 Axungiae $\overline{3}j$
 Olei citri q. s. ad grat. odorem.
 M. f. unguentum.

S. Zum Einreiben,

Anwend. Bei skrofulösen Geschwüren. Halb so stark gegen
 Bubonen.

Ricord.

3027. *Ry.* Plumbi iodati $\overline{3}j$
 Emplastr. conii macul. $\overline{3}j$.
 M. f. emplastrum.

S. Auf Leder zu streichen.

Anwend. Gegen Leistenbeulen, besonders aber gegen An-
 schwellung der Hoden.

Ricord.

E. Plumbi Ox y d a; Bleioxyde.

a. Plumbum suboxydatum.

(*Cinis Plumbi; Bleiasche.*)

Form. Nur äusserlich.

3028. *Ry.* Plumbi suboxydati $\overline{3}\beta$
 Calcis mort.
 Cretae albae $\overline{3}\beta$.

M. S. Zum äusseren Gebrauch.

Anwend. Zum Färben der Haare.

Man mengt dieses Pulver mit Wasser, taucht einen Pin-
 sel hinein, mit dem man die Haare bündelweise reibt. Nach
 Verlauf von 2 Stunden wäscht man den Kopf und die Wir-
 kung ist erfolgt.

b. Plumbum oxydatum vitrificatum;
verglastes Bleioxyd.

(*Lithargyros; Blei-, Silberglätte.*)

Form. Salbe, Pflaster.

3029. R_y. Lithargyri $\bar{\text{z}}$ vj
Boli armen. $\bar{\text{z}}$ j
Mastiches
Myrrhae $\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{z}}$ β
Aceti vini crudi $\&$ j.
Coque per $\frac{1}{4}$ hor.

S. Ein 6 — 8fach zusammengelegtes Tuch damit
zu befeuchten und lauwarm überzulegen.

Anwend. Gegen Wasserbalggeschwulst der Kniescheibe.

Heister.

3030. R_y. Lithargyr. pulv. $\bar{\text{z}}$ β
Aceti crudi $\bar{\text{z}}$ iv
Sapon. venet. $\bar{\text{z}}$ ijβ.

Mixta simul leni calore coque ad consumptionem
humiditatis constanter et probe movendo; dein
adde

Olei olivarum

Cerae flavae $\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{z}}$ β.

S. Salbe.

Ceratum saponaceum Pottii.

Anwend. Bei Frakturen und atonischen Geschwüren.

Pott.

3031. *Ry.* Emplastr. de lithargyr. $\mathfrak{Z}\beta$
 Bals. peruvian. $\mathfrak{Z}\beta$ —j
 Opii puri gr. x—xx.

Mal. S. Pflaster.

Anwend. Gegen Verschwärung erfrorener Glieder.

3032. *Ry.* Emplastr. matris fusci Ph. Saxon. $\mathfrak{L}j$
 Alumin. usti
 Succini praeparati $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{Z}iij$.
 M. l. a. f. emplastr.

S. Auf Leder zu streichen.

Emplastrum universale Waltheri.

Anwend. Gegen wuchernde, skrofulöse Geschwüre.

c. Plumbum hyperoxydatum rubrum;
 rothes Bleioxyd.

(*Minium, Crocus Saturni; Mennige, Blei-
 zinnober, Bleisafran.*)

Form. Salbe, Pflaster.

3033. *Ry.* Minii $\mathfrak{Z}j$
 Unguent. rosati $\mathfrak{Z}\beta$.
 M. exacte; f. unguent.

S. Salbe.

Anwend. Gegen Exkorationen der Wangen in Folge von scharfer Absonderung entzündeter Augen.

v. Gräfe.

F. Plumbum tannicum; Gerbestoffblei.

Form. *Aeusserlich.*

3034. *Ry.* Decocti cort. quercus (℥iijß) ℥ij
 Aceti saturni q. s. ad praecipit.
 Cola et praecipit.

S. Viermal täglich zum Bestreichen der Ausschlagsstellen.

Anwend. Gegen Krätze.

Droste.

3035. *Ry.* Cort. quercus ℥ij
 Coque cum
 Aquae font. ℥ij ad reman. ℥viij.
 Col. refriger. praecipita cum
 Plumbi acetic. q. s.
 Hujus praecipitati ℥j admisce
 Spirit. vini rectific. ℥j.

Serva. S. Zum Bestreichen der kranken Stellen.

Anwend. Gegen Krätze.

Kluge.

3036. *Ry.* Cort. quercus pulv. ℥j
 Aquae font. ℥vj.
 Coque ad dimidii remanentiam.
 In colat. instilla
 Aceti plumbici q. s. (℥ß circiter).
 Filtra liquorem et praecipitatum non siccatum
 sub alcohole serva.

S. Mit Weingeist befeuchtet auf Löschpapier zu streichen.

Magma scytodepsicum e quercu.

Anwend. Gegen Decubitus, wenn er nicht mehr hellroth bren-

nend, sondern bläulichroth exkoriirt, jedoch ohne grossen Substanzenverlust ist.

Autenrieth.

3037. Rx. Plumbi tannici
Unguent. althaeae āā

M. S. Salbe.

Anwend. Ein vortreffliches Austrocknungsmittel bei alten oberflächlichen Exkorationen, nach Verbrennungen, wo früher ölige Mittel angewendet wurden und wo keine Epidermis sich bilden will. Sie kann mehrere Tage liegen bleiben, daher auch nützlich bei Lostrennung der Oberhaut, bei Knochenbrüchen, oder wo eine fest angelegte Blinde Exkorationen gemacht hat.

Fricke.

Polygala amara. Bittere Kreuzblume.

(*Polygala amara L., Polygala amarella Richbch.*)
Herba et radix.

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, ℥j—ij, einigemal täglich; im Aufguss, Abkochung, ℥iij—vj auf ℥vj, esslöffelweise, 2stündlich.

3038. Rx. Pulv. polygal. amar.
Sacchari lactis āā ℥j.
M. f. pulv. Disp. tal. dos. vj.

S. Früh ein Pulver zu nehmen.

Anwend. In Phthisis pulmonum.

F. X. Hartmann.

3039. *Ry.* Pulv. rad. polygal. amar. $\bar{3}\beta$

Mellis q. s.

F. electuarius.

D. S. Täglich 4mal 1 Kaffeelöffel.

Anwend. Bei chronischen Leiden der Bronchien.

Quarin.

3040. *Ry.* Herb. et radic. polygal. amar. $\bar{3}ij$.

Infunde in

Lactis fervid. $\bar{8}j$.

Diger. aliquot minuta.

Colat. S. Den Tag über tassenweise zu trinken.

Anwend. In der Phthisis pulmonum.

F. X. Hartmann.

3041. *Ry.* Herb. polygal. amar. $\bar{3}j$.

Coque cum

Aquae font. $\bar{3}xiv$ ad colat. $\bar{3}viii$

Spirit. muriat.-aether. $\bar{3}j$

Syrup. althaeae $\bar{3}j$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Besonders gegen Atonie der Lungen.

Berends.

3042. *Ry.* Rad. polygal. amar. $\bar{3}ij$.

Coque per x sexagesimas in

Aquae font. $\bar{3}iv$.

Colat. adde

Syrupi sacchari $\bar{3}ij$.

M. S. Esslöffelweise.

Julapium pectorale amarum.

Anwend. Als Auswurf beförderndes Mittel.

Hôp. St. Antoine.

Polygalae Senegae radix.

Senegawurzel.

(*Senegae radix, Polygalae virginianae radix;*
Klapperschlangenzurzel. Von Polygala
Senega L.)

Form u. Gabe. In Abkochung, zu $\text{℥ij} - \text{vj}$ mit ℥ix auf ℥vj Wasser, esstöffelweise, 2stündlich; in Pulver (ungern), Pillen, Lattwerge, zu gr. $\text{v} - \text{xx}$, 2—3mal. Extrakt in Lösung, Pillen, zu gr. $\text{v} - \text{x}$, 3—4mal.

3043. *Ry.* Rad. senegae ℥ij .

Coque cum

Aquae commun. ℥vj ad reman. ℥jβ .

Colat. admisce

Syrupi ammoniaci ℥jβ

Spirit. sal. ammon. anis. ℥β .

M. S. Aller 2 Stunden einige Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei Katarrhen.

Unzer.

3044. *Ry.* Rad. senegae ℥ij .

Coque ex

Aquae font. q. s. ad colat. ℥viiij

Camphorae ope gummi arab. subact. ℥j

Oxymell. scillit. ℥j .

M. S. Allmählig (aller 3 Stunden 1 Esstöffel) zu nehmen.

Decoctum pectorale incitans Brerae.

Anwend. Zu Ende mancher nervösen Lungenentzündungen, wo die Thätigkeit der Lungen gesunken ist.

Brera.

3045. *Ry.* Rad. senegae $\mathfrak{Zij}$
Cort. peruviani cont. $\mathfrak{Z}\beta$.

Coque in

Aquae font. q. s.

Colat. $\mathfrak{Z}x$ adde

Syrup. tolutani $\mathfrak{Zj}$

Vini antimon. Huxh. $\mathfrak{Zij}$

Syrup. violarum $\mathfrak{Zvj}$.

M. S. Esslöffelweise den Tag über zu verbrauchen.

Anwend. Bei chronischen Katarrhen und Schleimschwindsucht, vorzüglich wenn diese von rheumatischer Beschaffenheit abhängig oder mit solcher verbunden war.

Brera.

3046. *Ry.* Rad. senegae $\mathfrak{Z}\beta$.

Coque cum

Aquae commun. $\mathfrak{Z}ix$ ad colat. $\mathfrak{Zvj}$.

Quae refrigerata cum

Camphorae trit. $\mathfrak{Zj}$

Gummi mimos. pulv. $\mathfrak{Zij}$

f. l. a. emulsio, cui adde

Liqu. ammon. succin. $\mathfrak{Zij}$.

M. D. S. Umgeschüttelt, 2stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. In ähnlichen Fällen.!

Horn.

3047. *Ry.* Rad. senegae $\mathfrak{Zj}\beta$ — $\mathfrak{ij}$.

Coque cum

Aquae font. $\mathfrak{Z}x$ ad reman. $\mathfrak{Zvj}$.

Sub finem coct. adde

Flor. arnic. mont. $\mathfrak{Zj}$.

Digere per $\frac{1}{4}$ hor. in vase clauso. Colat. expr. et refrig. adde

Liqu. ammon. succin. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Oxymell. scillit. $\mathfrak{z}\text{vj}$.

D. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Bei Katarrh alter Leute mit Atonie der Lungen, an-
 gehender Brustwassersucht und Stickfluss. —

Statt des Liqu. ammon. succ. kann man auch Liqu.
 ammon. anis. $\mathfrak{z}\text{ij}$ nehmen.

Clarus.

3048. *Ry.* Rad. senegae $\mathfrak{z}\beta$.
 Coque cum
 Aquae font. q. s.
 Colat. $\mathfrak{z}\text{vj}$ adde
 Ammoniaci depur.
 Kali tartarici $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\text{j}$
 Oxymell. scillit. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. D. S. Alle Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. In ähnlichen Fällen.

Reil.

3049. *Ry.* Rad. senegae $\mathfrak{z}\text{j}$.
 Coque cum
 Aquae font. $\mathfrak{z}\text{xvj}$ ad rem. colat. $\mathfrak{z}\text{viiij}$.
 Adde
 Ammon. muriat. dep. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Pulp. tamarind. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Tart. stibiat. gr. j
 Syrup. althaeae $\mathfrak{z}\text{j}$.

*M. D. S. Aller 2 Stunden 2 Esslöffel voll zu
 nehmen.*

Anwend. Zur Beförderung des angehäuften Schleimes in den
 Luftwegen nach vorausgegangenen und beseitigten entzünd-
 lichen Zufällen.

Richter.

3050. *Ry.* Rad. senegae $\bar{3}\beta$.

Infunde

Aquae ferv. q. s. ad colat. $\bar{3}\text{iv}$.

Adde

Vini stibiati $\bar{3}\text{ij}$

Syrup. althaeae $\bar{3}\text{j}$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 kleinen Esslöffel voll.

Anwend. Im zweiten Zeitraume des Croup.

Wendt.

3051. *Ry.* Pulv. rad. scillae gr. iv

„ „ senegae $\bar{3}\beta$

Kali sulphurici $\bar{3}\text{j}$

Olei juniperi gutt. xvj.

M. f. pulv. Div. in iv part. aequal.

S. Aller 4 Stunden 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. In der Wassersucht.

Mecker.

3052. *Ry.* Pulv. rad. senegae

Sacchari albi $\bar{a}\bar{a}$ gr. xv

Camphorae trit. gr. j.

M. f. pulv. Disp. tal. dos. vj.

S. Aller 3 Stunden 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. In Pneumonieen, wenn nach gehöriger Blutentziehung der Auswurf nicht erfolgt oder Status nervosus einzutreten droht.

Richter.

3053. *Ry.* Pulv. rad. senegae $\bar{3}\beta$

Kali tartarici $\bar{3}\text{vj}$

Magnesia carbonicae $\bar{3}\text{ij}$.

M. f. pulv. D. in vitro.

S. Täglich 2mal 1 Theelöffel.

Anwend. Gegen Pannus oculi. — Dabei schmale Diät.

Schmalz in Pirna.

3054. *Ry.* Pulv. rad. senegae $\bar{3}\beta$
 Tartari depurati
 Elaeosacch. citri $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\text{ij}$.
 M. f. pulv. D. in vitro.

S. Früh und Abends 1 Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Pannus von chronisch-katarrhalischer Augenentzündung.

Fr. Jäger.

3055. *Ry.* Pulv. rad. senegae
 „ „ ratanhia $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$
 Magnes. carbon. $\bar{3}\text{ij}$
 Tartari depurati $\bar{3}\text{ij}$.
 M. f. pulvis.

D. S. Täglich 3—4mal 1 Theelöffel.

Anwend. Gegen atonische Schleimflüsse, namentlich weissen Fluss.

Choulant.

3056. *Ry.* Rad. senegae $\bar{3}\text{ij}$.
 Coque ex
 Aquae font. q. s. ad colat. $\bar{3}\text{viiij}$.
 Cui adde
 Ichthyocollae q. s.
 F. gelatina, cui calidae adde
 Syrup. flor. l. cort. aurant. $\bar{3}\text{j}$.

M. S. Theelöffelweise.

Anwend. Zur Erleichterung des Auswerfens.

Choulant.

3057. *Ry.* Ammoniaci depur.
 Myrrhae pulv. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\text{j}$
 Pulv. rad. senegae $\bar{3}\text{ij}$

Extr. liquirit. q. s.

F. boli xvj. Consp. irid. flor.

D. S. *Täglich 4mal 1 Stück.*

Anwend. In gleichen Fällen.

Phoebus.

Prunorum pulpa. Pflaumenmuss.

(*Roob Prunorum; Zwetschenmuss. Von Prunus domestica L.*)

Form u. Gabe. *Lattwerge, Mischung, ʒij — viij, 3—4mal, als Surrogat für Tamarindenmuss.*

3058. R_y. Roob prunorum ʒj
Tartari depurati ʒij.

M. S. *Theelöffelweise.*

Hufeland's künstliches Tamarindenmuss.

Anwend. Als gelindes, kühlendes Abführmittel.

Hufeland.

3059. R_y. Pulpae prunor. dep. ʒjβ
Tart. depur. ʒβ
Fol. sennae pulv. ʒjβ
Syrup. commun. ʒβ.

M. f. electuar.

S. *Theelöffelweise.*

Electuarium e Senna Ph. milit. Bor.

Anwend. Gelindes Abführmittel.

Statt des theuren mit Tamarinden.

Pulsatillae nigricantis herba recens. Küchenschellenkraut.

(Von Anemone Pulsatilla L.)

Form u. Gabe. Im Aufguss, $\text{3}\beta\text{—j}$ auf 3iv , esslöffelweise; Pulver in Pillen, Lattwerge, gr. v—x , 3—4mal ; Extrakt, besser Succus rec. inspissatus, in Pillen, Lösung, gr. j—v , 2—3mal ; Aqua puls. destillata, zu 3ij—iij , 3—4mal .

Man vermeide Salzbilder, empfindliche Metallsalze, Gerbestoff.

3060. *Ry.* Herbae pulsatill. nigr. 3j—iij
 Vini gallici albi q. s.
 Digere per hor. j. Colat. 3viiij refriger. adde
 Syrup. cinnamomi 3j
 Naphthae aceti 2j .

M. S. Esslöffelweise, allmählig steigend, zu nehmen.

Anwend. Gegen schwarzen und grauen Staar.

Störk. v. Gräfe.

3061. *Ry.* Extr. pulsatill. nigr. gr. $\frac{2}{3}$
 Sacchari albi 2j .
M. f. pulv. D. tal. dos. xij.

S. Früh und Abends 1 Pulver.

Anwend. Gegen falschen Schwindel.

Löwenhardt.

Nach Marcus Herz beruht der falsche Schwindel in einer krankhaften Zusammenziehung der Fasern der inneren Fläche der Augenlider; nach einem Ungenannten in einer Convulsion der Iris.

3062. *Ry.* Extr. pulsatill. nigr. gr. iv
Sacchari lactis ℥viij.
M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. Täglich 2—3mal 1 Pulver.

Anwend. Gegen Keuchhusten.

Seidler.

3063. *Ry.* Pulv. fol. pulsatill. nigr. 3j
Extr. fol. pulsatill. nigr. q. s.
F. pil. Lx. Consp. lycop.

S. Eine bis sieben Pillen täglich 3mal, allmählig steigend, zu nehmen.

Anwend. Gegen lähmungsartige Zustände des Auges überhaupt; gegen Amaurose und anfangende Katarakta insbesondere.

v. Gräfe.

3064. *Ry.* Pulv. rad. valerianae offic.
„ flor. arnicae
Asae foetidae āā 3ij
Extr. pulsatill. nigr. 3ß
Tart. stibiat. gr. xij.
M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Täglich 3mal 15 Stück.

Anwend. Gegen Amaurose.

Rust.

3065. *Ry.* Extr. pulsatill. 3ß
Vini stibiat. 3ß.

S. S. Täglich 3mal 20—60 Tropfen.

Anwend. Gegen Amaurose.

Rust.

3066. *Rx.* Herbae pulsatill. $\mathfrak{Z}$ ijj.

Digere in vase bene clauso per horam cum
Aquaе commun. q. s. ad colat. $\mathfrak{Z}$ vj.

In qua solve

Hydrargyr. muriat. corros. gr. j.

M. S. Umgeschüttelt, täglich einigemal etwas
davon in's Auge zu träufeln.

Anwend. Gegen Hornhautverdunkelung und beginnende Ka-
tarakte.

v. Gräfe.

Pyrethri radix. Bertramswurzel.

(Zahn-, Speichel-, Bertramschamillenwurzel.
Von *Anthemis Pyrethrum* L., seltener von
Anacyclus Pyrethrum Lk., *Anacyclus officina-
rum* Hayne.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Latt-
werge, zu $\mathfrak{D}$ ß—j; im Aufguss, zu $\mathfrak{Z}$ j—ijj auf $\mathfrak{Z}$ iv, ess-
löffelweise, 2stündlich. Tinktur, 30—60 Tropfen, 2—
3mal. Kaumittel, Mund-, Gurgelwasser.

3067. *Rx.* Rad. pyrethri $\mathfrak{Z}$ v
Spirit. vini $\mathfrak{Z}$ ijj.

Digere. Colat. S. Nach Verordnung.

Anwend. Gegen paralytische Schwäche.

Innerlich giebt man aller 2 Stunden 40 Tropfen, und
äusserlich lässt man dabei täglich einigemal den kranken
Theil einreiben und darauf mit einer Bürste reiben.

Kopp.

3068. *Ry.* Pulv. rad. pyrethri $\bar{3}j$
 Mucilag. gummi arab. q. s.
 F. pil. xxx. Consp. lycop.

S. *Aller 4 Stunden 6 Stück.*

Anwend. Gegen Wechselfieber und Lähmungen.

Oxley.

3069. *Ry.* Rad. pyrethri $\bar{3}\beta$.
 Coque cum
 Aquae font. $\bar{3}xvj$ ad colat. $\bar{3}viij$.
 Cui refriger. adde
 Liquor. ammonii $\bar{3}ij$.

M. S. *Zum Gurgeln.*

Anwend. Gegen Erschlaffung des Zäpfchens und des weichen Gaumens, bei Heiserkeit von fehlerhafter Schleimabsonderung, Taubheit von starker Anschwellung der Tonsillen.

Barthol. Hosp. zu London.

3070. *Ry.* Semin. hordei excort.
 Rad. pyrethri $\bar{a}a$ $\bar{3}\beta$.
 Coque cum
 Aquae commun. q. s. per $\frac{1}{4}$ hor. ad Colat. $\bar{3}viij$.
 Cui refriger. adde
 Tinct. pimpinellae $\bar{3}\beta$
 Mellis rosati $\bar{3}j$.

M. D. S. *Umgeschüttelt, Gurgelwasser.*

Anwend. In ähnlichen Fällen.

Phoebus.

3071. *Ry.* Tinct. pyrethri $\bar{3}vj$
 Liniment. camphor. $\bar{3}\beta$
 Liqu. ammonii $\bar{3}ij$.
M. f. liniment.

S. *Zum Einreiben.*

Anwend. Gegen Frostbeulen und rheumatische Schmerzen.

Sprague.

3072. *Rx.* Fol. et flor. inulae bifrontis $\mathfrak{z}\text{j}$
Flor. spilanth. olerac. $\mathfrak{z}\text{iv}$
Rad. pyrethri $\mathfrak{z}\text{j}$
Alcohol. vini $\mathfrak{z}\text{vii}\mathfrak{j}$.
Macera per xiv dies. D. ad lagen. bene obturat.
S. Zahntinktur.

Paraguay-Roux.

Anwend. Gegen Zahnschmerz, namentlich neuralgischer Art.

Mufeland. v. Gräfe.

3073. *Rx.* Pulv. rad. pyrethri
Mastichis $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\text{j}$.
F. l. a. ad ignem masticatoria duo.
S. Eine Hälfte zu kauen.

Anwend. Bei Zahnschmerzen und paralytischen Affektionen der Zunge.

Q.

Quassiae lignum. Amerikanisches
Bitterholz.

(*Von Quassia amara L. oder Q. excelsa
Wright.*)

Form u. Gabe. In Pulver (ungern), zu gr. v—
xx; im Aufguss, weniger gut Abkochung, ʒij—iv auf
ʒvj, esslöffelweise, 2stündlich. Extrakt in Lösung, Pil-
len, zu gr. v—x, 3—4mal.

Man vermeide empfindlichere Metallsalze, salzsaures
Eisenoxyd.

3074. R_y. Pulv. ligni quassiae ʒj
Magnes. carbon. ʒiij.
M. f. pulvis.

S. Nach Bedürfniss 1 Theelöffel voll in kaltem
Wasser zu nehmen.

Pulvis antacidus Todii.

Anwend. Gegen Magensäure, Sodbrennen, ranziges Aufstos-
sen, Magenkrampf.

Tode.

3075. *Ry.* Pulv. ligni quassiae ʒij
 Sacchari albi ʒjß
 Pulv. cort. cinnamom. ʒß.
 M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. *Aller 3 Stunden 1 Pulver zu nehmen.*

Anwend. Magenstärkend.

Schubarth.

3076. *Ry.* Gummi resin. guajac. ʒß
 Sodae depur. sicc.
 Ligni s. cort. quassiae āā ʒij
 Semin. aneth. foenic. ʒjß
 Sacchari albi ʒj.
 M. f. pulvis.

D. S. *Früh und Abends 1 Theelöffel voll.*

Anwend. Bei atonischer Gicht.

Schwartze.

3077. *Ry.* Ligni quassiae ʒß.
 Infunde cum
 Aquae fervid. ℥j.
 Digere per horam. Colat. refriger. adde
 Tinct. cardamomi ʒj.

M. S. *Täglich 4mal 2 Esslöffel voll.*

Anwend. Als magenstärkendes Mittel.

Schubarth.

3078. *Ry.* Ligni quassiae ʒß
 Cort. aurant. curassav. ʒij.
 Digere per diem. Adde
 Vini rhenani generosi ℥jß.

Colat. S. *Täglich 3mal 1 Weinglas voll.*

Anwend. Stärkungsmittel.

Schubarth.

3079. *Ry.* Ligni quassiae $\mathfrak{Z}\text{iiij}$
 Catechu $\mathfrak{Z}\text{ij}$.
 Coque ex
 Aquae font. $\mathfrak{H}\text{j}$ ad colat. $\mathfrak{Z}\text{ix}$
 „ cinnamomi
 Syrup. mororum $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ $\mathfrak{Z}\text{j}$.

M. S. *Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.*

Anwend Gegen Erschlaffung der Schleimhäute und Muskeln.

Sundelin.

3080. *Ry.* Ligni quassiae rasp. $\mathfrak{Z}\beta$
 Kali carbon. e ciner. clav. $\mathfrak{Z}\beta$
 Aquae commun. ferv. $\mathfrak{Z}\text{viiij}$.
 Repone ad refriger. Colat. adde
 Tinct. cort. aurant. $\mathfrak{Z}\text{iiij}$.

M. S. *Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.*

Anwend. Bei Magenschwäche mit Säure, auch wohl als Surrogat geistiger Getränke, um Säufer allmählig davon zu entwöhnen.

Phoebus.

3081. *Ry.* Ligni quassiae rasp. $\mathfrak{Z}\beta$
 Aquae font. frig. $\mathfrak{Z}\text{xviiij}$.
 Macerentur saepius agitando per xxiv horas. Colaturae adde
 Aether. acetici $\mathfrak{Z}\text{j}$.

D. S. *Täglich 3mal 1 Weinglas.*

Anwend. Als magenstärkendes Mittel.

Berends.

3082. *Ry.* Ligni quassiae rasp. $\mathfrak{Z}\text{j}\beta$
 Rad. colombo $\mathfrak{Z}\text{j}$.
 Infunde in
 Aquae font. q. s.

Colat. ℥viii adde
Elixir. stomach. Whyttii ℥ij.

M. S. Allmählig zu verbrauchen.

Anwend. Bei schlechter Verdauung, die von Schwäche des Magens und Darmkanals herrührt, und bei wiederkehrender Gastrodynie durch Hyposthenie.

Brera.

3083. *Ry.* Extr. quassiae ℥ij
Vini hispan. ℥vj
Syrup. cinnamomi ℥jß.

M. S. Täglich 4mal 1 Esslöffel.

Anwend. Als Stärkungsmittel.

Berends.

Quercus. Eiche.

(Von *Quercus Robur L. u. Q., sessiliflora Sm.*)

A. *Quercus cortex junior*; junge Eichenrinde.

Form u. Gabe. Selten in Pulver, zu ʒß—j, mehrmals täglich; lieber in Abkochung, zu ℥ß—j mit ℥xij auf ℥vj, esslöffelweise, 2stündlich. Aeusserlich zu Streupulver, abgekocht zu Mund-, Gurgel-, Verbandwässern, Einspritzungen, Waschungen, Bähungen, Umschlägen, Klystieren, Bädern.

Man vermeide Metallsalze, Alaun, Säuren, leim- oder gallerthaltige Stoffe.

3084. *Ry.* Cort. quercus junioris ℥vj.
Coque ex
Aquae font. ℥xviii ad colat. ℥xij

Aluminis crudi $\mathfrak{z}\beta$
 Spirit. vini rectific. $\mathfrak{z}\text{ij}\beta$.

M. S. Mundwasser.

Anwend. Bei schlaflem Zahnfleische, Speichel- und Schleimfluss.

P. Frank.

3085. *Ry.* Cort. quercus rud. contusi $\mathfrak{z}\beta$.

Coque cum

Aquae commun. q. s. per $\frac{1}{2}$ hor.

Sub finem coct. adde

Herb. salviae $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Stent in infus. ferv. per $\frac{1}{4}$ hor. vase clauso.

Colat. $\mathfrak{z}\text{ij}$ adde

Spirit. cochlear. $\mathfrak{z}\beta$

Alumin. crudi $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. S. Zum Ausspülen des Mundes.

Anwend. Gegen skorbutische Blutflüsse aus dem Munde.

v. Hildenbrand.

3086. *Ry.* Cort. quercus gross. pulv. $\mathfrak{z}\beta$.

Coque cum

Aquae commun. $\mathfrak{z}\text{viiij}$ ad colat. $\mathfrak{z}\text{iv}\beta$.

Cui refriger. adde

Spirit. camphor.

Mellis rosati āā $\mathfrak{z}\text{vj}$.

M. S. Zum Einspritzen, stark umgeschüttelt.

Anwend. Gegen brandige Bräune bei Kindern.

Wendt.

3087. *Ry.* Decocti cort. quercus ($\mathfrak{z}\text{ij}\beta$) $\mathfrak{z}\text{xij}$

Aluminis crudi $\mathfrak{z}\beta$.

S. S. Zu Einspritzungen.

Anwend. Gegen atonische Metrorrhagie, Leukorrhöe.

Cooper.

3088. R_y. Cort. quercus $\overline{3}$ iv.

Coque cum

Aquae font. $\overline{8}$ vj ad reman. $\overline{8}$ ij.

Sub finem coct. adde

Herb. serpylli

„ roris marini $\overline{a}\overline{a}$ $\overline{3}$ β.

Ebulliant vase tecto, colatur. expressae et refrigeratae adde

Spiritus vini $\overline{3}$ ij.

M. D. S. Zu Einspritzungen.

Schubarth.

3089. R_y. Cort. querc. gross. pulv. $\overline{3}$ j.

Coque cum

Aquae commun. $\overline{8}$ j

sub finem coct. addendo

Flor. chamomill. vulg. $\overline{3}$ β ad Colat. $\overline{3}$ vj.

Cui refrigeratae adde

Tinct. myrrhae $\overline{3}$ ij.

M. D. S. Umgeschüttelt, zum äusserlichen Gebrauch.

Anwend. Als Verbandwasser bei schlaffen, unreinen Geschwüren, zu Einspritzungen in Fisteln.

Phoebus.

3090. R_y. Decoct. cort. quercus

Aquae saturninae $\overline{a}\overline{a}$ $\overline{3}$ vj

Album. ovorum ij

Liqu. myrrhae $\overline{3}$ ij.

M. S. Zöm Waschen.

Anwend. Gegen excoriirte Stellen, die in Brand überzugehen drohen.

3091. R_y. Rasur. cort. quercus

„ „ ulmi

„ „ salicis $\overline{a}\overline{a}$ $\overline{3}$ j.

Coque cum
 Vini rubri q. s.
 Colat. ℥j adde
 Sacchari saturni ʒjß
 Spirit. formicar. ʒiij.

D. S. Waschwasser.

Anwend. Gegen noch unvollkommen ausgebildete Leistenbrüche, aber auch gegen schon bestandene.

Dürr.

B. Glandes Quercus tostae; gebrannte, geröstete Eicheln.

Form u. Gabe. In Abkochung als Eichelkaffee, zu ʒij—iv auf ℥j Wasser, täglich zu verbrauchen.

3092. *Rx.* Gland. tostar. ʒß.
 Coque per $\frac{1}{4}$ hor. in
 Aquae commun. ℥ij.
 Filtra. Adde
 Syrup. gentianae ʒij.

S. Den Tag über tassen- oder gläserweise zu verbrauchen.

Anwend. Gegen Schwäche der Verdauung, Atrophie, Skrofeln, Rhachitis.

3093. *Rx.* Gland. querc. tostar. ʒjß
 Coffeae arabicae tostae ʒß.
 Cont. M. f. pulvis.

S. Morgens und Nachmittags einen halben bis ganzen Esslöffel voll mit 3 Tassen Wasser gekocht und filtrirt. Man lässt ihn kalt oder lau mit Milch und Zucker verbrauchen.

Anwend. In gleichen Fällen.

R.

Ratanhiae radix. Ratanhiawurzel.

(*Von Krameria triandra Ruiz et Pavon.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Lattwerge, zu ʒß—ij, mehrmals täglich; besser im Aufguss als in Abkochung, ʒiij—viij auf ʒvj—viij, esslöffelweise, 2stündlich. Mund-, Gurgelwasser, Klystier, Einspritzung, Waschung. Extrakt in Pillen, Bissen, Lösung, zu ʒj—ij, 3—4 mal; das in Amerika bereitete (*Extr. exoticum*) zu ʒß—j. Tinktur, ʒß—j.

Man vermeide Mineralsäuren, Weinstein, concentr. Essigsäure, Salzbilder, Basen, fast alle Salze, besonders Metallsalze, Eiweissstoff, Kleber, Stärkemehl, thierische Gallerte.

3094. R_y. Pulv. rad. ratanhiae ʒij

„ opii puri gr. j

„ sacchari albi ʒiv.

M. Div. in viij part. aequal.

S. Aller 3 Stunden ein Pulver.

Anwend. Bei Durchfall und Ruhr.

C. J. Meyer.

3095. *Ry.* Extr. exot. rantanhiae
 Catechu āā gr. x
 Alumin. depur. gr. iv
 Rad. liquirit. gr. x.
 M. f. pulv. Disp. tal. dos. xv.

S. Täglich 3—4mal ein Pulver.

Anwend. Bei rein atonischen Blutflüssen.

Vogt.

3096. *Ry.* Rad. ratanhiae ̄j.
 Coque ex
 Aquae fontan. ̄xvj ad colat. ̄viij
 Syrup. cinnamom. ̄jβ
 Mixtur. sulphurico-acidae ̄j.

M. S. Stündlich oder 2 stündlich einen Esslöffel
 mit Haferschleim.

Anwend. Gegen atonische Blutflüsse.

Sundelin.

3097. *Ry.* Pulv. rad. ratanhiae ̄vj.
 Coque cum
 Aquae fontan. ̄xxiv.
 Col. ̄viij adde
 Extr. ratanhiae ̄ij—iij.

M. S. Aller 2 Stunden 2 Esslöffel.

Anwend. Gegen passive Blutflüsse, weissen Fluss.

Kopp.

3098. *Ry.* Rad. ratanhiae
 Cort. chinae cont. āā ̄β.
 Ebulliant in
 Aquae fontan. q. s. per 1/4 hor.

Colat. $\bar{z}$ ix adde

Extr. vinos. cort. peruvian. $\bar{z}$ iv

Elix. stomach. Whyttii $\bar{z}$ j.

M. S. Den Tag über zu verbrauchen.

Anwend. Gegen heftige atonische Durchfälle, vorgerückte Lienterieen, übermässige auf Schwäche beruhende Blutflüsse, chronische Blennorrhöen s. s. w.

Brera.

3099. *Ry.* Extr. ratanhiaë $\bar{z}$ j
Aquae chamomill. $\bar{z}$ vj
Elix. acid. aromat. $\bar{z}$ ß.

S. S. Aller 2 Stunden 2 Esslöffel.

Anwend. Gegen atonische Mutterblutflüsse.

v. Hildenbrand.

3100. *Ry.* Herb. digital. purp. $\bar{z}$ ß.
Infunde cum
Aquae ferv. q. s. Digere per $\frac{1}{4}$ hor.
In colat. $\bar{z}$ vj solve
Extr. ratanhiaë $\bar{z}$ ß—j.

S. Aller 3 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Blutspeien.

Clarus.

3101. *Ry.* Syrupi de Tolu (balsamici) $\bar{z}$ j
Ferri sucarbonici
Extr. ratanhiaë $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{z}$ ij.

M. S. Täglich, wohlumgerührt, zu 4 — 6 Esslöffeln.

Anwend. Gegen Tripper und Aussickern von Schleim.

Ricord.

3102. *Rx.* Rad. ratanhiaë ʒij
 Alumin. depur. ʒj
 Cortic. cinnamom. acut. ʒij
 Mellis rosati ʒjß.
 M. f. electuarium.

S. Täglich 4mal einen grossen Theelöffel voll.

Anwend. Gegen atonische Mutterblutflüsse.

Vogt.

3103. *Rx.* Extr. ratanhiaë ʒij
 Aluminis ʒß
 Pulv. rad. calami aromat. ʒj.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. cinnamom.

S. Aller 3 Stunden 5—10 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen atonische Blutflüsse.

3104. *Rx.* Extr. ratanhiaë ʒß
 Mucilag. semin. cydon. ʒijß
 Aquae salviae ʒß.

M. S. Zum Auspinseln des Mundes.

Anwend. Gegen Mundfäule der Kinder.

Kopp.

3105. *Rx.* Extr. ratanhiaë ʒß
 Aquae salviae ʒvj
 Spirit. cochleariae ʒjß.

S. S. Zum Ausspülen des Mundes.

Anwend. Gegen lockeres Zahnfleisch.

Vogt.

3106. *Ry.* Extr. ratanhiaie ℥β
 Tinct. opii simpl. gutt. x—xv
 Aquae rosarum ℥jβ.

M. S. Mittelst eines damit getränktem Charpiepinsels das Zahnfleisch zu bestreichen.

Anwend. Gegen Merkurialsalivation.

Renard.

3107. *Ry.* Extr. ratanhiaie ℥β
 Aquae fontan. ℥xij
 Aceti ℥ij.

S. S. Zum Ausspülen des Mundes.

Anwend. Gegen Erschlaffung des Zahnfleisches und zur Befestigung der Zähne.

3108. *Ry.* Rad. ratanhiaie ℥x.
 Coque cum
 Aquae font. ℥iij ad remanent. ℥j.
 Col. refriger. adde
 Extr. ratanhiaie ℥β
 Tinct. Catechu
 „ kino āā ℥jβ.

S. Zum äussern Gebrauch.

Anwend. Gegen weissen Fluss so zu gebrauchen, dass man nach dem Urinlassen Abends vor Schlafengehen einen länglichrunden damit getränkten Schwamm in die Scheide einlegen lässt. Auch gegen Erschlaffung und Vorfall der Scheide nützlich.

Kopp.

3109. *Ry.* Rad. ratanhiaie ℥j.
 Coque cum
 Aquae font. ℥xij ad colat. ℥vj.

Adde

Aceti crudi $\bar{3}$ ij.

M. S. *Einspritzung.*

Anwend. Bei Blutflüssen aus der Gebärmutter.

Sundelin.

3110. Rx. Rad. ratanhiae

„ tormentillae

Cort. quercus $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$.

Conc. M. f. species. Div. in vj part. aequal.

D. S. *Morgens und Abends eine Portion mit 2 Weingläsern voll heissen Wassers aufgegossen zu einem Klystier.*

Anwend. Gegen Prolapsus intestinal recti ex atonia, Haemorrhagia uteri atonica u. s. w.

Vogt.

3111. Rx. Extr. exot. ratanhiae

Cort. quercus $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$

Aluminis depurati $\bar{3}j$.

M. f. pulvis.

D. S. *Schnupfpulver.*

Anwend. Gegen Auflockerung der Schleimhaut der Nase aus reiner Atonie.

Vogt.

3112. Rx. Extr. ratanhiae venalis $\bar{3}j$ —ij

„ myrrhae $\bar{3}j$

Rad. irid. flor, $\bar{3}vj$

Olei cassiae cinnam. gutt. ij

„ myrrhae gutt. x.

Bals. peruviani $\bar{3}\beta$.

M. f. pulv. subtiliss. D. in vitro.

S. *Zahnpulver.*

Lockstädt.

3113. R. Extr. ratanhiaie
 Zinci oxydati āā gr. iij—vj
 Hydrargyr. ammoniato-muriat. gr. j—ij
 Adipis suilli 3j.
 M. exacte; f. unguentum.

S. Täglich 1—3mal so viel ein Stecknadelkopf beträgt in das vom Schleim sorgfältig gereinigte Auge zu bringen.

Anwend. Gegen Ophthalmos und Blepharoblennorrhoea Neugeborener.

Kneschke.

Rhei radix. Rhabarberwurzel.

(*Rad. rhabarbari.* Von mehreren Arten Rheum, vorzüglich Rheum Emodi Wallich, Rheum undulatum L. u. s. w.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Lattwerge, zu gr. ij—v als gelindes Reiz- und Kräftigungsmittel der Verdauungswerkzeuge; zu ʒß — j — 3ß als Abführmittel, 1—3mal. Im Aufguss, Abkochung (weniger zweckmässig), zu 3ß—j auf ʒiij—iv, esslöffelweise oder auch die Hälfte auf einmal, je nach beabsichtigter Wirkung. — Extrakt, in Pillen, Bissen, Lösung, zu gr. v—xv, einigemal täglich. — Wässerige Tinktur (Tinctura rhei aquosa, Anima rhei, Infusum rhei kalinum), rein oder in Mixturen, zu 30—100 Tropfen, einigemal täglich. — Weinige Tinktur (Tinctura rhei vinosa, Darelîi, Vinum rhei), rein oder in Mixturen, zu 30—60 Tropfen, einigemal täglich. — Aeusserlich als Streupulver, infundirt zum Klystier, Verbandwasser.

Man vermeide starke Säuren, besonders Salpetersäure, Salzbilder, viele Salze, namentlich Alaun und Metallsalze, thierischen Leim, Gerbestoff.

3114. *Ry.* Rad. rhei
Tartari depurati āā 3ß.
M. f. pulvis.

S. Auf einmal zu nehmen.

Anwend. Mildes, aber kräftig wirkendes Abführmittel.

Vogel. Jahn.

3115. *Ry.* Rad. rhei gr. v—xv
Magnes. carbonic. gr. v
Elaeosacch. foeniculi gr. x.
M. f. pulvis.

S. Des Morgens auf einmal zu nehmen.

Anwend. Zur Abführung für Kinder von 1—8 Jahren.

Berends.

3116. *Ry.* Magnes. carbonic. 3ij
Rad. rhei 3ß
„ valerianae gr. viij
Elaeosacch. foeniculi 3j.
M. f. pulvis.

S. Täglich 2—3mal eine Messerspitze voll.

Pulvis puerorum Hufelandi.

Anwend. Gegen Blähungen, Koliken, Unruhe, Schlaflosigkeit, Verschleimung, Durchfall, Verstopfung, kleine Fieberbewegungen, Ausschläge der Kinder im ersten Jahre. Bei Atrophia mesenterialis täglich Aethiopis miner. gr. j zuzusetzen.

Hufeland.

3117. *Ry.* Magnes. albae 3j
Rad. rhei gr. x

Sapon. medicati ℥j.
M. f. pulvis.

S. Täglich einigemal eine Messerspitze voll.

Anwend. In ähnlichen Fällen.

3118. *Ry.* Rad. rhei
„ irid. florent. āā ℥j
Magnes. carbonic. ℥j
Olei foeniculi gutt. j.
M. f. pulvis.

S. Messerspitzenweise.

Anwend. Für Säuglinge bei Säure.

Ribke.

3119. *Ry.* Rad. rhei
„ calami aromat. āā ℥jß
Cort. peruvian. ℥iij
Elaeosacch. flaved. citri ℥ij.
M. f. pulv. D. in vitro.

S. Dreimal täglich einen Theelöffel.

Anwend. Zur Abführung, wo Schwächung zu meiden.

Berends.

3120. *Ry.* Rad. rhei ℥iv
Flaved. cort. aurant.
Ammon. muriat. dep. āā ℥ij
Semin. carvi ℥j
Sacchari albi ℥ij.
M. f. pulvis.

D. S. Täglich dreimal einen Theelöffel.

Anwend. Gegen Verschleimung der ersten Wege.

Vogt.

3121. *Ry.* Pulv. rad. rhei 3jß
 Ammon. muriat. dep. ʒiv
 Elaeosacch. anisi 3ß.
 M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.
S. Aller 2—3 Stunden ein Pulver mit Wasser
 zu nehmen.

Anwend. In ähnlichen Fällen.

Vogt.

3122. *Ry.* Pulv. rad. rhei
 „ „ jalapae
 Kali nitrici
 Tartari depurati aa 3j.
 M. f. pulvis.
D. S. Messerspitzen voll zu nehmen.

Anwend. Abführmittel.

Vogler.

3123. *Ry.* Pulv. rad. rhei opt.
 Magnes. albae aa 3jß
 Natri sulphurici 3ß
 Flaved. cort. aurant. 5j.
 M. f. pulvis.

S. Theelöffelweise.

Anwend. Digestivpulver.

Schwartze.

3124. *Ry.* Rad. rhei ʒij
 Extr. cort. peruvian. q. s.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.
S. Früh und Abends 5—10 Stück.

Anwend. Gelindes und nicht schwächendes Abführmittel.

Berends.

3125. *Ry.* Pulv. rad. rhei
 Sapon. medic. āā 3β
 Extr. aloës gr. xv.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Täglich 3mal 10 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei Unterleibsstockungen und Hämorrhoidalzufällen.

Richter.

3126. *Ry.* Rad. rhei
 Sapon. medic.
 Fellis tauri inspiss. āā 3ij
 Pulv. rad. taraxaci q. s.
 F. pil. gr. ij. Consp. cinnamom.

S. Täglich 3mal 8 Stück.

Anwend. Gegen habituelle Leibesverstopfung in Folge von Torpor der Gedärme.

Hufeland.

3127. *Ry.* Hydrargyr. muriat. mit. gr. vj
 Extr. hyoscyami ʒj
 „ conii maculati ʒβ
 Pulv. rad. rhei 3β.
 M. f. pil. xxx. Consp. lycop.

S. Aller 3 Stunden eine Pille.

Anwend. Gegen Stockungen im Unterleibe.

Sundelin.

3128. *Ry.* Pulv. rad. rhei
 Sapon. medic.
 Ammoniacy
 Extr. taraxaci āā 3ij.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Täglich 3mal 15 Stück zu nehmen.

Anwend. Als auflösendes Mittel.

Richter.

3129. *Ry.* Rad. rhei ʒij
 Hydrargyr. muriat. mit. ʒß
 Sapon. medic. ʒij
 Extr. conii macul. ʒj
 „ chelidonii ʒij.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. pulv. rad. liquirit.

S. Morgens und Abends 10—12 Pillen.

Anwend. Gegen hartnäckigen Icterus in Folge von Leberverhärtung.

Flemming.

3130. *Ry.* Rad. rhei
 Natri carbonici aciduli
 Fellis tauri inspissati aa ʒj.
 M. f. pil. gr. iij. Consp. pulv. rad. rhei

S. Täglich 3mal 8 Stück.

Anwend. Bei Verstopfung in Folge von Leberleiden mit Anomalieen in der Gallenabsonderung und lästigen Empfindungen in der Lebergegend.

3131. *Ry.* Rad. rhei ʒjß
 Ferri sulphurici ʒß
 Sapon. albi ʒij
 Aquae q. s.
 F. pil. xxx. Consp. lycop.

S. Abends 3—4 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei Verstopfung und um den Ton der Därme zu stärken.

3132. *Ry.* Rad. rhei opt.
 Sapon. medic.
 Terebinth. aa ʒj
 Syrup. simplicis q. s.
 M. f. l. a. electuarius.

S. Täglich 3mal einen Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Wassersucht.

Berends.

3133. *Ry.* Pulv. rad. rhei 3j
 Sapon. veneti rasi 3jß
 Roob sambuci q. s.
 ut f. boli viij. Consp. pulv. flor. cassiae.

S. Aller 2 Stunden ein Stück.

Anwend. Bei Stockungen in der Cirkulation der Blutgeweide des Unterleibes und dadurch bedingten Verstopfungen.

Brera.

3134. *Ry.* Rad. rhei 3ß
 Fol. sennae pulv. ʒj
 Syrup. cort. aurant. q. s.
 ut f. bolus. Consp. pulv. flor. cassiae.

S. Morgens zu verschlucken.

Anwend. Als Abführmittel.

Vogt.

3135. *Ry.* Rad. rhei pulv. 3ß
 Magnes. sulphuricae ʒj
 Pulpae tamarind. q. s.
 ut f. bolus. Consp. pulv. semin. anisi.

S. Des Morgens zu nehmen.

Anwend. Als Abführmittel.

Vogt.

3136. *Ry.* Rad. rhei 3jß
 „ gentian. rubr. 3ß
 Fol. sennae
 Magnes. sulphur. āā 3iij
 Aquae bullientis 3ij.
 Digere per ¼ hor. Col. refriger. et expr. adde

Spirit. sulphur.-aether. gutt. viij
l. Tinct. aromat. ʒj.

M. S. Früh und Abends einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Dyspepsie mit Trägheit des Stuhlganges, ohne Fieber und Ueberfüllung des Pfortadersystems.

Schol. clin. Lips. Clarus.

3137. *Ry.* Rad. rhei ʒß
„ calami aromat. ʒjß.
Infunde cum
Aquae ferv. ad colat. ʒiij
Liqu. kali acetici ʒj.

M. S. Esslöffelweise.

Anwend. Digestivmittel in gastrischen Zuständen und bei Verdauungsschwäche.

Choulant.

3138. *Ry.* Rad. rhei ʒjß
„ ipecacuanhae ʒß.
Infunde cum
Aquae ferv. ʒiij.
Ebulliant, colat. adde
Pulv. gummi mimos. ʒj
Syrup. althaeae ʒiij.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Im späteren Stadium der Ruhr.

Fr. Jahn.

3139. *Ry.* Rad. rhei ʒij
Ligni quassiae ʒj.
Coque cum
Aquae font. ʒviiij ad rem. ʒiv.
Colat. admisce
Aether. sulphur.

Essent. aromat. āā 3j
 Aquae menthae pip.
 Syrup. cinnamomi āā 3ß.

M. S. Täglich 2—4mal einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Appetitlosigkeit Hypochondrischer.

Fr. Jahn.

3140. *Ry.* Rad. rhei 3ß—j
 Natri carbonici 3j.
 Infunde cum
 Aquae ferv. q. s ad colat. 3iij
 Elaeosacch. anisi 3iij.

S. S. Esslöffelweise bis zur Wirkung.

Anwend. Als Abführmittel.

141. *Ry.* Rad. rhei 3ij
 Cort. aurantior. 3ij
 „ cinnamomi 3j
 Vini rhenani generosi 8ij.
 Digere per aliquot dies. Colat. adde
 Syrup. cort. aurant. 3ij.

M. D. S. Täglich dreimal 2 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Trägheit des Stuhlganges aus Schwäche des Darmkanals.

3142. *Ry.* Tinct. rhei aquos. 3jß
 Liqu. kali acetici 3ß.

M. S. Früh und Abends 80 Tropfen.

*Anwend. Bei Verstopfung der Unterleibseingeweide ein vor-
 treffliches Mittel.*

Tode.

3143. *Ry.* Extr. cort. peruvian. fusci
Aquae cinnam. vin. āā 3j
Tinct. rhei aquosae 3vj.

S. S. Früh und Abends 70 Tropfen in Kalmus-
thee.

Anwend. Gegen Skrofeln.

Tode.

144. *Ry.* Tinct. rhei aquosae 3jβ
Liqu. ammon. pyro-oleosi 3ij
Aquae cinnamom. 3jβ
Syrup. opiatī 3ij—iv—vj.

M. S. Aller 1½ Stunden einen Theelöffel.

Anwend. Gegen chronischen Durchfall für ein Kind von einem
Jahre.

Vogt.

3145. *Ry.* Tinct. rhei aquosae
Extr. taraxaci liquidi āā 3j
Chinii sulphurici gr. vj
Aquae foeniculi 3iv
Spirit. sulphur.-aetherei 3β.

M. S. Umgeschüttelt, aller 3 Stunden einen Ess-
löffel voll.

Anwend. Bei Stockungen im Unterleibe und vorwaltender
Neigung zur Verstopfung, wo man auflösen muss, ohne zu
schwächen und zu erschaffen.

M. E. A. Naumann.

3146. *Ry.* Lapid. cancror. 3j
Aquae foeniculi 3j
Tinct. rhei aquosae
Syrupi mannati āā 3β.

M. S. Umgeschüttelt, 2stündlich einen Theelöffel.

Anwend. Gegen Icterus neonatorum.

Wendt.



3147. *Ry.* Magnes. carbonic. 3ß
 Tinct. rhei aquosae 3vj
 Syrupi cort. aurant. 3ij.

M. S. Aller 2—3 Stunden, umgeschüttelt, einen Theelöffel.

Anwend. Bei Kindern gegen Erbrechen von Säure.

Buchholz.

3148. *Ry.* Tinct. rhei aquosae 3ij
 „ aromatica 3ij.

M. D. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

3149. *Ry.* Tinct. rhei aquosae
 Elix. visceral. Kleinii
 Aquae cinnamom. aa 3jß
 Tinct. opii simpl. gutt. xl.

M. D. S. Täglich 3—4mal einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen passive Bauchflüsse.

Richter.

3150. *Ry.* Tinct. rhei vinosae
 Elixir. aurant. comp.
 Aquae menthae piperit. aa 3j.

M. D. S. Täglich 3mal einen Esslöffel voll.

Anwend. Als stärkendes und gleichzeitig gelind auflösendes Mittel.

Richter.

3151. *Ry.* Tinct. rhei vinosae
Aquae cinnamomi $\overline{aa}$ $\overline{3ij}$.

M. D. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

3152. *Ry.* Tinct. rhei vinosae $\overline{3\beta}$
Mucilag. gummi mimos. $\overline{3ij}$
Aquae cinnamomi $\overline{3iv}$
Spirit. sulphur.-aether. $\overline{3ij}$.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Zur Stärkung des Darmkanals nach Durchfall.

Vogel.

3153. *Ry.* Sapon. venet. $\overline{3ij}$
Extr. rad. rhei $\overline{3\beta}$
Pulv. rad. rhei q. s.
F. suppositoria tria. Ungantur unguent. rosato.
D. in charta cerata.

S. Jeden Morgen eins in den Mastdarm zu bringen.

Anwend. Gegen Stuhlverstopfung.

Vogt.

3154. *Ry.* Pulv. rad. rhei $\overline{3j}$.

S. Zum Aufstreuen.

Anwend. Bei unreinen, schlaffen, veralteten Geschwüren der unteren Extremitäten, um die Absonderung zu verbessern.

Home.

Rhei extractum compositum; zusammengesetztes Rhabarberextrakt.

(*Extractum panchymagogum Crollii, catholicum.*)

Form u. Gabe. In Pillen, Bissen, zu gr. ij — x, 1 — 4 mal täglich.

3155. Ry. Extracti rhei compos. gr. xvj
Calomelanos gr. iv.

M. f. pil. x. Consp. lycop.

S. Auf einmal zu nehmen.

Anwend. Gegen hartnäckige Verstopfung.

Vogel.

3156. Ry. Extract. rhei compos. gr. x
Ferri pulverati gr. v
Aloes ʒj.

M. f. pil. gr. j. Consp. lycop.

S. Vier Stück auf einmal zu nehmen.

Anwend. Bei Verstopfung und Erschlaffung der Därme.

Schubarth.

3157. Ry. Extr. rhei compos.
Sapon. medic. āā ʒjß
Extr. hyoscyami ʒß.

M. f. pil. gr. ij Consp. lycop.

S. Abends 5 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Verstopfung, die das Alpdrücken begleitet.

Strahl.

Rhododendri chrysanthi folia.

Schneerosenblätter.

(Gichtrose. Von Rhododendrum chrysanthum L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, zu gr. v—x—xxx, 2—3 mal; im Aufguss oder Abkochung, $\mathfrak{3ij}$ auf $\mathfrak{3viij}$, zweimal eine halbe Tasse.

3158. *Ry.* Pulv. fol. rhododendr. chrysanthi $\mathfrak{2j}$
Sacchari flav. cort. citri attriti $\mathfrak{2ij}$.

M. f. pulv. Div. in part. $\mathfrak{ij}$ aequal.

S. *Früh Morgens beide zu nehmen.*

Anwend. Gegen Gicht.

Clarus.

3159. *Ry.* Fol. rhododendr. chrysanthi $\mathfrak{3ij}$.

Infunde cum

Aquae font. $\mathfrak{3ix}$.

Digere leni igne vase clauso per hor. xxiv.

Colat. S. *Morgens und Abends eine Tasse voll zu trinken.*

Anwend. Gegen Gicht.

Kölpin.

3160. *Ry.* Fol. rhododendr. chrysanthi $\mathfrak{3ij}$ —vj.

Coque ex

Aquae $\mathfrak{3x}$ ad colat. $\mathfrak{3vj}$

Syrupi balsamici $\mathfrak{3j}$.

M. S. *Täglich 3mal 1—3 Esslöffel.*

Anwend. Gegen Gicht.

Berends.

3161. R_y. Fol. rhododendr. chrysanthi ℥ij—iij.

Infunde

Aquae fervid. ℥ix ad colat. ℥vj.

Refriger. adde

Tinct. aconiti aether. ℥j

Vini stibiati ℥ij

Syrupi balsam. peruvian. ℥j.

M. D. S. Aller 3 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Gegen inveterirte Gichtformen und gichtische Lähmungen.

Sobernheim.

3162. R_y. Fol. rhododendr. chrysanthi ℥ij

Aquae comm. ferv. ℥iv.

Ebulliant semel. Colat. adde

Tinct. aromaticae ℥j.

M. D. S. Dreistündlich einen Esslöffel.

Anwend. Gegen chronischen Rheumatismus.

Augustin.

3163. R_y. Pulv. herb. rhododendr. chrysanthi

Gummi guajaci āā ℥iß

Extr. aconiti ℥ij

„ dulcamarae ℥iv.

M. f. pil. gr. ij. Consp. lycopod.

S. Früh und Abends 10 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen atonische Gicht.

Kreysig.

3164. R_y. Fol. rhododendr. chrysanthi

„ digital. purp. āā ℥iij—v

Herbae hyoscyami

„ „ conii macul. āā ℥ij—iij

Herbae sabinae $\mathfrak{z}$ iv—vj.
M. f. pulv. gross.

S. Zum Bade.

Anwend. Gegen chronische Gicht.

Man lässt diese Species mit kochendem Wasser aufgiessen und mehrere Stunden digeriren, worauf sie durch ein leinenes Tuch geseihet und nebst $1\frac{1}{2}$ —2 $\mathfrak{L}$ gemeiner Salzsäure dem Bade zugesetzt werden.

Kopp.

Rhois toxicodendri folia.

Giftsumachblätter.

(*Rhois radicans folia*; Wurzelsumachblätter.
Von *Rhus toxicodendron* und *Rhus radicans* L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, zu gr. j—v, 2—3mal; im Aufguss zu $\mathfrak{z}$ ß—j auf $\mathfrak{z}$ iv, 3—4mal einen Esslöffel. — Extrakt, in Pulver, Pillen, Lösung, zu gr. j—v, 2—3mal. — Essenz aus frischen Blättern, zu 1—20 Tropfen; Tinktur, zu 3—5—20 Tropfen, 2—3mal.

3165. Rx. Fol. rhois radic. gr. j
Rad. liquirit. $\mathfrak{z}$ j
Roob sambuci q. s.
M. f. pil. iv. Consp. lycop.

S. Aller 4 Stunden ein Stück.

Anwend. Bei Lähmungen in Folge von Schlagfluss. Man steigt mit der Gabe des Rhus täglich um gr. j, bis ein gewisses Brennen im Magen bemerkbar wird. Diess ist das Zeichen, bis wie weit man mit der Gabe steigen, und in welcher man fortfahren kann.

Brera.

3166. *Ry.* Extr. rhois radicant.
 Camphor. rasae āā gr. xv
 Extr. arnicae
 „ valerianae āā 3ß
 Pulv. rad. calami arom. q. s.
 F. pil. gr. iij. Consp. lycop.

S. *Aller 4 Stunden 3 Pillen.*

Anwend. Gegen Hemiplegie.

v. Hildenbrand.

3167. *Ry.* Tinct. rhei toxicodendr. gutt. iv—x
 Aquae destillat. 3ij.

M. S. *Täglich einen Kaffeelöffel voll.*

Anwend. Gegen skrofulöse und herpetische Augenentzündung,
 und herpetischen Ausschlag des Gesichts.

v. Lichtenfels. Gescheidt.

3168. *Ry.* Tinct. fol. rhois toxicodendr. gutt. iv
 Aquae foeniculi 3ij.

M. D. S. *Täglich 3mal 1 Kinderlöffel voll, wobei
 nach und nach mit der Tinktur so gestiegen
 wird, dass 8—16 und zuletzt 32 Tropfen auf
 die angegebene Quantität Fenchelwasser zuge-
 setzt werden.*

Anwend. Gegen äusserst hartnäckige skrofulöse Augenent-
 zündungen mit heftiger Lichtscheu.

Elsholz. Scheibler.

Ricini oleum. Ricinusöl.

(*Oleum palmae Christi, Palmae liquidum; Wunderbaumöl, Kastoröl. Von Ricinus communis L.*)

Form u. Gabe. Allein oder in Emulsion, zu $\overline{3}\beta$ — $\overline{1}\beta$, mit Fleischbrühe, Kaffee. — Klystier, Einreibung.

3169. *Rx.* Olei ricini rec.
Aquae menth. pip. $\overline{a}\overline{a}$ $\overline{3}\text{ij}$.

M. S. Umgeschüttelt, esslöffelweise zu nehmen.

Potio anthelminthica laxativa Brerae.

Anwend. Ein vorzügliches Mittel in Wurmkrankheiten bei Subjekten verschiedenen Alters.

3170. *Rx.* Olei ricini $\overline{3}\text{j}$
Vitellum ovi j .
Terendo sensim misce cum
Aquae flor. aurant. $\overline{3}\text{ij}$
Succi citri rec. expr. et colati $\overline{3}\text{ij}$.

D. S. Umgeschüttelt, auf einmal zu nehmen.

Anwend. Als angenehmes Abführmittel bei Würmern, und wo die Kranken einen Widerwillen gegen das reine Ricinusöl haben.

Phoebus.

3171. *Rx.* Olei ricini rec. $\overline{3}\text{j}$
Vitellum ovi j
Decoct. cort. radic. punic. granat. ex $\overline{3}\beta$ parati $\overline{3}\text{v}$
Succi citri $\overline{3}\text{ij}$.

M. S. Alle Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Würmer.

Fuchs.

3172. *Ry.* Olei ricini rec. $\mathfrak{Z}\text{ij}$
 Pulv. gummi mimos. $\mathfrak{Z}\text{i}$
 Decoct. rad. althaeae $\mathfrak{Q}\text{ij}\beta$.
 M. f. l. a. emulsio.

D. S. Alle Stunden 1 Tasse voll zu nehmen.

Anwend. Als gelindes Abführmittel.

Jos. Frank.

3173. *Ry.* Olei ricini rec. $\mathfrak{Z}\text{ijj}—\text{vj}$
 Gummi mimos. q. s.
 Aquae foenicul. $\mathfrak{Z}\text{ij}$
 Syrup. mannati $\mathfrak{Z}\text{j}$.
 F. l. a. emulsio.

S. Kindern löffelweise bis zur Wirkung.

Anwend. Als Abführung für Kinder.

Berends.

3174. *Ry.* Olei ricini $\mathfrak{Z}\text{j}$
 Vitellum ovi j
 Aquae cort. aurant. l. menth. l. anisi $\mathfrak{Z}\text{ij}$.
 M. exacte. Sensim adde
 Aquae fontan. $\mathfrak{Z}\text{ij}$.

S. Auf einmal zu nehmen.

Anwend. In Fällen, wo die Kranken einen Widerwillen gegen das reine Oel haben.

Miquel.

3175. *Ry.* Olei ricini $\mathfrak{Z}\text{j}$
 Aetheris sulphurici $\mathfrak{Z}\text{ij}$.

M. S. Aller 2 — 4 Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Bandwurm.

Alibert.

3176. *Rx.* Olei ricini $\bar{3}j$
 Syrup. althaeae $\bar{3}\beta$
 Pulv. gumm. mimos. $\bar{3}j$
 Aquae sambuci $\bar{3}ij$
 Spirit. nitrico-aether. $\bar{3}j$
 Tinct. opii crocatae $\bar{3}j$.

M. S. Alle Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. In der entzündlichen und rheumatischen Ruhr, wo der Unterleib höchst schmerzhaft, des Abganges wenig, des Zwanges aber viel ist.

Fr. Jahn.

3177. *Rx.* Olei ricini $\bar{3}j - j\beta$
 Vitell. ovor. ij
 Infusi chamomill. $\bar{3}vj$.

M. S. Klystier.

Anwend. Bei starker Verstopfung.

Berends.

3178. *Rx.* Frondis sabinae
 Herbae rutae
 „ absinthii $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}iiij$.
 Coque ex aquae $\bar{3}xvj$ ad colat. $\bar{5}x$.
 Adde
 Olei ricini $\bar{3}\beta$.

M. S. Zu zwei Klystieren.

Anwend. Gegen Askariden.

Duncan.

3179. *Rx.* Olei ricini $\bar{3}j\beta$
 Tinct. colocynthid. $\bar{3}\beta$.

M. S. Früh und Abends 1 Theelöffel voll in den Unterleib einzureiben.

Anwend. Bei Verstopfung, oder zur Zertheilung angeschwollener Drüsen.

Heim.

Rorismarini herba. Rosmarinkraut.*(Anthos. Von Rosmarinus officinalis L.)*

Form u. Gabe. Als Theeaufguss, $\bar{3}j$ — ij auf 2 Tassen. Aeusserlich zu Kräutersäckchen; im Aufguss zu Bähungen, Waschungen, Bädern. Spiritus. Unguentum rorismarini compositum s. nervinum.

3180. *Rx.* Herb. rorismarini
 „ salviae
 „ serpylli $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$.

Infunde in

Aquae ferv. q. s.

Digere per $\frac{1}{2}$ hor. vase clauso.

In colat. $\bar{8}j$ solve

Sal. ammoniaci $\bar{3}ij$

Aceti rutae $\bar{3}ij$.

M. S. Zum Umschlag.

Anwend. Bei Kontusionen, Sugillationen, um die Aufsaugung zu befördern.

3181. *Rx.* Spirit. rorismarini
 Tinct. galbani
 „ absinthii $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$.

M. S. 40—60 Tropfen in einem Esslöffel voll Wasser zu nehmen.

Anwend. Gegen Hysterie und schleimiges Asthma.

Vogel.

3182. *Rx.* Spirit. rorismarini $\bar{3}j$
 Olei anisi gutt. vj .

M. S. Löschpapier damit getränkt auf die Magengegend zu legen.

Anwend. Gegen das Erbrechen durch Fahren u. s. w.

Vogel.

3183. Ry. Herb. rorismarini
 Flor. lavandulae āā ʒij
 Rad. calami aromat. ʒiiij.

Conc. M. S. Zu einem Bade mit 3 Quart Wasser angebrüht.

3184. Ry. Spirit. rorismarini ʒij
 „ camphorae ʒj
 „ sal. ammoniaci aquos. ʒß.

M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen zurückgebliebene Muskelschwäche nach starken Kontusionen.

3185. Ry. Unguent. rorismar. comp. ʒij
 Olei lavandulae
 „ cajeputi
 „ menthae
 „ chamomillae āā ʒj.

M. f. unguent.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Bei Lähmungen.

Augustin.

3186. Ry. Unguent. rorismar. comp. ʒj
 Balsam. copaivae ʒij.
M. f. unguent.

S. Zum Einreiben in Damm und Regio pubis.

Anwend. Gegen hydropische Zufälle bei Kindern.

Wendt.

3187. *Rx.* Unguent. rorismar. comp. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Tinct. cantharid. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Camphorae $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. S. Täglich 3–4mal in die afficirten Theile einzureiben.

Anwend. Bei Lähmungen.

Cerutti.

Rutae herba. Raute.

(*Rutae folia*; Garten-, Weinraute. Von *Ruta graveolens* L.)

Das trockene, länger aufbewahrte Kraut ist unkräftig, kann daher nicht empfohlen werden. Am zweckmässigsten wendet man (im Mai und Juni) den Presssaft, das frische Kraut selbst auf Butterbrod oder den aus dem frischen Kraute bereiteten Essig an.

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, zu $\mathfrak{z}\beta\text{—j}$; im Aufguss, $\mathfrak{z}\text{j—iij}$ auf $\mathfrak{z}\text{iv—vj}$, esslöffelweise. Aeusserlich zu Mund- und Gurgelwässern, Einspritzungen, Bähungen, Klystieren, Bädern.

3188. *Rx.* Herbae rutae
 „ matricariae āā $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Conc. infunde in

Aquae ferv. q. s. per $\frac{1}{4}$ hor. vase clauso.

Colat. $\mathfrak{z}\text{viiij}$ adde

Extr. millefol. $\mathfrak{z}\text{j}$

Tinct. croci $\mathfrak{z}\beta\text{—j}$

Syrup. cort. aurant. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. S. Aller 3 Stunden $\frac{1}{2}$ Tasse voll.

Anwend. Gegen Menstruations-Anomalieen.

3189. *Rx.* Spirit. sal. ammon. aquos. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Aceti rutae q. s. ad perfect. saturationem

Aquae rutae $\bar{\text{z}}\text{vj}$
 Syrupi simpl. $\bar{\text{z}}\text{j}$.

M. S. Aller 2 Stunden 2 Esslöffel.

Anwend. In der Wassersucht.

Störk.

3190. *Rx.* Herb. rutae
 „ salviae $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{z}}\text{ij}$.

Infunde cum

Aquae ferv. $\bar{\text{z}}\text{xij}$.

Colat. refriger. adde

Spirit. cochleariae $\bar{\text{z}}\text{ij}$

Tinct. laccae $\bar{\text{z}}\text{j}$.

M. S. Mundwasser.

J. A. Schmidt.

3191. *Rx.* Herb. rutae
 Flor. chamomill. $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{z}}\beta$
 Baccar. lauri cont. $\bar{\text{z}}\text{ij}$.

Infunde in

Aquae ferv. $\&\text{j}\beta$.

Stent in digest. calida vase clauso per $\frac{1}{4}$ hor.

Colat. adde

Tinct. myrrhae $\bar{\text{z}}\beta$

Mellis rosar. $\bar{\text{z}}\text{j}$.

M. S. Lauwarm täglich 2—3mal zu $\bar{\text{z}}\text{iiij}$ vorsichtig einzuspritzen.

Anwend. Bei Putrescenz der Gebärmutter.

Man lässt die Kranke auf den Rücken und den Steiss erhöht legen.

J. A. Schmidt.

3192. *Rx.* Herbae rutae
 „ scordii $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{z}}\text{j}$.

Conc. infunde in

Aquae ferv. q. s. per $\frac{1}{2}$ hor. vase clauso.

Colat. ℞j adde

Sal. ammoniaci ℥ij

Aceti rutae ℥ij.

M. S. Zu warmen Umschlägen.

Anwend. Nach Kontusionen und Sugillationen.

3193. *Ry.* Herbae rutae ℥j
Flor. arnicae ℥vj.

Infunde

Aquae ferv. q. s. ad colat. ℥xij.

S. Mit Kompressen über das Auge zu schlagen.

Anwend. Gegen Kontusionen und Blutaustretungen im Auge.

v. Gräfe.

S.

Sabadillae semina. Sabadillsamen.

(*Mexikanischer Läusesamen; Kapuzinersamen.*
Von Veratrum Sabadilla Retz.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Latt-
werge (unzweckmässig), zu gr. ij — x; im Aufguss mit
Wasser oder Milch, $\mathfrak{3j}$ auf $\mathfrak{3vj}$, in 2 Tagen zu verbrau-
chen. Aeusserlich zu Streupulver, Waschwasser, Klystier,
Salbe.

3194. Rx. Pulv. semin. sabadill. gr. ij
„ ferri sulphur. cryst. gr. j
„ semin. cinae
Magnes. albae $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{3}\beta$.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. viij.
S. Täglich 4mal 1 Stück zu nehmen.
Anwend. Gegen Spulwürmer.

Clarus.

3195. Rx. Semin. sabadill. $\mathfrak{3ij}$.
Coque cum
Aquae font. $\mathfrak{3x}$.

Colat. ℥vij adde
Lact. vaccini ℥vij.

D. S. Zum Klystier.

Anwend. Gegen Askariden.

Lentin.

Veratrium; Veratrin.

(*Veratrinum, Veratria, Veratrina, Sabadillinum; Veratrine, Sabadilline. Auch aus der Wurzel des Veratrum album L.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Syrup, Lösung, zu gr. $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{4}$, 2—3 mal. Aeusserlich zu Salben oder Lösungen, zu gr. v—x auf ℥j.

3196. **Ry.** Veratrii gr. j
Pulv. gumm. arab. gr. iil
Syrup. gummosi q. s.
F. pil. xij. Consp. lycop.

S. Täglich mit 1 Stück anzufangen und nach und nach bis auf 3 zu steigen.

Magendie.

3197. **Ry.** Veratrii gr. j
Extr. hyoscyam.
Pulv. liquirit. āā gr. x.
M. f. pil. x. Consp. lycop.

S. Stündlich 1 Stück.

Anwend. Gegen Nervenschmerzen, Rheumatismen.

Turnbull.

3198. *Ry.* Veratrii gr. iv
Alcohol. $\bar{3}$ j.

S. S. 10—25 Tropfen in einer Tasse schleimigen Getränks.

Tinctura Veratrii Magendii.

Anwend. Gegen Wassersucht, besonders Bauch- und Hautwassersucht; äusserlich bei Gicht, Wassersucht.

Magendie.

3199. *Ry.* Veratrii gr. j
Aquae destill. $\bar{3}$ ij.

S. S. Täglich 3—4mal 1 Theelöffel.

Solutio Veratrii Magendii.

Anwend. In gleichen Fällen, wie das vorige.

3200. *Ry.* Veratrii gr. v—xx—xxx
Axung. porci $\bar{3}$ j.
M. f. unguent.

S. Täglich 2mal, bei nicht abnehmendem Uebel öfter, einer Haselnuss gross einzureiben.

Anwend. Gegen Neuralgien, Rücken-, Lenden- und Nierenschmerzen, Gesichtsschmerz, Amaurose, Gicht, Rheumatismus, Lähmungen, Wassersuchten, syphilitische Knochenschmerzen u. s. w., Herz- und Cirkulationskrankheiten ohne organische Fehler.

Die Einreibung darf nicht auf von der Oberhaut entblössten Stelle geschehen; man macht sie mit den Fingern.

Turnbull.

Magendie empfiehlt nur gr. iv auf $\bar{3}$ j gegen Bauchwassersucht, chronischen Rheumatismus, Gicht. In letzteren Fällen lobt auch Werneck das Mittel sehr. Radius sah einigemal Nutzen, andere Male nicht, ich sehr selten.

3201. *Ry.* Veratrii 3ß
 Olei hyoscyam. (papav.) 8ß.
 Digere leni calore ad solut. usque.

S. Zum Einreiben.

Anwend. In gleichen Fällen.

Cunier.

3202. *Ry.* Veratrii ʒj
 Kali hydroiodin. 3ß
 Axungiae 3j.
 M. f. unguent.

S. Zum Einreiben in die Herzgrube.

Anwend. Bei Herzkrankheiten, besonders mit gichtischer und rheumatischer Diathese, beim einfachen, nervösen und gichtischen Herzklopfen, und als Diureticum bei organischen Herzleiden.

Turnbull.

3203. *Ry.* Veratrii gr. v—x
 Adipis suilli 3ß—j.
 M. f. unguent.

S. Täglich 2—3mal bohnergross in die Nähe des leidenden Theiles einzureiben.

Anwend. Gegen Prosopalgie, Ischiadik, Koxalgie und Omalgie.

Ebers.

Sabinae turiones. Sadebaumspitzen.

(*Herba, folia, frondes Sabinae; junge Triebe des Sadebaumes. Von Juniperus Sabina L.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Lattwerge, zu v—xx, 2—3mal; im Aufguss oder (weniger zweckmässig) Abkochung, $\bar{3}$ ij—viij auf $\bar{3}$ vj—viij, esslöffelweise, 3—4mal. — Am zweckmässigsten ist eine aus frischem Kraute (im Frühjahr) bereitete Konserve (1 auf 3 Zucker), theelöffelweise, mehrmals täglich. — Extrakt, zu $\mathfrak{B}$ —j, 2—3mal. — Oel, 1—3 Tropfen, täglich. — Aeusserlich als Streupulver, zu Einspritzungen, Salben, Einreibungen, Gurgelwässern, Umschlägen, Bädern.

3204. Rx. Pulv. frond. sabinae
Boracis
Zingiberis
Sacchari albi $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ j.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Früh und Abends 1 Pulver.

Anwend. Gegen schmerzhaftes Menstruation aus Atonie des Fruchthälters.

3205. Rx. Folior. sabinae recent: $\bar{3}$ ij.
Contunde in mort. marm. addendo paul. aquae
in pultem tenerr., cui adde
Sacchari albi $\bar{3}$ iv.
F. l. a. conserva.

S. Täglich 2—3mal 1 kleinen Theelöffel voll.

Anwend. Bei Unfruchtbarkeit aus Torpor der Geschlechtstheile.

Kopp.

3206. *Ry.* Pulv. sabinae ʒij
 Extr. sabinae q. s.
 M. f. c. paux. mucilag. gummi tragacant. pil. lx.
 Consp. lycop.

S. Täglich 2—3mal 4—5 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Menstruationsstockungen.

Radius.

3207. *Ry.* Aloes ʒj
 Ferri pulverati ʒij
 Sulphur. stibiat. aurant. ʒß
 Hydrargyr. muriat. mit. ʒj
 Olei sabinae aether. gutt. xx.
 M. f. c. Syrup. althaeae q. s. pil. gr. iij.
 Consp. lycop. D. in vitro.

S. Vor Schlafengehen 2 Stück zu nehmen.

Anwend. In ähnlichen Fällen.

Weickard.

3208. *Ry.* Sabinae ʒij
 Ferri pulverati ʒj
 Extr. aloes aquos. ʒj
 Mucilag. gummi tragacanth. ʒij.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. cinnamom.

S. Täglich 2—3mal 3—4 Stück.

Anwend. Gegen Menstruationsstockungen, Chlorose, Leukorrhöe u. s. w.

3209. *Ry.* Pulv. herb. sabinae ʒiij
 Extr. herb. sabinae ʒij
 „ liquirit. ʒß.
 M. f. pil. cl. Consp. pulv. rad. althaeae.

S. Aller 2 Stunden 5 Stück.

Anwend. Gegen Unfruchtbarkeit der Frauen in Folge vorhan-

denen Torpors der Geschlechtstheile oder Mangel an Geschlechtslust. — Bisweilen wurden der Masse Olei sabinae gutt. xij—xv zugesetzt.

Kopp.

3210. *Ry.* Pulv. sabinae $\text{℥}\beta$
 Ferri oxydulati $\text{℥}\beta$
 Olei sabinae gutt. xxx
 Extr. sabinae
 „ liquirit. āā $\text{℥}\text{ij}$.
M. f. pil. cc. Consp. lycop. D. ad vitrum.
S. Um 10, 4 und 6 Uhr und vor Schlafengehen jedesmal 7 Stück.

Anwend. Gegen höhere Grade der vorerwähnten Zustände.

Kopp.

3211. *Ry.* Pulv. sabinae
 „ chinae fuscae āā $\text{℥}\text{iiij}$.
 Infunde cum
 Aquae ferv. q. s.
 Colat. refriger. $\text{℥}\text{vj}$ adde
 Syrup. cinnamom. $\text{℥}\text{vj}$.

M. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Blutfluss aus dem Fruchthälter von Atonie desselben.

In einem Falle fügte Kopp noch Elix. acid. Hall. $\text{℥}\beta$ bei.

Kopp.

3212. *Ry.* Sabinae $\text{℥}\beta$
 Cort. cinnamom. $\text{℥}\text{ij}$.
 Infunde
 Aquae fervid. q. s.

Colat. ℥vj S. Stündlich einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Blutfluss und Ausdehnung der Gebärmutter.

Kopp.

3213. *Ry.* Pulv. sabinæ $\text{℥}\beta$
 „ rad. valerian. off. $\text{℥}j$.

Infunde

Aquae ferv. q. s.

Colat. refriger. $\text{℥}viii$ adde

Tinct. cinnamomi $\text{℥}iij$.

M. S. Alle Stunden einen Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Unterdrückung der Menstruation bei krampfhafter Schwäche der Gebärmutter und Schläffheit ihrer Gefäße.

Kopp.

3214. *Ry.* Sabinæ $\text{℥}j$.

Infunde

Aquae ferv. q. s. ad colat. $\text{℥}viii$

Natri boracici $\text{℥}iv$

Sacchari albi $\text{℥}j$.

M. S. Täglich 3mal einen Esslöffel.

Anwend. Gegen schmerzhaftes Menstruation aus Atonie und Torpor des Fruchthalters. Zur Zeit der Menstruation zweistündlich einen Esslöffel. — Aehnliche Form, bisweilen ohne Borax, gegen Unfruchtbarkeit aus Torpor der Geschlechtstheile oder Mangel an Sinnlichkeit.

Kopp.

3215. *Ry.* Sabinæ rec. $\text{℥}\beta$
 Tinct. kalinae $\text{℥}iij$.
 Digere per iv dies.

S. Täglich 3mal 10—15 Tropfen.

Anwend. Gegen atonische Gicht.

Sundelin.

3216. *Ry.* Herb. sabinæ $\text{℥}ij$

Aquae commun. ferv. $\text{℥}v$.

Digere per $\frac{1}{4}$ hor. Colat. refriger fiat cum

Camphorae trit. gr. $ij-vj$

Gummi mimos. pulv. ʒjß

Succi liquiritae ʒß

l. a. emulsio.

S. Umgeschüttelt, stündlich einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Blasenlähmung nach schwerer Niederkunft.

Horn.

3217. *Ry.* Pulv. sabinae subtiliss. ʒß

Sacchari pulverati ʒvß

Gummi tragacanth. gr. xv.

Aquae menthae piper. ʒij.

M. f. tab. gr. xij leni igne exsicc.

S. Täglich 3mal einige Stück zu nehmen.

Tabulae sabinae Gardesii.

Anwend. Gegen Blutfluss und Ausdehnung der Gebärmutter.

3218. *Ry.* Extr. sabinae gr. vj—viij

Ferri oxydulati gr. xv—xxiv.

Mellis q. s.

F. boli viij.

S. Den Tag über zu verbrauchen.

Boli emmenagogi martiales Brerae.

Anwend. Gegen Amenorrhöe Chlorotischer.

Brera.

3219. *Ry.* Fol. sabinae ʒvj—viij.

Infunde

Aquae ferv. q. s. ad colat. ʒvj.

Adde

Hydrargyr. muriat. corros. gr. j.

S. S. Gurgelwasser.

Anwend. Gegen chronische Bräune.

Kopp.

3220. *Ry.* Herb. sabinae $\bar{\text{z}}$ j β .
 Coque cum
 Aquae font. q. s. ad colat. $\bar{\text{z}}$ xij

S. Zum äussern Gebrauch.

Anwend. Als Einspritzung bei Atonie des Fruchthälters und davon abhängiger Auftreibung, Blutfluss. — Auch bei Leukorrhoe aus ähnlichen Ursachen.

Kopp.

3221. *Ry.* Herb. sabinae
 „ rutae $\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{z}}$ β .
 Infunde
 Aquae ferv. q. s. et digere per $\frac{1}{2}$ hor.
 Colat. $\bar{\text{z}}$ vj adde
 Balsami peruviani ope vitelli ovi j subacti $\bar{\text{z}}$ β .

D. S. Zu Einspritzungen.

Anwend. Bei Pseudoerysipelas und schlechten Eiterungen überhaupt aus mangelnder Vitalität der Theile.

Vogt.

3222. *Ry.* Extr. sabinae $\bar{\text{z}}$ β .
S. Auf die geröthete Stelle zu streichen.

Anwend. Gegen Angiektasieen.

Stiebel.

3223. *Ry.* Pulv. herb. sabinae
 Adipis suilli $\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{z}}$ ijj.
 M. f. unguentum.

S. Salbe.

Anwend. Zur Zerstörung der Feigwarzen.

Horn.

3224. *Ry.* Hydrargyr. oxydat. rubri
 Aluminis usti āā 3β
 Pulv. frond. sabinae 3ij.
 M. f. pulvis.

S. Zum Aufstreuen.

Anwend. Gegen Feigwarzen.

Schubarth.

3225. *Ry.* Sabinae 3ij
 Camphorae tritae 3j
 Ammonii muriatici 3v..
 M. f. pulv. subtiliss.

S. Zum Einstreuen.

Anwend. Gegen wuchernde Flächen der Schleimhäute, Knochenhäute u. s. w., Osteosarcoma.

v. Ammon.

3226. *Ry.* Extr. chinae 3ij
 „ opii gr. xij
 Olei sabinae 3jβ
 Unguent. hyoscyami 3j.
 M. exacte.

D. S. Früh und Abends 2 Kaffeelöffel voll in den Unterleib einzureiben.

Anwend. Bei Atonie und Auflockerung des Fruchthälters und Blutfluss aus demselben.

Kopp.

3227. *Ry.* Phosphori 3β.
 Solve in
 Olei sabinae 3j
 Liqu. ammon. caustici 3j.
 M. f. liniment.

S. Täglich 2mal einzureiben.

Anwend. Gegen gichtische Gliederlähmung.

Gördens.

364 SACCHARUM ALBUM. SACCHAR. ALUMINATUM.

3228. R_y. Olei sabinae ʒß
„ terebinth. rectific. ʒj.

M. S. In die inneren Flächen der Schenkel einzureiben.

Anwend. Gegen Unterdrückung oder Verhaltung der monatlichen Reinigung.

Fuchs.

3229. R_y. Emplastr. aromat. ʒj
Olei sabinae ʒj
Pulv. herb. sabinae ʒij.

Mal. D. S. Auf den Unterleib zu legen.

Anwend. Bei Atonie des Fruchthälters und daraus entstehendem Blutfluss u. s. w.

Kopp.

Saccharum album. Weisser Zucker.

(Von *Saccharum officinarum* L., *Beta vulgaris rubra* L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Lösung, um manche Arzneien zu versüssen. Aeusserlich als Streu-, Augen-, Schnupfpulver; zu Klystieren ʒj — jß.

Man vermeide concentrirte Salpeter-, Schwefel- und Salzsäure, Chlor, kaustische Alkalien, viele Metallsalze.

Saccharum aluminatum; Alaunzucker.

3230. R_y. Sacchari alumin. ʒij.
F. pulv. Dent. tal. dos. viij.

S. Aller 4 Stunden ein Stück trocken langsam zu

verschlucken, so dass es eine Weile im Halse hängen bleibt.

Anwend. Um Halsentzündungen im Entstehen zu unterdrücken.

Reil.

Sal marinum. Seesalz.

Form u. Gabe. Zu Bädern, ℥iij — viij für Erwachsene, ℥ß — ij für Kinder.

Salep. Salep.

(*Radix Salap, Salab; Salepwurzel. Von Orchis mascula und anderen Orchisarten.*)

Form u. Gabe. In Abkochung mit Wasser, Milch, Fleischbrühe, zu ℥ij — iij auf ℥j; als Gallerte. — Aeusserlich zu Klystieren.

Man vermeide manche Metallsalze, Alaun, concentrirte Mineralsäuren, Chlor, kaustische Alkalien, Jod, Gerbestoff. Borax.

3231. Rx. Rad. salep pulv. ʒjß.

Coque cum q. s. aquae ad gelat. consist.

Syrup. ribium. ʒj.

M. S. Theelöffelweise.

Anwend. Zur Ernährung und Einhüllung bei Schwachen, Abzehrenden, Brustkranken.

3232. Rx. Rad. salep ʒß.

Coque cum

Aquae font. ʒviij.

Colat. adde

Ammon. muriat. $\mathfrak{3j}$

Tinct. rhei aquos. $\mathfrak{3j}$

Laudan. liquidi $\mathfrak{2j}$

Syrupi diacodii $\mathfrak{3j}$.

M. S. Aller 1—2 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Gegen schmerzhaftes Diarrhöe.

J. C. Stark.

3233. *Ry.* Decoct. rad, salep tenuioris $\mathfrak{3iij}$

Tinct. rhei aquos. $\mathfrak{3ij}$

Aquae cinnamom. simpl. $\mathfrak{3\beta}$

Sacchari albi $\mathfrak{3j}$.

M. S. Stündlich 2 volle Theelöffel.

Anwend. Gegen Durchfall mit belegter Zunge und ohne Fieber bei Kindern.

Wendt.

3234. *Ry.* Pulv. rad. salep $\mathfrak{3j}$

Fiat c. aquae commun. frigid. q. s. sub continua triturat. massa pultacea, cui sensim affunde

Lact. vaccini ebull. $\mathfrak{8j\beta}$.

Ebull. per aliquot momenta et frigefactae adde

Aquae cinnamomi

Syrup. cort. aurant. $\overline{aa}$ $\mathfrak{3j}$.

M. S. Aller 2 Stunden eine halbe Tasse voll.

Anwend. Bei Auszehrungskrankheiten, wenn kräftigere Nahrungsmittel wegen zu schwacher Verdauung oder zu sehr gereizten Zustandes nicht vertragen werden.

Meyer

3235. *Ry.* Pulv. rad. salep $\mathfrak{3j}$.

Affunde sensim sub cont. tritur.

Aquae commun. frigid. $\mathfrak{8j}$.

Tunc coque sub cont. agit. ad reman. $\mathfrak{3vij}$,
quibus adde

Elaeosacch. cinnamom. $\bar{3}\beta$.
 Repone demum in loco frigido, ut in gelatinam
 abeat. D. in pyxide alba.

S. *Esslöffelweise.*

Anwend. In ähnlichen Fällen.

Phoebus.

3236. R_y. Pulv. rad. salep $\bar{3}\beta$

Solve in

Aquae calid. $\bar{3}ij$.

Adde

Aquae naphae $\bar{3}ij$

Extr. hyoscyami gr. v

Syrupi althaeae $\bar{3}j$.

M. S. *Oefsters einen Theelöffel voll.*

Anwend. Bei allen Arten der Pneumonie, wenn den Kranken
 ein trockner Reizhusten belästigt.

Hufeland.

3237. R_y. Flaved. cort. aurant.

Rad. liquirit. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ij$

„ salep $\bar{3}\beta$

Semin. foeniculi $\bar{3}j$.

M. f. pulvis.

D. S. *Theelöffelweise.*

Anwend. Ammenpulver, bei zu sparsamer Milchabsonderung.

Bei Säure, Durchfall des Säuglings setzt man noch etwas

Conch. praep. zu.

Neumann.

3238. R_y. Jusculi carnis bovinæ fortioris sine sale $\bar{3}iv$

Rad. salep $\bar{3}j$

Vitell. ovi j.

S. S. *Ernährendes Klystier.*

Salicis cortex. Weidenrinde

(*Salicis laureae cortex.* Von *Salix pentandra*,
alba, *fragilis* u. a. L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Lattwerge, zu $\mathfrak{zj}$ — $\mathfrak{iv}$, 3—4mal. In Abkochung, zu $\mathfrak{zj}$ auf $\mathfrak{zviij}$ — $\mathfrak{xij}$, esslöffelweise, 4—6mal. Extrakt, in Lösung, Pillen, zu gr. v—x, 3—4mal; bei Vergiftung mehr und öfter. — Aeusserlich zu Zahn-, Streupulver, Mund- und Gurgelwässern, Einspritzungen, Umschlägen, Verbandwässern, Bädern.

Man vermeide Verbindungen mit Vitriolen, Bleizucker, Eisen, Spiessglanzsalzen, Säuren, Alaun, leim- oder gallert-haltigen Stoffen.

3239. Rx. Cort. salicis
 „ hippocastani
 Rad. gentianae
 „ calami aromat.
 „ caryophyllat. $\mathfrak{aa}$ $\mathfrak{zij}$.
 M. f. pulv. alcohol. D. in vitro.

S. Theelöffelweise, 4—6mal vor dem Anfalle.

Pulvis chinae factitiae Hufelandi.

Anwend. Als Ersatz der China bei vielen Wechselfiebern und in vielen andern Schwächekrankheiten.

Hufeland.

3240. Rx. Pulv. gross. cort. salicis
 „ „ „ hippocast. $\mathfrak{aa}$ $\mathfrak{z\beta}$
 „ „ rad. calami aromat.
 „ „ caryophyllat. $\mathfrak{aa}$ $\mathfrak{zij}$.

Coque cum

Aquae font. ℥xvj ad rem. ℥viij.

Col. S. Aller 2 Stunden 2 Esslöffel.

Decoctum chinae factitiae Hufelandi.

Anwend. Gegen Wechselfieber.

Hufeland.

3241. *Ry.* Cort. salicis ℥β.

Macera in

Aquae fervid. ℥j per hor. xij; tunc coque
ad reman. ℥viij.

Sub finem coct. adde

Rad. caryophyllat. ℥iij.

Colat. expr. ℥vj adde

Tinct. rhei vinos. ℥iij

Syrup. cort. aurant. ℥v.

M. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel.

Richter.

3242. *Ry.* Cort. salicis albae ℥ij.

Macera per hor. xij in aquae s. q.

Postea coque ad colat. ℥xvj, cui calidae admisce

Pulv. tragacanthae ℥iv

Syrup. althaeae ℥j

„ cort. aurant. ℥β.

*M. D. S. Stündlich eine halbe Tasse voll warm
zu nehmen.*

van Geuns.

3243. *Ry.* Cort. salicis ℥iv

Spirit. frumenti ℥viij

Aquae comm. ℥xvj.

Digere in vase tecto et cola; corticem remanentem coque cum

Aquae commun. ℥xxx ad reman. liquidi ℥xv .
Colaturas commisce.

D. S. Zwischen 2 Fieberanfällen tassenweise zu verbrauchen.

Anwend. Gegen Wechselfieber.

Bremer.

3244. *Ry.* Cort. salicis subtiliss. pulv. ℥ij
Flaved. cort. aurant. pulv. ℥β
Syrup. cort. aurant. q. s.
F. electuar. molle.

S. Theelöffelweise in der Apyrexie zu nehmen.

Anwend. Beim Wechselfieber.

Richter.

3245. *Ry.* Extr. salicis ℥vj
Aquae font. ℥vj .

S. Aller 2—3 Minuten einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Vergiftung mit Brechweinstein, Zinkvitriol, Alkaloiden.

Phoebus.

3246. *Ry.* Extr. cort. salicis ℥jβ
Aluminis ℥β—j
Aquae cinnamom. simpl. ℥v
Syrup. rub. idaei ℥j .

M. S. Alle halbe Stunden 2 Esslöffel, oder nach Umständen noch öfter.

Anwend. Gegen Mutterblutfluss.

Osiander d. V.

3247. R_y. Extr. salicis ʒij
 „ gentianae ʒij.
 Solve in
 Aquae cinnamom. vinos. ʒij.
 Adde
 Aether. sulphur. ʒj.

M. D. S. Aller 3 Stunden einen Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Beim Wechselfieber.

Schubarth.

3248. R_y. Cort. salicis conc. ʒij.
 Coque cum
 Aquae font. ℥ij ad ℥j.
 In colat. solve
 Ammon. muriatici ʒj

D. S. Mittelst Kompressen umzuschlagen.

Anwend. Bei wenig schmerzhafter, aber heftiger lymphatischer Geschwulst der Vorhaut.

v. Swieten.

3249. R_y. Cort. salicis ʒj.
 Coque cum
 Aquae font. q. s. ad rem. ʒviiij.
 Sub finem coct. adde
 Flor. chamomill. ʒj.
 Liqu. refrig. adde
 Liqu. myrrhae ʒβ.

M. D. S. Aeusserlich.

Anwend. Als Verbandwasser gegen phagedänische, skrof- löse, herpetische, karcinomatöse und brandige Geschwüre, und auch zu Einspritzungen bei Metrorrhagie und Leukorrhöe.

Schubarth.

3250. *Ry.* Camphorae tritae
 Kali nitrici depur. āā 3j
 Myrrhae 3ij
 Cort. salicis. 3j.
 M. f. pulv. subtiliss D. in vitro.

S. Zum Einstreuen.

Anwend. In brandige Wunden und Geschwüre.

G. A. Richter.

3251. *Ry.* Pulv. cort. salicis alb.
 „ herb. rutae āā 3ij
 Spirit. camphorat. 3j
 Aceti q. s.
 ut f. cataplasma.

S. Zum äusserlichen Gebrauch.

Anwend. In ähnlichen Fällen.

v. Hildenbrand.

3252. *Ry.* Cortic. salicis
 Carbon. ppt. āā 3β
 Extr. myrrhae 3ij
 Bals. peruvian. 3β
 Olei cassiae cinnamom. gutt. iij.
 M. f. pulv. subtiliss. D. in vitro.

S. Zahnpulver.

Phoebus.

3253. *Ry.* Succ. folior. salicis 3ij
 Axung. porci q. s.
 M. blando calore.

S. Zum Verbande.

Anwend. Gegen unreine, brandige und skorbutische Geschwüre,

Hufeland.

3254. *Ry.* Globul. tartari martiati $\mathfrak{z}\text{j}\beta$
 Cortic. salicis pentandr. $\mathfrak{z}\text{iv}$.
 Coque ex
 Aquae $\mathfrak{z}\text{vj}$ ad reman. $\mathfrak{z}\text{iv}$.
 Colat. refriger. adde
 Spirit. lavandulae $\mathfrak{z}\text{iiij}$.

S. Zu 3 Bädern.

Salicinum; Salicin.

(*Salicina, Salicinium; Weidenstoff.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Auflösung, zu gr. iv—xij und mehr, einigemal täglich.

3255. *Ry.* Salicini gr. xij
 Sacchari albi $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 M. f. pulv. Div. in iv part. aequal.

S. Täglich 3mal ein Pulver.

Anwend. Gegen Wechselfieber.

Kromholz.

3256. *Ry.* Salicini gr. viij
 Gummi arab. $\mathfrak{z}\text{j}\beta$
 Sacchari albi $\mathfrak{z}\text{j}$.
 M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. Alle Stunden ein Pulver zu nehmen.

Anwend. Bei chronischer Diarrhöe.

Blom.

3257. *Ry.* Salicini gr. xv
 Tartari stibiati gr. j

Sacchari albi ℥ijß.

M. f. pulv. Div. in x part. aequal.

S. *Aller 2 Stunden 1 Pulver zu nehmen.*

Anwend. In Wechselfiebern.

Stegmayr.

3258. Rx. Salicini sulphurici ℥ij

Extr. liquiritiae ℥iv.

M. f. pil. lx. Consp. pulv. cinnamom.

S. *Täglich 1—5mal 2—6 Stück.*

Anwend. Gegen Wechselfieber, Schwächezustände.

3259. Rx. Salicini gr. xij

Extr. helenii ℥ij

Aquae chamomill. ℥vj

Syrup. althaeae ℥j.

M. S. *Alle Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.*

Anwend. Gegen chronischen Katarrh.

Blom.

3260. Rx. Radic. polygalae amar. ℥vj.

Coque cum

Aquae font. ℥xij ad reman. ℥viij.

Colat. adde

Salicini gr. viij—x.

M. S. *Aller 2 Stunden 1—2 Esslöffel voll zu nehmen.*

Anwend. Bei chronischem Katarrh.

von dem Busch.

Salviae folia. Salbeiblätter.*(Salviae herba. Von Salvia officinalis L.)*

Form u. Gabe. Im Aufguss mit Wasser oder Wein, zu $\text{ʒj} - \text{vj}$ auf ʒj , täglich. Zu Mund- und Gurgelwässern, Pinselsäften, Einspritzungen, Augewässern, Bähungen, Umschlägen, Bädern. — Extrakt in Pillen, Lösung, zu gr. $x - xv$. — Aether. Oel, 1—2 Tropfen, 3—4mal.

3261. *Ry.* Herb. salviae ʒj
 Aquae ferv. ʒj .
 Digere per $\frac{1}{2}$ hor. Colat. refriger. adde
 Vini gall. rubri ʒss .

M.D. S. Aller 2 Stunden $\frac{1}{2}$ Tasse.

Anwend. Gegen Nachtschweisse.

Niemann.

3262. *Ry.* Herb. salviae ʒss
 Aquae fervid. q. s.
 Digere per $\frac{1}{2}$ hor. Colat. ʒvj admisce
 Acidi sulphur. diluti ʒj .

M. S. Aller 2 Stunden eine halbe Tasse.

Anwend. In gleichen Fällen.

Arnemann.

3263. *Ry.* Fol. salviae
 „ farfarae
 Rad. althaeae
 „ liquirit. āā ʒss
 Flor. sambuci ʒj

Semin. anisi ʒij.
 Conc. M. f. species.

S. Brustthee.

Species pectorales russicae.

Anwend. Gegen Katarrhe.

264. *Ry.* Olei salviae aether. gutt. viij
 Sacchari albi ʒjß.
 M. f. pulvis.

S. Aller 2 Stunden 1 Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Nachtschweisse.

Nach v. Swieten, Schneider.

3265. *Ry.* Olei salviae aether. gutt. viij
 „ hyssopi
 „ mill efolii āā gutt. iv
 Pulv. rad. marant. arund.
 Sacchari albi āā ʒj.
 M. f. pulvis.

S. Aller 2 Stunden 1 Theelöffel.

Anwend. Gegen chronischen Schieimhusten.

Schneider.

3266. *Ry.* Infus. herb. salviae (ʒij) ʒij
 Syrup. communis ʒj.

*M. S. Zum Pinseln, auch wohl zum Umschlagen
 mit Leinwandläppchen.*

Anwend. Gegen Aphthen, wunde Brustwarzen.

Kluge.

3267. R_y. Infus. fol. salviae (℥ij) ℥j
 Acidi sulphur. diluti ℥ij
 Mellis rosarum ℥j.

M. S. Mundwasser.

Anwend. Gegen faulige Zahnfleischentzündung.

v. Hildenbrand.

3268. R_y. Herb. salviae
 „ rutae āā ℥ij.
 Infunde cum
 Aquae fervid. ℥xij. Colat. refriger. adde
 Spirit. cochleariae ℥ij
 Tinct. laccae ℥j.

M. S. Mundwasser.

J. A. Schmidt.

3269. R_y. Herb. salviae ℥β.
 Infunde
 Aquae fervid. q. s. ad colat. ℥vj.
 Adde
 Aquae oxymuriat. ℥β
 Mellis rosati ℥j.

M. S. Zum Ausspülen und Ausspritzen des Mundes und Halses.

Anwend. Gegen asthenische Aphthen und Halsentzündung.

Berends.

3270. R_y. Fol. salviae ℥β
 „ malvae ℥jβ.
 M. f. species.

S. Gurgelwasser.

Anwend. Gegen katarrhalische und nicht stark entzündliche Bräunen.

Choulant.

3271. *Ry.* Fol. salviae ℥ij .
 Infunde cum
 Aquae ferv. q. s.
 Digere per $\frac{1}{4}$ hor. Colat. ℥iij adde
 Vini gallici rubri ℥j .

M. S. Zu Bähungen.

Anwend. Gegen Quetschungen, besonders der Augenlider;
 auch als Gurgelwasser bei chronischen Halsentzündungen.

Kuhl.

3272. *Ry.* Extr. ratanhia ℥β .
 Solve in
 Infus. herb. salviae (℥j) ℥viiij .
 Adde
 Tinct. pimpinellae ℥β
 Syrup. moror. ℥j .

M. D. S. Umgeschüttelt, Gurgelwasser.

Anwend. Bei asthenischer und chronischer Bräune.

- 3273 *Ry.* Infus. herb. salviae ℥iij
 Spirit. vini ℥j .

M. D. S. Die Umgebungen des Auges damit zu waschen.

Anwend. Zur Stärkung der Augen.

Reil.

3274. *Ry.* Fol. salviae ℥j
 Bacc. lauri
 „ juniperi āā ℥β .
 Coque vase clauso in
 Vini rubri q. s.

Colat. ℥j *S.* Lauwarm mittelst Kompressen überzuschlagen.

Anwend. Gegen Kontusionen, Sugillationen u. s. w.

Hartmann.

Sambuci flores. Fliederblumen.*(Hollunderblumen. Von Sambucus nigra L.)*

Form u. Gabe. Im Aufguss, zu $\mathfrak{z}\text{iv}$ — vj auf $\mathfrak{z}\text{iv}$ — vj , esslöffelweise, oder $\mathfrak{z}\text{ij}$ — iiij auf 2—3 Tassen Wasser, auf einmal. Als Mund- und Gurgelwasser, Bähung, Umschlag, Bad. Als Streupulver, Kräuterkisschen.

3275. *Ry.* Flor. sambuci $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Semin. anisi $\mathfrak{z}\text{j}$.
C. M. f. species.

S. Ein Quentchen mit 1 Pfund Wasser aufzugießen.

Species diaphoreticae Schol. clin. Lips.

Anwend. Bei katarrhalischen und rheumatischen Leiden.

Clarus.

3276. *Ry.* Flor. arnicae $\mathfrak{z}\text{ij}$
 „ verbasci $\mathfrak{z}\text{ß}$
 „ sambuci $\mathfrak{z}\text{j}$.
C. M. f. species.

S. Zum Thee.

Species diaphoreticae.

Anwend. Bei katarrhalischen Beschwerden.

Cerutti.

3277. *Ry.* Infus. flor. sambuci
 Liqu. ammon. acetici diluti āā $\mathfrak{z}\text{iiij}$
 Oxymell. simpl. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. D. S. Alle Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei katarrhalisch-rheumatischen Fiebern.

P. Frank.

3278. *Ry.* Flor. sambuci $\bar{3}j$.
 Infunde cum
 Aquae bullient. q. s. ad colat. $\bar{3}vj$.
 Adde
 Oxymell. simplicis
 „ scillitici $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$
 Tart. stibiati gr. ij.

M. D. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Zur Beförderung des Auswurfes bei leichten Pneumonien, schleimigem Asthma u. s. w.

Reil.

3279. *Ry.* Infus. flor. sambuci ($\bar{3}\beta$) $\bar{3}v$
 Liqu. ammon. acetici $\bar{3}j$
 Vini stibiati $\bar{3}ij$
 Succi sambuci inspissati $\bar{3}vj$.

M. S. Umgeschüttelt, 2stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. In katarrhalisch-rheumatischen Affektionen zur Beförderung der Diaphorese.

Richter.

3280. *Ry.* Infus. flor. sambuci ($\bar{3}j$) $\bar{3}vj$
 Tinct. pimpinellae $\bar{3}ij$
 Oxymell. simpl. $\bar{3}j$.

M. S. Gurgelwasser.

Anwend. Gegen katarrhalische Affektionen der Schlingorgane, Tonsillaranschwellungen, Verlängerung der Uvula.

2281. *Ry.* Flor. sambuci $\bar{3}j\beta$
 Caricarum $\bar{3}j$.
 Infunde cum

Lactis fervidi q. s. ad colat. $\bar{8}j$.

S. Gurgelwasser, lauwarm zu gebrauchen.

Anwend. Gegen katarrhalische Bräunen.

Berends.

3282. *Ry.* Flor. sambuci $\mathfrak{z}$ ij.
 Infunde cum
 Aquae bullient. q. s. ad colat. $\mathfrak{z}$ j.
 Adde
 Liqn. ammonii vinosi $\mathfrak{z}\beta$
 Mellis despumati $\mathfrak{z}$ j.

M. S. Gurgelwasser.

Anwend. Bei chronischen Halsentzündungen.

Reil.

3283. *Ry.* Flor. sambuci
 „ chamomill.
 „ lavandulae
 Herb. menth. pip. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}$ j
 Camphorae tritae $\mathfrak{z}\beta$.
M. f. pulvis.

S. Zum Kräuterkissen.

Sapo. Seife.

(*Sapo domesticus, albus, hispanus, venetus, alicantinus; gemeine Seife, weisse, spanische, venedische Seife.*)

Form u. Gabe. Nur äusserlich zu Klystieren, $\mathfrak{z}$ ij—iv, Stuhlzäpfchen, Umschlägen, Linimenten, Salben, Waschungen, Bädern, $\mathfrak{z}$ j—ij für einen Erwachsenen.

3284. *Ry.* Decocti hordei $\mathfrak{z}$ vj
 Sapon. veneti rasi et soluti $\mathfrak{z}$ j
 Mellis optimi $\mathfrak{z}$ vj.

M. S. Zum Klystier.

Anwend. Bei Unterleibsinfarkten, und im Falle, dass man Stuhlgang verschaffen will.

Brera.

3285. *Ry.* Saponis albi ℥j
 Elaterii gr. ij .
M. f. suppositorium.

S. Stuhlzäpfchen.

Anwend. Bei hartnäckiger Verstopfung oder krampfhafter Striktur des Mastdarms.

3286. *Ry.* Farin. hordei ℥viii .
 Coque in suff. q. aquae commun. ad consist.
 pultis, in quo incorp.
 Sapon. albi rasi ℥iv .

M. S. Umschlag.

Anwend. Zur Erweichung von Geschwülsten.

Hôp. des Enf. Paris.

3287. *Ry.* Sapon. domest. ℥ß
 Flor. chamomill. ℥ij .
F. species.

*S. Mit einer Hand voll gestossener Knoblauchze-
 hen zu mischen und mit Milch gelind zu ei-
 nem Brei zu kochen, sodann lauwarm überzu-
 legen.*

Anwend. Bei langsam reifenden Eitergeschwülsten.

Vogt.

3288. *Ry.* Sapon. veneti rasi ℥iv
 Pulv. herb. cicutae
 „ „ hyoscyami āā ℥ij
 „ specier. emoll. pro cataplasmate ℥j .

M. S. Zum Breiumschlage.

Anwend. Bei grossen und schmerzhaften Entzündungs-
 geschwülsten zur Beförderung der Eiterung.

Walther.

3289. *Ry.* Sapon. hispan. $\bar{3}\text{j}\beta$.

Digere in

Spirit. anthos $\bar{3}\text{j}$.

Adde

Camphorae ope spirit. vini pulv. $\bar{3}\beta$.

M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Zur Zertheilung von Geschwülsten.

Bernstein.

3290. *Ry.* Sapon. veneti rasi

Mellis $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\text{j}$

Carbon. lixiv. alcal. $\bar{3}\text{j}$

Aquae fumariae $\bar{3}\beta$.

M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Zur Zertheilung unempfindlicher Geschwülste.

v. Hildenbrand.

3291. *Ry.* Sapon. veneti $\bar{3}\text{j}\beta$

Alcohol. vini $\bar{3}\text{v}$

Aquae font. $\bar{3}\text{ij}$

Camphorae $\bar{3}\text{ij}$.

Solut. filtr. adde

Olei thymi l. anthos

„ lavandulae $\bar{a}\bar{a}$ gr. xv

Liqu. ammon. caust. $\bar{3}\text{j}$.

M. S. Zum Einreiben.

Opodeldoc liquidum seu Spiritus saponatus
compositus.

Anwend. In Fällen, wo man sich des gewöhnlichen Opodel-
doks bedient, aber noch aromatisch-geistige Flüssigkeiten
zusetzen will.

Vogt in Wildbad.

3292. Ry. Sapon. veneti rasi $\overline{3j}$
 Spirit. lumbricor.
 „ vini camphor. $\overline{aa}$ q. s.
 ut f. l. a. unguentum.

S. Täglich 2mal erwärmt einzureiben.

Anwend. Gegen Lumbago und andere rheumatische Leiden ohne Fieber.

Hartmann.

3293. Ry. Emplastri saponati $\overline{3ij}$
 Extr. hyoscyami
 „ cicutae
 „ opii aquosi $\overline{aa}$ $\overline{3\beta}$.
 M. f. l. a. emplastrum.

S. Auf Leder zu streichen.

Anwend. Gegen Drüsenverhärtungen.

3294. Ry. Sapon. veneti rasi $\overline{3j}$
 Emplastr. plumbi $\overline{3ij}$.
 Liquefact. et refrigerat. adde
 Ammonii muriatici $\overline{3\beta}$.
 F. emplastrum.

S. Auf die Brust zu legen.

Anwend. Bei Lungenaffektionen, Rheumatismen der Brustmuskeln, besonders alter Leute.

Es muss aller 24 Stunden frisch bereitet werden.

Spiritus saponatus; Seifenspiritus.

Form. *Einreibung, Waschung.*

3295. *Ry.* Tinct. benzoës ʒij
 Spirit. saponati ʒj
 Aquae flor. aurant.
 „ rosarum aa ʒiv.

M. S. Umgeschüttelt, zum Waschen.*Anwend.* Als belebendes, wohlriechendes Waschwasser.

B. Sapo medicatus; medicinische Seife.

(Sapo natronatus, chemicus.)

Form u. Gabe. *In Pulver, Pillen, Lattwerge, Emulsion, Lösung (selten), zu gr. v—xx, einigemal täglich; bei Vergiftungen drachmenweise in kurzen Zwischenräumen.*

Man vermeide Verbindungen mit Säuren und sauren Salzen und Säften, Salzbildern, Alaun, salzsaurem Kalk, Baryt, schwefelsaurer Magnesia, Metallsalzen, Flüssigkeiten, welche Gerbestoff enthalten.

3296. *Ry.* Sapon. medicat. pulv. ʒj
 Olei amygdal. dulc. ʒj.
 Leni calore mixtis adde
 Syrup. althaeae ʒjß.

M. S. Täglich 3mal, umgeschüttelt, 1—2 Theelöffel.*Anwend.* Für Kinder bei Säure und Krämpfen.*G. A. Richter.*

3297. *Ry.* Sapon. medic. ʒj
 Magnes. carbon. ʒjß
 Rad. rhei ʒß
 Elaeosacch. foeniculi ʒiij.
 M. f. pulv. D. in vitro.

S. Täglich 3mal einen Theelöffel voll.

Anwend. Als Digestivmittel.

Berends.

3298. *Ry.* Sapon. medic. gr. x
 Magnes. carbon.
 Pulv. semin. anisi āā ʒj.
 M. f. pulvis.

D. S. Viermal täglich einer Bohne gross zu geben.

Anwend. Gegen Koliken und Unterleibsbeschwerden säugender Kinder, welche von schlechter Milch, ungesundem Brei u. s. w. ihren Ursprung nehmen.

Fr. Jahn.

3299. *Ry.* Sapon. medicat. pulv. ʒvj
 Extr. taraxaci ʒß
 Gummi ammon. depur. ʒß
 Syrup. simpl. q. s.
 F. pil. gr. ij. Consp. lycop. D. ad vitrum.

S. Täglich 3mal 10 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei Leberverstopfung.

Vogel.

3300. *Ry.* Sapon. medic. ʒj
 Gummi ammon. depur.
 Extr. chelidonii āā ʒjß

Spirit. vini panx.

F. pil gr. ij. Consp. pulv. cass. cinnamom.

S. *Täglich 3mal 12 Stück zu nehmen.*

Anwend. Bei Anschoppungen im Unterleibe.

Schubarth.

3301. Ry. Sapon. medicati pulv. 3ij

Extr. ligni quassiae

Fellis tauri inspiss. aa 3j

Extr. cort. aurant.

„ aloes aquos. aa 3j.

M. f. pil. gr. ij. Consp. pulv. cass. cinnamom.

D. ad vitrum.

S. *Bei eintretenden Beschwerden 8 Stück zu nehmen.*

Anwend. Bei Magensäure der Hypochondristen.

Richter.

3302. Ry. Sapon. medic.

Natri carbon. sicci

Extr. trifol. fibrini aa q. s.

F. pil. gr. ij. Consp. liquirit.

S. *Täglich 3mal 3—10 Stück.*

Anwend. Als auflösendes, aufsaugendes und steinzerstörendes Mittel.

Berends.

3303. Ry. Sapon. medic. 3ij

Gummi ammoniaci

Tartari natronat.

Aloes aa 3j

Olei juniperi gutt. x.

M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. *Täglich 3mal 4 Stück zu nehmen.*

Anwend. ~~U~~ Gegen Gelbsucht.

Thompson.

3304. Ry. Sapon. medic. ʒij
Natri carbon. depurat. ʒj.

Solve in

Aquae destill. ʒj. Filtra.

S. *Zum Einspritzen.*

Anwend. Um aus Harnsäure bestehende Blasensteine aufzulösen.

Hôp. de Montpell.

3305. Ry. Sapon. medic. pulv. ʒß.

Solve in

Spirit. frumenti ʒxvj.

S. *Zum Ueberschlagen.*

Anwend. Bei Quetschungen, Verstauchungen, Verrenkungen u. s. w.

Hôtel-Dieu à Paris.

C. Sapo viridis; grüne Seife.

(*Sapo niger, mollis; schwarze, Schmier-,
Thran-Seife.*)

Anwend. Nur äusserlich zum Waschen und zu Einreibungen bei chronischen Ausschlägen, besonders der Krätze.

Man lässt nämlich 6 Tage lang täglich ʒij einreiben, am 7. Tage und die folgenden baden, und am 10. Tage wird die Kur gewöhnlich geschlossen.

3306. *Ry.* Adipis suillae part. ij
 Lixivii caustici grav. spec. 1,333. part. j.
 Agitentur diligenter per iv horas. ope caloris.

S. Sapo unguinosus.

Anwend. Gegen Krätze, eben so wie die grüne Seife anzuwenden.

Die Lauge darf nicht schwerer, eher etwas leichter sein, sonst wird sie zu ätzend. Man kann auch Rinds- oder Schöpsentalg nehmen.

Handschuch.

3307. *Ry.* Sapon. nigri ℥xvj
 Sulphur. depur. ℥vj
 Ammon. muriatici crudi ℥j
 Aquae fontan. q. s.
F. unguentum.

S. Täglich einmal die ganze Oberfläche des Körpers einzureiben.

Anwend. Gegen Krätze.

Neumann.

Saponariae radix. Seifenkrautwurzel.

(*Waschkrautwurzel. Von Saponaria officinalis L.*)

Form u. Gabe. In Abkochung, zu $\mathfrak{z}\beta - j$ auf $\mathfrak{z}vj - viij$, täglich. Klystier. — Extrakt, zu $\mathfrak{z}\beta - ij$, 2—3mal, in Lösung, Pillen, Bissen.

3308. *Ry.* Radic. saponar. $\mathfrak{z}ij$.
 Coque cum

Aquae font. ℥iv. Colat. ℥ij adde
Syrupi althaeae ʒj.

M. D. S. Aller 2 Stunden eine Tasse voll zu nehmen.

Anwend. Zur Beförderung des Auswurfes.

3309. *Rx.* Rad. saponariae
„ taraxaci
Herb. fumariae āā ʒj.

Coque cum

Aquae font. ℥jß ad colat. ℥j.

Sub finem coct. adde

Radic. valerianae

Flor. chamomillae āā ʒvj.

M. D. S. Umgeschüttelt, zu 2 Klystieren.

Anwend. Bei hartnäckigen Abdominalstasen, Infarkten und Verschleimung mit spastischer Affektion der Därme.

Kämpf.

3310. *Rx.* Rad. saponariae
„ taraxaci
„ valerianae
Herb. tussilaginis āā ʒij.

Conc. M. S. Zum Klystier.

Statt der Kämpf'schen Species zu Visceralklystieren.

Anwend. Als Auflösungsmittel bei Unterleibsstockungen, fehlerhafter Schleimerzeugung und bei Krampf der Gedärme.

Man lässt 2—3 Esslöffel voll mit ℥j Wasser auf $\frac{2}{3}$ einkochen, durchgiessen und nach Befinden einen Esslöffel Oel zusetzen.

3311. *Rx.* Rad. saponariae
„ taraxaci

Herb. millefolii
 „ cardui benedicti
 Flor. chamomill. $\overline{aa}$ $\overline{3j\beta}$.

Conc. M. S. Wie das vorige.

Anwend. In ähnlichen Fällen, wie das vorige; es ist mehr stärkend, aber weniger krampfstillend.

3312. *Ry.* Extr. saponariae
 „ millefolii $\overline{aa}$ $\overline{3ij}$.

Solve in

Aquae menthae piper. $\overline{3ij}$.
 Elaeosacch. menth. piper. $\overline{3\beta}$.

M. S. Täglich 4 mal einen Esslöffel voll zu nehmen.

Sarsaparillae radix. Sarsaparillen- wurzel.

(Sassaparillae radix. Von Smilax Sarsaparilla L.)

Form u. Gabe. Im Aufguss, Abkochung, zu $\overline{3ij}$ — $\overline{viij}$ auf $\overline{8j}$ — $\overline{j\beta}$ Wasser, täglich; selten in Pulver, Lattwerge, Bissen, zu $\overline{3ij}$ — $\overline{iv}$.

Man vermeide Mineralsäuren, Salzbilder, Chlorcalcium, chlorichtsaurer Salze, Alaun, Metallsalze, Gerbestoff.

3313. *Ry.* Rad. sarsaparill. $\overline{3ij}$
 Cort. mezerei $\overline{3ij}$.

Coque ex

Aquae font. $\overline{8ij}$ ad colat. $\overline{8ij}$.

Sub finem coct. adde

Rad. liquirit. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. S. Täglich drei- bis viermal den 4. Theil zu nehmen.

Anwend. Gegen veraltete Syphilis, Knochenleiden, chronische Exantheme und Hautkrankheiten.

Swediaur.

3314. *Ry.* Rad. chinae nodosae

„ sarsaparillae

Caulium dulcamar. $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ $\mathfrak{z}\text{ijj}$

Rad. polypodii $\mathfrak{z}\text{j}$

Anisi stellati $\mathfrak{z}\beta$.

C. C. M. f. species. Dent. tal. dos. vj .

S. Täglich eine Portion mit $\mathfrak{g}\text{j}$ Wasser abzukochen und allmählig zu verbrauchen.

Anwend. Bei chronischen Dyskrasieen.

Vogt.

3315. *Ry.* Rad. sarsaparill. $\mathfrak{z}\text{iv}$

Antimon. in petia ligat. $\mathfrak{z}\text{vj}$.

Coque in

Aquae $\mathfrak{g}\text{xj}$ ad dimidii consumt.

Adde

Rad. liquirit. $\mathfrak{z}\text{j}$

Semin. anisi $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Infunde per octavam hor. part. Cola.

S. Täglich die Hälfte zu verbrauchen.

Anwend. Gegen chronische Gicht.

Quarin.

3316. a. *Ry* Radic. sarsaparill. conc. $\mathfrak{z}\text{xij}$.

Digere in lebetes stanneo per xxiv hor. cum

Aquae font. $\mathfrak{g}\text{xlviij}$.

Tunc adjice sacculum includentem

Aluminis saccharati $\mathfrak{z}\text{j}\beta$

Hydrargyri muriat. mitis $\mathfrak{z}\beta$

Cinnabaris $\mathfrak{z}j$.

Coque ad reman. $\mathfrak{L}xvj$. Sub finem coct. adde

Fol. sennae conc. $\mathfrak{z}iij$

Semin. anisi

„ foeniculi } cont. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}\beta$.

Ab igne remotis adjice

Rad. liquirit. conc. $\mathfrak{z}j\beta$.

Refrig. Cola. S. Starkes Dekokt.

3316. b. Ry. Residui decocti fortioris

Radic. sarsaparill. conc. $\mathfrak{z}vj$.

Dig. cum aquae font. $\mathfrak{L}xlvij$ per hor. xxiv.

Tunc coque ad reman. $\mathfrak{L}xvj$. Sub finem coct. adde

Cort. citri conc.

„ „ cinnamomi cont.

Cardamom. min. cont. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}iij$.

Ab igne remotis adde

Rad. liquirit. $\mathfrak{z}vj$

Refrig. Cola. S. Schwaches Dekokt.

Decoctum Zittmanni nach der Originalvorschrift.

Anwend. Gegen veraltete Syphilis und gegen andere, besonders skrofulöse Dyskrasieen

Tags vor der Anwendung nimmt der Kranke folgende Abführpillen:

3316. c. Ry. Mass. pil. de succino Crat. $\mathfrak{z}iv$

Hydrargyr. muriat. mit. gr. xxiv

Resin. jalap. $\mathfrak{z}j\beta$.

M. f. pil. lxxx. Consp. cinnab.

S. Neun bis zwölf Stück auf einmal.

Am folgenden Tage trinkt der Kranke im Bette $\mathfrak{L}j$ warm gemachtes starkes Dekokt, und wartet darauf den Schweiss ab. Nachmittags trinkt er $\mathfrak{L}ij$ schwaches Dekokt,

und vor dem Schlafengehen wiederum ℥j starkes Dekokt, welches aber beides nicht erwärmt wird. Diess geschieht 4 Tage. Am 5. Tage (6. Tage der Kur) nimmt er nochmals die obigen Pillen. Vom folgenden Tage an noch 4 Tage den Trank, und am 11. wieder die Pillen. Dann ruhet der Kranke 6 — 8 Tage aus, und wendet, wenn er noch nicht geheilt ist, diese ganze Kur höchstens zum 2. Male an. — Die Diät darf nur aus schleimigen Suppen und etwas magerem gebratenen Fleisch und Weissbrod bestehen.

3317. R. Rad. sarsaparill. ℥iij
 Ichthyocoll. ℥jß
 Gummi mimos. ℥ij
 Stibii sulphur. nigri in sacc. ligat. ℥iv.

Coque ex

Aquae font. ℥vj ad ℥iij.

Colat. S. Die Hälfte täglich auf 3 mal zu nehmen.

Decoctum Felsii.

Anwend. Gegen veraltete herpetische und syphilitische Leiden.

Dabei mässige Bewegung, bei gutem Wetter im Freien, mässige Kost u. s. w. Die Kur muss 24 — 40 Tage fortgesetzt werden.

3318. R. Rad. sarsaparill. conc. ℥iv.
 Coque cum
 Aquae comm. ℥xij ad rem. ℥viij.
 Sub finem coct. adde
 Rad. liquirit. ℥ß.
 Decoct. refriger. cola. D. in lagen. xvj.

S. Eine solche Flasche voll täglich Vormittags nüchtern, alle Viertestunden ein Glas voll, lauwarm zu verbrauchen.

Anwend. Zur Heilung veralteter Syphilis ohne Merkur.

Sainte - Marie.

3319. *Ry.* Radic. sarsaparill. ℥ix
 „ chinae
 Ligni guajaci
 „ sassafras āā ℥vj
 Cort. chinae regii ℥iij.
 Bene concisa macera cum
 Aquae commun. ℥cxl per hor. xlvij.
 Tunc cum eadem aqua coque ad reman. tertiae
 partis. Decoct. adhuc fervidum cola c. forti ex-
 press. Species residuas denuo et tertio c. eadem
 aquae quantitate ad eandem colat. coque. Cola-
 turis tribus mixtis in lebete adde
 Syrupi simpl. ℥ijß.
 Miscella evaporet ad consist. syrupi; coletur et
 denuo paulisper ebulliat; tum fundatur in vas
 murrhinum, cui jam insunt
 Flor. boraginis ℥jß
 Semin. anisi vulg. ℥viiij
 in sacculum ligata. Vas obtectum reponatur, do-
 nec miscella omnino frigefacta sit. Tum saccu-
 lum exprime, liquorem spathula lignea agita et in
 lagenulis bene impletis et obturatis D.

S. Roob antisymphilitique de L'affecteur.

Anwend. Bei inveterirter, depravirter, hartnäckiger Lustseuche;
 aber auch bei Skrofelkrankheit, besonders wenn beide
 Krankheitsformen, Syphilis und Skrofeln, vereint auftreten.

Die Anwendung geschieht nach folgender Methode: Die
 Vorbereitungskur, welche jedoch nöthigenfalls weg-
 bleiben kann, muss sich nach den persönlichen Verhältnis-
 sen richten. Im Allgemeinen lässt man ein leichtes Abführ-
 mittel nehmen; Plethorischen verordnet man einen Aderlass;
 bei Gastricismus ein Brechmittel u. s. w. Während der
 ganzen Vorbereitungskur schmale vegetabilische Diät, keine
 Milchspeisen oder Spirituosa oder Kaffee. — *Eigentliche*
Kur. Morgens um 6 Uhr nimmt ein Mann 6 Esslöffel —
 eine Frau 4—5 — von dem Roob (umgeschüttelt); der Pa-
 tient bleibt im Bette. (Ueberhaupt ist Unterstützung der

Hautausdünstung während der ganzen Kur besonders wichtig; nur bei warmer, trockner und in jeder Hinsicht milder Witterung darf der Patient am Tage in's Freie gehen.) Um 8 Uhr und dann ferner alle halbe Stunden von einer sehr schwachen Sarsaparillenabkochung (℥ij auf 4 Quart Colatur) ℥ix (3 kleine Tassen), bis etwa 7 solche Portionen getrunken worden sind. Um 12 Uhr etwas Hammelskarbonade, gebratenes Huhn oder Rindfleisch mit 5—6 Loth Weissbrod. Während der Mahlzeit darf nichts als die schwache Sarsaparillenabkochung getrunken werden. Gegen 4 Uhr wieder 6 Esslöffel (eine Frau 4—5) von dem Roob. Von 6 Uhr an bis 8½ Uhr wieder halbstündlich ℥ix Sarsaparillenabkochung. Um 9 Uhr Mahlzeit wie zu Mittag. So 10 Tage lang. Am 11. Tage blos strenge Diät; Sarsaparillenabkochung. Am 12. Tage eben so. Am 13. Tage ein Abführmittel. Am 14. Tage einige Maass Gerstenwasser mit etwas Bitterem. Vom 15. bis zum 20. Tage wie am ersten Tage der eigentlichen Kur.

Damit ist meistens der Kranke geheilt; doch soll der Gebrauch der schwachen Sarsaparillenabkochung noch 14 Tage fortgesetzt und die strenge Diät nur allmählig geändert werden.

Bei zu starken Schweissen während der Kur gebe man weniger Sarsaparillenabkochung, bei zu starken Durchfällen etwas weniger Roob, oder breche nöthigenfalls ganz ab; bei Obstruktion eine halbe Stunde vor dem Abendessen ein Klystier; bei gereiztem, fieberhaftem Zustande statt der Fleischspeisen mehlige ohne Butter.

3320. R_x. Radic. sarsaparill.
 Rasur. guajaci āā ℥j
 Aquae ℥xij
 Sacchari crudi
 Mellis albi āā ℥jβ.
 M. f. l. a. syrupus.

S. Zu ℥ij—iv, vorzüglich als Vehikel des van Swieten'schen Liquors zu geben.

Hôp. des Vénér.

3321. *Ry.* Balsam. de Mecca $\mathfrak{z}\text{vj}$
 Cort. chinae rubr. gross. pulv
 Herb. salviae conc.
 Rad. sarsaparill. conc. $\text{aa } \mathfrak{z}\text{j}$
 Croci $\mathfrak{z}\beta$
 Spirit. vini rectific. $\mathfrak{z}\text{iiij}$.
M. macer. per iiL hor. , deinde col.
S. Pradier'sches Kataplasma.

Anwend. Gegen Gicht.

Kurz vor dem Gebrauch vermischt man einen Theil dieser Tinktur mit 2—3 Theilen Kalkwasser, und wenn sich ein Bodensatz zeigt, so schüttelt man die Flasche beim Ausgiessen stark um. Alsdann bereitet man einen fingerdicken Brei von Leinsamenmehl, auf welchen man ohngefähr $\mathfrak{z}\text{ij}$ von obiger Flüssigkeit giesst, umwickelt damit sogleich die Füße und Beine, legt Flanell darüber und befestiget alles mit einer Binde. Nur aller 24 Stunden wird der Umschlag erneuert.

Sassafras cortex et lignum.

Sassafrasrinde und Holz.

(*Fenchelholz. Von Laurus Sassafras L.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, zu $\mathfrak{z}\text{j}—\text{ij}$, häufiger im Aufguss, selten in Abkochung, $\mathfrak{z}\beta—\text{j}$ auf $\mathfrak{z}\text{ij}$ Wasser, tassenweise. — Extrakt in Pillen, Lösung, zu $\mathfrak{z}\text{j}$, täglich. Aether. Oel, 1—2 Tropfen.

3322. *Ry.* Rad. bardanae $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 Coque cum
 Aquae commun. $\mathfrak{z}\text{v}$ ad colat. $\mathfrak{z}\text{iiij}$.
 Sub finem coct. adde
 Ligni (cort.) sassafras $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Rad. liquirit. $\mathfrak{z}\beta$.
M. S. Aller 2 Stunden 1 Weinglas voll zu nehmen.
Anwend. Bei chronischen Exanthemen.

3323. *Ry.* Pulv. cort. ligni sassafras
 Olei sassafras gutt. iv.
 M. f. pulv. Div. in iv part. aequal.

S. Täglich 2 Pulver zu nehmen.

Anwend. Bei Gicht und chronischem Rheumatismus.

Kämpf.

Scammonium. Skammonium.

(*Scammoneum aleppense*, *Dacrydium*, *Diagry-*
dion. Von *Convolvulus Scammonia* L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Latt-
 werge, Küchelchen, Emulsion, zu gr. j — iij, einigemal
 täglich; als Reizmittel zu gr. viij — xvj auf einige Dosen
 vertheilt, als Drasticum rasch hinter einander.

3324. *Ry.* Scammonii gr. xij — xxiv
 Sacchari albi 3j.
 Tere et admisce
 Pastae pro macaronis suff. q.
 F. rotulae xij.

S. Täglich 2—3 Stück.

Laxirmakaronen.

Anwend. Als kräftiges Abführmittel.

3325. *Ry.* Scammonii
 Radic. rhei āā ʒj
 Elaeosacch. anisi ʒß.
 M. f. pulv. Div. in iij part. aequal. D. ad chart.
 ceratam.

S. Ein Pulver auf einmal bis zur Wirkung.

Anwend. Abführmittel.

Berends.

3326. *Ry.* Scammonii
 Resinae jalapae pulv. āā ʒij
 Rad. scillae pulv. ʒß
 Extr. rhei compos. ʒiv
 Spirit. vini rectific. q. s.
 F. pil. xl. Consp. cass. cinnamom. D. in vitro.
S. Aller 4 Stunden 1 Pille.
Anwend. Gegen Wassersucht.

de Man. Wendt.

3327. *Ry.* Scammonii gr. viij
 Sacchari albi ʒij
 Lact. vaccini ʒiij
 Aquae laurocerasi ʒj.
M. S. Umgeschüttelt, 2stündlich einen Esslöffel bis zur Wirkung.
Anwend. Als Purgans bei Wassersucht.

Planche. Berzelius.

Scillae radix. Meerzwiebel.

(*Bulbus squillae. Von Scilla maritima L.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen Lattwerge, zu gr. ʒ—iv, 3—4mal. Im Aufguss mit Wasser, Wein, Bier, zu ʒj—ij auf ʒvj—viij, esslöffelweise, 4—6mal; als Salbe, Umschlag. — Extrakt, zu gr. ʒ—ij. — Tinktur, zu 10—20 Tropfen. — Kalihaltige Tinktur (*Tinct. sc. kalina*), zu 10—20 Tropfen, 3—4mal. — Meerzwiebelelessig (*Acetum scillae*), rein, in Mischung, zu 20—60 Tropfen. — Sauerhonig (*Oxymel scill.*) rein, in Mischung, Lattwerge, zu ʒj—iv, 3—4mal. Gurgelwasser, Pinselsaft, Klystier.

Man vermeide concentrirte Säuren, besonders Salpeter- und Salzsäure, Salzbilder, Alaun, empfindliche Metallsalze, Gerbestoff.

3328. *Ry.* Rad. scillae
 Fol. digital. purp. āā gr. j
 Olei juniperi gutt. iij
 Crem. tart. borax.
 Rad. liquirit. āā ʒj
 Cort. cinnamomi gr. ij.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.

S. Täglich 2—3mal 1 Pulver.

Pulvis diureticus Hufelandi.

Anwend. Gegen Wassersucht.

Kindern nur $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ Pulver.

Hufeland.

3329. *Ry.* Crem. tart. solub. ʒβ
 Rad. scillae ʒβ
 Magnes. albae
 Sacchari albi āā ʒj.
 M. f. pulvis.

S. Aller 2 Stunden 1 Messerspitze voll in einer Tasse Pfeffermünzthee zu nehmen.

Pulvis diureticus s. hydragogus Cerutti.

Anwend. Bei akuter Haut- und Bauchwassersucht.

Nach Befinden kann man Limatur. mart. ʒij diesem Pulver zusetzen.

Cerutti.

3330. *Ry.* Rad. scillae gr. vj
 „ calami arom.
 Natri carbon. dep. sicci āā ʒβ.
 Elaeosacch. juniperi ʒij.
 M. f. pulv. Div. in vj part. aequal. D. in charta cerata.

S. Täglich 3mal 1 Pulver.

Pulvis diureticus Ph. Mil. Bor.

Anwend. In der Wassersucht.

3331. *Ry.* Rad. scillae gr. ij
 Herb. digital. purp. gr. j
 Tartari depur. 3ß.
 M. f. pulv. Disp. tal. dos. vj.

S. Täglich 3mal ein Pulver.

Anwend. Bei Wassersucht.

Osiander.

3332. *Ry.* Rad. scillae gr. ij
 „ vincetoxici gr. vj
 Nitri depur. 3j.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. viij.

S. Aller 4 Stunden ein Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Hautwassersucht.

Lentin.

3333. *Ry.* Rad. scillae gr. vj
 „ zingiberis gr. xij
 Kali nitrici
 „ sulphurici āā 3j.
 M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Täglich 2—3mal ein Pulver zu nehmen.

Anwend. In der Wassersucht.

Sundelin.

3334. *Ry.* Pulv. rad. scillae gr. iv—vj
 „ „ zingiberis gr. vj
 Sacchari albi 3iv.
 M. f. pulv. Div. in iv part. aequal.

S. Früh und Abends ein Pulver.

Anwend. Gegen Wassersuchten.

Radius.

3335. *Ry.* Pulv. rad. scillae
 Sacchari albi āā 3β
 Magnes. albae 3j
 Tartari depurati 3β.
 M. f. pulvis.

S. *Aller 2 Stunden eine reichliche Messerspitze voll in Wasser gerührt zu nehmen.*

Anwend. Gegen Wassersucht.

Jahn.

3336. *Ry.* Pulv. rad. scillae ʒj
 Opii puri gr. iv
 Cort. cinnamomi 3j.
 M. Div. in viij part. aequal.

S. *Täglich 2mal ein Pulver zu nehmen.*

Anwend. Bei Wassersuchten.

Edwards et Vavasseur.

3337. *Ry.* Pulv. rad. scillae gr. xvj
 „ „ irid. florent.
 „ „ liquirit. āā ʒβ
 Sacchari lactis ʒij
 Olei anisi gutt. iij.
 M. f. pulv. Div. in iij part. aequal.

S. *Früh und Abends ein Stück mit Brustthee zu nehmen.*

Anwend. Gegen chronischen Katarrh.

Augustin.

3338. *Ry.* Sapon. medic. 3ij
 Gummi ammoniaci
 Milleped. ppt.
 Rad. scillae āā 3j

Bals. copaiv. q. s.
F. pil. gr. ij. Consp. cass. cinnamom.

S. Täglich einigemal 2—4 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei asthmatischen, hydropischen, Nieren- u. Steinkrankheiten ein treffliches Mittel. — In dieser Form verträgt der Magen die Scilla am besten.

Hufeland.

3339. *Ry.* Rad. scillae pulv.
Sulphur. stibiat. aurant.
Gummi gutti pulv. āā ʒj
Extr. pimpinellae q. s.
F. pil. lx. Consp. lycop.

S. Aller Stunden eine Pille zu nehmen.

Anwend. Bei Wassersucht mit Hartleibigkeit.

Heim.

3340. *Ry.* Rad. scillae pulv.
Sulphur. stibiat. aurant.
Herb. digital. purp. pulv.
Rad. pimpinell. pulv.
Terebinth. laric. āā ʒj
Extr. pimpinellae q. s.
F. pil. lx. Consp. lycop. D. in vitro.

S. Aller 3 Stunden eine Pille.

Anwend. Bei Wassersucht.

Heim.

3341. *Ry.* Sagapeni depurat. ʒij
Radic. scillae pulv.
„ ipecacuanhae pulv.
Herb. digital. purp. pulv. āā ʒß
Extr. gratiolae ʒj

Spirit. vini rectific. q. s.

F. pil. cxx. Consp. rad. irid. flor. D. in vitro.

S. Täglich 3mal 4—6 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei Brustwassersucht.

Heim.

3342. *Ry.* Gammi ammoniaci ʒjß

Radic. senegae pulv. ʒij

Sulphur. antimon. aurant. ʒß

Radic. scillae gr. xv.

M. f. c. extract. taraxaci q. s. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Täglich 3mal 5—8 Stück.

Anwend. Als harntreibendes Mittel.

Berends.

3343. *Ry.* Pulv. radic. scillae

Sapon. medicat.

Ammoniaci āā ʒij

Olei anisi aether. gutt. viij.

M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Zweimal täglich 6—10 Stück.

Anwend. Als harntreibendes Mittel bei Wassersucht nach Fiebern.

Baldinger.

3344. *Ry.* Pulv. radic. scillae

Hydrargyr. muriat. mit. āā ʒij

Aloes ʒß

Opil gr. ij.

M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Aller 3 Stunden ein Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Wassersucht.

Weickard.

3345. *Rx.* Rad. scillae gr. x—xv
 Piperis nigri
 Kali nitrici āā gr. xv
 Pulv. radic. ipecacuanhae gr. v
 Opii puri gr. ij.
 Syrup. cort. aurant. q. s.
 F. boli iv.

M. S. Täglich 2 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Hautwassersucht.

Fordyce.

3346. *Rx.* Pulv. rad. scillae
 Gummi ammoniaci
 Kali nitrici āā 3j
 Sapon. medic. 3ij
 Syrupi simplicis q. s.
 F. pil. gr. iij vel gr. iv. Consp. lycop.
S. Aller 2 Stunden ein Stück.

Anwend. Als auflösendes und harntreibendes Mittel.

Parmientier.

3347. *Rx.* Pulv. rad. scillae 3ij
 Sulphur. stibiat. aurant.
 Ammonii carbon. pyro-oleos. āā 3ß
 Extr. elaterii 3j
 Olei anisi gutt. iij
 Succu liquiritae depur. q. s.
 F. pil. gr. ij. Consp. lycop.
S. Fünf bis zehn Stück auf einmal zu nehmen.
 Pilulae physagogae.

Richter.

3348. *Rx.* Pulv. rad. scillae 3ß
 Gummi ammoniaci
 Tartari depur. āā 3ij

Ammon. muriat. depur. ℥j
 Syrup. cinnamom. q. s.
 F. electuar. molle.

S. Täglich 3mal einen Theelöffel voll zu nehmen.

Electuarium deobstruens Swediauri.

Anwend. Gegen Wassersucht in Folge von Unterleibsstockungen.

Swediaur.

3349. *Ry.* Radic. scillae rec. ℥ß
 Cort. aurant.
 Radic. calami aromat. āā 3j.
 Infunde cum
 Vini gallici albi ℥jß.
 Digere per tres dies. Colatur. adde
 Oxymell. scillitici 3j.

M. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Wassersucht.

Richter.

3350. *Ry.* Pulv. rud. rad. scillae ℥j—iß—ij
 „ „ „ galang. min. 3v
 Strobul. lupuli conc. 3x
 Spirit. frumenti q. s.
 Digere per diem saepius conquassando.
 Cola cum express. Colat 3viiij adde
 Spirit. nitrico-aether. 3iij
 Elaeosacch. juniperi 3ß.

M. S. Täglich 4mal einen Esslöffel voll.

Anwend. Bei Wassersucht von übermässigem Genuss geistlicher Getränke.

Vogt.

3351. *Ry.* Rad. scillae gross. pulv. 3j
 Cass. cinnamom. pulv. 3ij

Kali carbon. e cin. clav. $\mathfrak{3}\beta$

Vini gall. albi $\mathfrak{3viiij}$.

Digere per xij horas.

Colat. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Bei Wassersucht.

G. A. Richter.

3352. Rx. Radic. scillae $\mathfrak{3}\beta$.

Coque cum

Aquae comm. $\mathfrak{3x}$ ad colat. $\mathfrak{3viiij}$.

Sub finem coct. adde

Radic. valerianae $\mathfrak{3ij}$.

Colatis admisce

Gummi guajaci $\mathfrak{3ij}$

Mucilag. gummi arab. $\mathfrak{3iij}$

Tinct. antimon. acris

Spirit. nitri dulcis $\overline{aa}$ $\mathfrak{3ij}$

Laudani liquidi gutt. xx

Syrupi aurantiorum $\mathfrak{3}\beta$.

M. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Hautwassersucht.

Hufeland.

3353. Rx. Radic. scillae rec. $\mathfrak{3}\beta$

Vini albi generosi $\mathfrak{8ij}$.

Digere per tres dies.

S. Zweistündlich einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Wassersucht.

54. Rx. Extr. scillae gr. xvj

Liqu. kali acetici $\mathfrak{3}\beta$

Aquae petroselini $\mathfrak{3iv}$

Syrupi rhei $\mathfrak{3j}$.

S. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Wassersucht, besonders mit Verstopfung.

Quarin.

3355. *Rx.* Extr. scillae ʒj
 „ rhei aquos. ʒij.
 M. f. c. pulv. rad. senegae q. s. pil. Lx.
 Consp. lycop.

S. *Aller 3 Stunden 2—4 Stück.*

Anwend. Gegen Bauchwassersucht, allgemeine Hautwassersucht, Oedem der Füße.

P. J. Schneider.

3356. *Rx.* Hydrargyri muriat. mit. ʒj
 Extr. scillae ʒij
 „ centaur. minor.
 „ gentian. aa ʒiij
 Galbani ʒj.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. *Täglich 3mal 10 Stück zu nehmen.*

Anwend. Gegen Wassersucht.

Remer.

3357. *Rx.* Extr. scillae ʒj
 Pulv. subtiliss. cantharid. gr. v.
 „ flor. chamomill. vulg. q. s.
 F. pil. xxx. Consp. cass. cinnamom.

S. *Täglich 3mal eine Pille in Haferschleim.*

Anwend. Bei torpider Wassersucht.

3358. *Rx.* Tinct. scillae ʒij
 Aetheris nitrici ʒj.

M. S. *Täglich 5—6mal einen Kaffeelöffel voll mit einer Tasse Wachholderbeerenthee zu nehmen.*

Anwend. Als Diureticum.

Amerik. Hosp.

3359. *Ry.* Tinct. scillae $\bar{3}ij$
 „ kalinae $\bar{3}j$
 „ opii simplicis $\bar{3}\beta$.

M. S. Aller 3 Stunden 10 Tropfen zu nehmen.

Anwend. In der Wassersucht.

Schubarth.

3360. *Ry.* Tinct. scillae kalinae Ph. Bor. $\bar{3}j$.

S. Täglich 3 mal 10 — 30 Tropfen und mehr zu nehmen.

Anwend. Gegen Wassersucht oft nützlich, wo alle anderen Mittel vergeblich angewendet worden waren. Greift es den Magen an, so versetzt man es mit Tinct. aromatica.

Hufeland.

3361. *Ry.* Aceti scillitici $\bar{3}vj$ — $\bar{v}ijj$
 „ vini optimi $\bar{3}\beta$
 Kali carbon. q. s. ad saturat.

(vel

Sal. vol. C. C. q. s. ad saturat.

Aquae menthae $\bar{3}iv$

Syrupi diacodii $\bar{3}\beta$.

M. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel.

Mixtura salino-scillitica Himlyi.

Anwend. Gegen Wassersucht.

Himly. Fuchs.

3362. *Ry.* Extr. trifol. fibrini $\bar{3}\beta$
 Aceti scillitici $\bar{3}vj$
 Spirit. muriatico-aether. $\bar{3}\beta$.

S. S. Täglich 3 mal 60 Tropfen.

Anwend. Bei Wassersucht.

Tode.

3363. Rx. Sal. tartari $\bar{3}j$
 Aceti scillitici $\bar{3}ij$
 Succu citri rec. q. s. ad saturat.
 Syrup. acetosit. citri
 Aquae flor. aurantior. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$.

M. S. Aller 1—2 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Gegen grosses Oedem, ja Bauchwassersucht, wenn die Natur für die aufhörende Menstruation andere Auswege sucht, nach Merkuriallaxanzen. Diess ein Jahr lang alle 4 Wochen 1—2 Tage wiederholt.

Sachse.

3364. Rx. Aceti scillit. $\bar{3}j$
 Liqu. ammon. carbon. pyro-oleos.
 (vel
 Kali carbon. e tartari) q. s. ad saturat; cui
 adde
 Aquae petroselini $\bar{3}v$
 Elaeosacch. juniperi $\bar{3}j$
 Spirit. nitrico-aetherei $\bar{3}j$.

M. D. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Wassersucht.

Phoebus.

3365. Rx. Kali carbon. $\bar{3}j$
 Aceti scillitici q. s. ad saturat.
 Tinct. opii simpl. gutt. xxx
 Aquae cinnamomi $\bar{3}ij$.

M. D. S. An einem Tage auf dreimal zu verbrauchen.

Anwend. In gleichen Fällen.

Leake.

3366. Rx. Aceti scillitici $\bar{3}vj$
 Oxymell. scillit. $\bar{3}ij$
 Kali sulphurici $\bar{3}j$

Decoct. hordei $\bar{\text{z}}\text{viij}$

Aquae hyssopi $\bar{\text{z}}\beta$.

M. S. Alle halbe Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. In chronischen Lungenkatarrhen.

Reil.

367. *Ry.* Oxymell. scillit. $\bar{\text{z}}\text{j}$

Syrup. althaeae $\bar{\text{z}}\text{ij}$.

M. S. Viermal des Tages einen Theelöffel.

Anwend. Gegen schweren Auswurf.

Tode.

3368. *Ry.* Tartari boraxati $\bar{\text{z}}\text{ij}—\text{vj}$

Aquae petroselini $\bar{\text{z}}\text{viij}$

Oxymell. scillit. $\bar{\text{z}}\text{j}$

Spirit. muriat.-aether. $\bar{\text{z}}\text{ij}$.

M. S. Zweistündlich einen Esslöffel.

Anwend. Bei Wassersucht.

Berends.

3369. *Ry.* Infusi flor. sambuci $\bar{\text{z}}\text{iv}$

Oxymell. scillit. $\bar{\text{z}}\text{ij}$

Liqu. kali acetici $\bar{\text{z}}\beta$.

M. S. Täglich 3mal einen Esslöffel.

Anwend. In gleichen Fällen.

Nicolai.

3370. *Ry.* Oxymell. scillit. $\bar{\text{z}}\beta$

Infusi hyssopi $\bar{\text{z}}\text{iv}$

Acid. nitric. alcohol. $\bar{\text{z}}\beta$.

M. S. Stündlich einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Wassersucht.

Höp. milit.

3371. R_x. Oxymell. scillit. ℥j
Aquae cinnam. ℥x.

M. S. Zum Gurgeln.

Anwend. Gegen chronische Halsentzündung.

Swediaur.

3372. R_x. Tinct. scillae
„ digitalis purp. āā ℥ij.

S. Zum äussern Gebrauch.

Anwend. Bei Wassersucht, besonders Bauchwassersucht, Flanell damit zu befeuchten und auf den Unterleib zu legen.

Trousseau.

3373. R_x. Decoct. herb. digital. purp. (℥ij) ℥j
Olei terebinth. ℥j
Vitell. ovar. ij
Extr. scillae ℥j.

M. f. liniment.

S. In die Nierengegend einzureiben.

Anwend. In der Wassersucht.

Schubarth.

3374. R_x. Radic. scillae ℥iij.

Coque cum

Lixivio caust. q. s. ad mucilag.

Cola et adde

Adipis suilli q. s. ut f. unguent.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Zur Zertheilung von Drüsengeschwülsten und Verhärtungen.

Hufeland.

Scordii herba. Lachenknoblauchkraut.(Von *Teucrium Scordium* L.)

Form u. Gabe. Selten innerlich, im Aufguss, zu $\text{℥ij}—\text{iv}$ auf $\text{℥vj}—\text{viij}$, esslöffelweise. Als Mund- und Gurgelwasser, Umschlag, Einspritzung, $\text{℥j}—\text{viij}$ auf $\text{℥viij}—\text{xij}$.

3375. Rx. Herb. scordii
 „ salviae āā $\text{℥ij}—\text{iv}$.

Conc. infunde in

Aquae ferv. q. s. ad colat. ℥ix

Acidi muriat. dilut. ℥jβ

Mellis rosarum ℥j .

M. S. Zum Gurgeln und Einspritzen.

Anwend. Gegen brandige Bräune beim Scharlach.

Brera.

3376. Rx. Herb. scordii ℥β
 Aquae font. ℥vj .

Coque per aliquot momenta et cola; admisce

Oxymell. aeruginis ℥ij .

S. Lauwarm einzuspritzen.

Anwend. Gegen speckige Fistelgänge.

J. A. Schmidt.

3377. Rx. Pulv. herb. scordii
 „ „ rutae āā ℥iij

Farin. semin. lini ℥vj

Sal. ammon. contus. ℥iij .

M. S. Mit der Hälfte Essig oder Wein [und der

*Hälfte Wasser zu einem Breiumschlage anzu-
machen und lauwarm aufzulegen.*

Anwend. Nach Kontusionen und Sugillationen.

Meyer.

Secale cornutum. Mutterkorn.

*(Clavus secalis s. cerealis, Sclerotium Clavus,
Ergota.)*

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Schüttelmixtur,
zu gr. v—x—xx, stündlich oder noch öfter, im Aufguss
oder Ebullition oder Abkochung zu ʒß—j—ij auf ʒiv—
vj, esslöffelweise alle halbe Stunden. — Aeusserlich zu
Klystieren ʒj, zu Einspritzungen.

3378. Ry. Secalis cornuti gr. vj—x
Sacchari albi ʒß.

M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj ad chartam ceratam.

S. Aller 10 Minuten 1 Pulver.

Anwend. Gegen Mutterblutfluss.

Man soll die Wirkung des Mittels auf 3 — 5 Stunden
anschlagen können.

Löwenhard.

3379. Ry. Secalis cornuti ʒj
Opil puri gr. ij.

*M. f. pulv. Div. in vj part. aequal. D. ad chart.
cerat.*

S. Aller 2 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Zur Beförderung kräftiger Wehen.

Atlee.

3380. *Ry.* Secalis cornuti gr. iij
 Sacchari lactis ʒß.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. xij ad chart. ceratam.

S. Stündlich 1 Pulver und jede Stunde um gr. jß —ij bis zu gr. x gestiegen.

Anwend. Bei mangelnden Wehen,

Lorenz.

3381. *Ry.* Secalis cornuti
 Boracis
 Elaeosacch. chamomill. āā ʒß.
M. f. pulv. Disp. tal. dos. x. D. ad chart. ceratam.

S. Alle 1/2—1/4 Stunden 1 Stück zu geben.

Anwend. Zur Beförderung der Wehen.

Schmidt in Celle.

3382. *Ry.* Secalis cornuti
 Sacchari albi āā 3ß.
M. f. pulv. Div. in tres part. aequal. D. ad chart. ceratam.

S. Früh und Abends 1 Pulver.

Anwend. Bei Menostasie.

v. Hildenbrand.

3383. *Ry.* Secalis cornuti 3j
 Sacchari albi 3ß.
M. f. pulv. Div. in viij part. aequal. D. ad chart. ceratam.

S. Aller 3 Stunden 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. Gegen Metrorrhagieen, Nasenbluten, Bluthusten und Blutharnen.

Spajrani.

3384. *Ry.* Secalis cornuti pulv. $\text{℥}\beta$

Sacchari albi ℥ij

Aquae cinnamomi ℥j .

M. S. Wohlumgeschüttelt, auf 3mal von 10 zu 10 Minuten zu nehmen.

Anwend. Bei mangelnden Geburtswehen.

Dewees.

3385. *Ry.* Secalis cornuti ℥ij .

Infunde

Aquae fervid. ℥iv .

Colat. S. Aller 10 Minuten 1 Esslöffel.

Anwend. Als Vorbauungsmittel gegen Mutterblutflüsse nach der Geburt, eine halbe Stunde vor Beendigung der Geburt anzufangen und bis eine Stunde nach derselben fortzufahren, da die Wirkungen des Mutterkorns nur 12—20 Minuten andauern.

Guillemot.

3386. *Ry.* Secalis cornuti $\text{℥}\beta\text{—j}$.

Infunde

Aquae ferv. q. s. ad colat. ℥iv .

Syrupi chamomill. $\text{℥}\beta$.

M. S. Alle halbe Stunden 1—2 Esslöffel.

Anwend. Bei Geburtszögerung.

Prescot.

3387. *Ry.* Secalis cornuti cont. $\text{℥}\beta$.

Infunde

Alcohol. vini ℥vj .

Stent in digest. per quatrimum, tunc liquor coletur et servetur.

S. Kaffeelöffelweise.

Anwend. Bei mangelnden Wehen.

Carus.

3388. Rx. Secalis cornuti $\overline{3}j$.

Coque in

Aquae font. $\overline{3}viii$.

Col. S. *Binnen 2 Tagen zu verbrauchen.*

Anwend. Gegen weissen Fluss.

Bazzoni.

3389. Rx. Secalis cornuti $\overline{3}j$.

Coque cum

Aquae font. $\overline{3}vj$ ad colat. $\overline{3}iv$.

Cui refriger. adde

Spirit. muriat.-aether. $\overline{3}\beta$

Syrup. rubi idaei $\overline{3}\beta$.

M. S. *Halbstündlich ein Dritttheil hiervon zu nehmen.*

Anwend. Gegen mangelnde oder schwache Wehen und gegen Gebärmutterblutflüsse in Folge der Niederkunft.

Schneider.

3390. Rx. Secalis cornuti $\overline{3}j$

Herb. digital. purp. gr. xv.

Infunde cum

Aquae ferv. q. s. ad colat. $\overline{3}v$

Kali nitrici $\overline{3}j\beta$

Syrupi mineralis $\overline{3}\beta$.

M. S. *Stündlich 1 Esslöffel.*

Anwend. Gegen Lungenblutflüsse Schwindsüchtiger.

Fuchs.

3391. Rx. Secalis cornuti $\overline{3}j$

Cort. cinnamom. $\overline{3}\beta$.

Cont. ebull. in

Aquae commun. $\overline{3}v$ ad colat. $\overline{3}iv$

Syrupi cinnamom. $\overline{3}\beta$.

S. *Esslöffelweise zu nehmen.*

Anwend. Gegen Metrorrhagieen.

Choulant.

Sedum acre L. Mauerpfeffer.*(Katzenkräutlein, kleiner Hauslauch.)*

Form u. Gabe. Ausgepresster Saft, zu ℥j—ij;
 Pulver, Pillen, gr. v—x—xx; Abkochung, ℥j—ij auf ℥iv
 —vj. Aeusserlich das frische Kraut oder den ausgepress-
 ten Saft zu Umschlägen.

3392. Rx. Sedi acris
 Gummi mimosae āā ℥ß.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. viij.
 S. Täglich 1—4 Pulver zu nehmen.
 Anwend. Gegen Epilepsie.

Pasquier.

3393. Rx. Sedi acris gr. vj—x
 Elaeosacchari menth. pip. gr. viij.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.
 S. Morgens und Abends 1 Pulver.
 Anwend. Gegen Epilepsie.

Sommer.

3394. Rx. Sedi acris succ. rec. express. ℥ij
 S. Zum Verband.
 Anwend. Bei krebshaften Geschwüren.

Rust.

3395. *Ry.* Sedi acris herb. rec. ℥j.
Cont. ad cataplasma.

S. Umschlag.

Anwend. Bei Brust- und Lippenkrebs.

Lombard. Rust.

Sennae folia. Sennesblätter.

(*Folia sennae alexandrinae.* Von *Cassia acutifolia* DC. und anderen Arten.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Latt-
werge, zu gr. v—x als Reizmittel, einigemal täglich; zu
℥j—iij als Abführmittel; im Aufguss zu 3ß—j auf 3iv,
als Reizmittel; zu 3j—iv auf 3ij—iv, esslöffel- oder tas-
senweise als Abführmittel. — Tinktur, zu 3ß—ij.

Man vermeide reine und kohlensaure Alkalien, Kalk-
wasser, Eisensalze, Gerbestoff.

3396. *Ry.* Fol. sennae 3ij.
Magnes. sulphuricae 3vj.

Conc. S. Mit 2 Tassen kochenden Wassers auf-
zugiessen, 1/2 Stunde ziehen zu lassen, und
dann alle Stunden 1/2 Tasse zu trinken bis zur
Wirkung.

Anwend. Abführmittel.

Radius.

3397. *Ry.* Fol. sennae alex. 3ij—iij
Spec. pectoral. 3j.

C. M. S. Ein Pfötchen voll mit 2 Tassen kochen-

den Wassers aufzugießen und den Tag über zu verbrauchen.

Eröffnender Thee.

Anwend. Gelindes Abführmittel.

Radius.

3398. Ry. Fol. sennae $\bar{\text{z}}\text{iv}$.

Digere cum spirit. vini rectific. per xxiv horas.

Digere, cola et exsicca sine calore.

Flor. sambuci $\bar{\text{z}}\text{ij}\beta$

Semin. foeniculi

„ anisi $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{z}}\text{x}$

Tartari depur. $\bar{\text{z}}\text{v}$.

C. C. M. S. Einen Esslöffel voll mit 2—3 Tassen kochenden Wassers aufzugießen.

St. Germain - Thee.

Anwend. Milde, die Verdauung nicht schwächende Abführung.

3399. Ry. Fol. sennae alex. $\bar{\text{z}}\text{ij}\beta$

Semin. foeniculi

„ anisi $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{z}}\text{vj}$.

M. f. species.

S. Einen Esslöffel voll mit einer Tasse heißen Wassers anzubrühen.

Anwend. Gegen habituelle Leibesverstopfung Hypochondrischer, Hysterischer und dergleichen.

Choulant.

3400. Ry. Fol. sennae $\bar{\text{z}}\text{ij}\beta$

Summitat. millefol. $\bar{\text{z}}\text{iiij}$

Semin. carvi cont. $\bar{\text{z}}\text{ij}$

Infunde

Aquae ferv. q. s. ad colat. $\bar{\text{z}}\text{iiij}$

Natri phosphor.

Syrupi mannati āā ̄β.

M. S. Die Hälfte auf einmal, dann stündlich einen Löffel bis zur Wirkung.

Anwend. Abführung bei empfindlichen Individuen, Hypochondristen, Hysterischen.

Sundelin.

3401. *Ry.* Fol. sennae ̄ij

Rad. rhei ̄j.

Conc. infunde in aquae fervid. q. s. per $\frac{1}{4}$ hor.

In colat. ̄vj solve

Magnes. sulphuricae depur. ̄β

Mannae electae ̄j.

M. S. Aller 2 Stunden 2 Esslöffel voll bis zur Wirkung.

P. Frank.

3402. *Ry.* Fol. sennae alex. ̄j

Rad. rhei ̄j.

Infunde cum

Aquae ferv. q. s.

Dig. per $\frac{1}{4}$ hor. In colat. ̄iij solve

Mannae electae ̄β.

S. Die Hälfte auf einmal.

Anwend. Abführung für Kinder. Oft genügt es, alle Stunden einen Esslöffel bis zur Wirkung zu geben.

3403. *Ry.* Infus. fol. sennae (̄ij) ̄v

Gummi mimosae ̄jβ

Olei amygdal. dulc. ̄β.

M. f. emulsio, cui adde

Sacchari albi ̄β.

M. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Mildes Abführmittel bei Wöchnerinnen, bei sehr ge-

reiztem Zustande der Darmschleimhaut u. s. w. Um es zu verstärken, kann Kali natronat. $\mathfrak{z}\beta$, oder Natr. phosphor., nach Umständen auch Magnes. sulphuric. zugesetzt werden.

Radius.

3404. *Ry.* Fol. sennae $\mathfrak{z}\text{ij}$ —iv.

Infunde

Aquae cinnamom. simpl. q. s.

Colatur. $\mathfrak{z}\text{ij}$ admisce

Sacchari albi $\mathfrak{z}\text{j}$

Acidi tartarici

Aether. acetici $\overline{\text{aa}}$ gr. xv.

M. S. Stündlich einen Esslöffel voll bis zur Wirkung.

Anwend. Abführmittel für delikate Personen.

Schultz.

3405. *Ry.* Infusi fol. sennae ($\mathfrak{z}\beta$) $\mathfrak{z}\text{vj}$

Natri sulphur. $\mathfrak{z}\text{j}\beta$

Succi liquirit. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. S. Früh nüchtern 2 Esslöffel voll.

Anwend. Gelindes, längere Zeit zu brauchendes Abführmittel.

Blasius.

3406. *Ry.* Infusi sennae $\mathfrak{z}\text{vj}$

Tinct. sennae

Mannae $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\text{ij}$

Magnes. sulphuricae $\mathfrak{z}\beta$

Aquae menthae sativae

„ font. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\text{j}\beta$.

M. S. Die Hälfte, und wenn keine Wirkung erfolgt, die andere Hälfte zu nehmen.

Anwend. Abführmittel. — Das gewöhnliche Catharticum von

John Abernethy.

3407. *Ry.* Pulv. fol. sennae alex. $\bar{3}\beta$
 „ flaved. cort. aurant.
 „ semin. carvi sicci $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ij$
 Sacchari albi $\bar{3}vj$.
M. f. pulv. subtiliss.

S. Aller 1 — 2 Stunden ein Theelöffelchen voll in Wasser gerührt zu nehmen, bis mehrere Stuhlgänge erfolgen.

Anwend. Zum Abführen.

Kausch.

3408. *Ry.* Fol. sennae
 Sulphur. depur.
 Rad. liquirit.
 Semin. anisi $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$
 Sacchari albi $\bar{3}ij\beta$.
M. f. pulvis.

D. S. Täglich 4mal einen Theelöffel.

Anwend. Gegen chronische Katarrhe.

Fritze.

3409. *Ry.* Pulv. fol. sennae $\bar{3}j$
 Extr. taraxaci q. s.
 F. pil. xxx. Consp. lycop.

S. Fünf bis acht Stück zu nehmen.

Pilulae purgantes mites Hufelandi.

Anwend. Eines der sichersten und wirksamsten Purgirmittel.

3410. *Ry.* Fol. sennae $\bar{3}ij$ — ij
 Semin. lini $\bar{3}\beta$.
 Coque ex
 Aquae $\bar{3}x$ ad rem. colat. $\bar{3}vj$
 Natri sulphur. $\bar{3}ij$ — iv
 Olei lini $\bar{3}j$.

M. S. Klystier.

Anwend. Zum Abführen.

Sennae electuarium; Sennalattwerge.

(*Electuarium lenitivum, eccoproticum;*
eröffnende Lattwerge.)

Form u. Gabe. *Rein, in Mischung, zu ℥ij — iv,*
2 — 3 mal täglich.

3411. *Ry.* Electuar. e senna
Syrup. rubi idaei āā ℥j
Acidi tartarici gr. xv
Aquae rubi idaei ℥ij.

M. S. Ganz oder halb zu nehmen.

Anwend. Als angenehmes Abführmittel.

Neumann.

3412. *Ry.* Elix. propr. Paracelsi (Elix. aloëtici aci-
di) ℥ß
Pulv. rad. jalap. ℥j
Electuar. e senna ℥j.

M. S. Morgens, umgerührt, einen Theelöffel.

Anwend. Bei habitueller Hartleibigkeit ein gewöhnliches Ab-
führmittel von

Heim.

3413. *Ry.* Acidi tartarici ℥ij
Sacchari albiss. ℥j.
Solve in
Aquae flor. aurant. ℥ij.
Adde
Aether. acetic. ℥ß
Electuar. e senna ℥vj — x.

M. S. Umgeschüttelt, esslöffelweise.

Anwend. Abführmittel für sensible Personen, Damen.

Heim.

Sennae infusum aromaticum; gewürzhafter Sennaufguss.

Form u. Gabe. Wie bei

Sennae infusum compositum; zusammengesetzter Sennaufguss.

(*Aqua laxativa Viennensis* s. *Mannagettae*; *Wiener Tränkchen*.)

Form u. Gabe. Allein oder in Mixturen, zu $\mathfrak{z}\beta$ —ij, täglich 1—4mal.

3414. *Ry.* Infus. sennae comp. $\mathfrak{z}\text{j}$
Magnes. sulphuricae $\mathfrak{z}\text{j}$
Essent. cort. aurant. gutt. xv.

S. Morgens auf einmal mit Thee oder Suppe zu nehmen.

Anwend. Bei Leibesverstopfung. Dieses Mittel öffnet gelind, ohne Schneiden zu erregen, und kann, wenn man die Essenz weglässt, auch in Fiebern und Entzündungen gegeben werden.

Tode.

Serpentariae virginianae radix.

Virginische Schlangenwurzel.

(Von Aristolochia Serpentaria L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, zu ʒß—j, aller 2 Stunden; häufiger im Aufguss, ʒij—vj auf ʒiv—vj, esslöffelweise, 6—8mal täglich.

3415. R̄. Rad. serpentariae
 „ angelicae
 „ valerianae āā ʒij.

Coque vase clauso

Aquae fervid. ʒvj.

Colat. adde

Aether. vitrioli ʒj

Syrupi cort. aurant. ʒiij.

M. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Gegen böartige, faulige oder Nervenfieber am Ende der Krankheit, wenn der Puls sinkt, der Kranke erblasst.

Cullen. Pringle. Jahn.

3416. R̄. Rad. serpentar. virg.
 Cort. peruvian. reg. āā ʒj—ij.

Infunde

Aquae fervid. q. s. ad colat. ʒiv

Tartari borax. ʒij

Spirit. nitrico-aether. ʒj

Syrupi cort. aurant. ʒv

Succi juniperi ʒiij.

M. S. Zweistündlich einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Wassersucht.

Kopp.

3417. *Ry.* Rad. serpentar. virg. $\mathfrak{Z}\text{vj}$
 Aquae commun. ferv. $\mathfrak{Z}\text{viij}$.
 Ebull. paulisper vase clauso Colat. refriger. adde
 Spirit. sulphur.-aether. $\mathfrak{Z}\text{ij}$.

M. S. Stündlich einen starken Esslöffel.

Anwend. Im Nervenfieber.

Richter.

3418. *Ry.* Rad. serpent. virg.
 „ valerianae $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{Z}\text{ij}$
 Cort. peruvian. reg. $\mathfrak{Z}\beta$.
 Infunde
 Aquae fervid. q. s. ad colat. $\mathfrak{Z}\text{vj}$.
 Adde
 Spirit. muriatico-aether. $\mathfrak{Z}\text{j}$
 Syrup. cort. aurant. $\mathfrak{Z}\text{j}$.

M. S. Zweistündlich einen Esslöffel.

Anwend. In asthenischen Fiebern.

Berends.

3419. *Ry.* Rad. serpentar. virg. $\mathfrak{Z}\text{iiij}$.
 Infunde in
 Vini gallici albi $\mathfrak{Z}\text{iiij}$.
 In Colat. solve
 Chinii sulphurici $\mathfrak{Z}\text{j}$
 Vini ipecacuanhae $\mathfrak{Z}\beta$
 Aquae menthae piper.
 „ cinnamom. simpl. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{Z}\beta$
 Syrup. cort. aurant. $\mathfrak{Z}\text{j}$.

M. S. Aller 3 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Bei Hautwassersucht nach Wechselfiebern mit Milz-
 auftreibung verbunden.

Popken.

3420. *Ry.* Rad. serpentar. virg. cont. ℥vj
 Siliquae vanigliae ℥ij
 Vini malac. vetust. q. s.
 Digere per hor. iv saepius conquassando, dein
 cola cum express. et colat. ℥xij adde
 Camphorae ope spirit. vini rect. q. s. solut. ℥β
 Aether. acetic. ℥j
 Syrupi cinnamomi ℥β .

M. S. Aller $1\frac{1}{2}$ Stunden 2 Esslöffel.

Anwend. Als sehr kräftig belebender Aufguss bei Febris nervosa stupida alter, an Reizmittel gewöhnter Personen. Wenn er schneller bereitet werden muss, kann er auch warm digerirt werden.

Vogt.

3421. *Ry.* Pulv. radic. serpentar.
 „ summitat. arnicae āā ℥iij
 „ cort. chinae ℥β
 Syrupi cort. aurant. ℥vj .
M. f. electuar.

D. S. Alle Stunden einen kleinen Löffel voll zu nehmen.

Anwend. Im Typhus acutus und Febris nervosa lenta.

Stoll. Collin.

Serpylli herba. Quendel, Feldkümmelkraut.

(*Wilder Thymian. Von Thymus Serpyllum L.*)

Form u. Gabe. Als Thee, zu $\text{℥ij} - \text{ij}$ auf 2 Tassen; im Aufguss, zu $\text{℥j} - \text{ij}$ auf $\text{℥vj} - \text{viij}$, täglich. Als Mund-, Gurgel-, Waschwasser; Bad, $\text{℥β} - \text{ij}$; Umschlag, Kräutersäckchen.

3422. R_y. Herb. serpylli
 „ roris marini
 Flor. chamomill. vulg.
 Rad. calami aromat. āā 3ij
 C. M. S. Auf ein Bad.

Species pro balneis aromat. Schol. clin. Lips.

Clarus.

Spiritus Serpylli; Quendelgeist.

Form u. Gabe. Einreibung, Waschung. Zu Mund- und Gurgelwässern.

3423. R_y. Spirit. serpylli
 „ roris marini
 „ lavandulae āā 3j
 Olei nucis moschatae 3j
 „ menthae crispae ʒj.
 M. S. Zum Waschen.

Anwend. Zur Kräftigung und Belebung der Haut.

Simarubae cortex. Simaruba-, Ruhr-Rinde.

(Von Quassia Simaruba L.)

Form u. Gabe. In Pulver, zu ʒß—j, 3stündlich; häufiger im Aufguss und Abkochung, zu 3ß—j auf 3viij, esslöffelweise. Klystier.

Man vermeide Säuren, besonders Mineralsäuren, Metallsalze.

3424. R_y. Cort. simarubae 3ß
 Lichenis island. 3j.

Coque cum

Aquae comm. ℥jß ad colat. ℥j,
cui refriger. adde

Tinct. aromat. ℥ß
Syrup. cort. aurant. ℥jß.

M. S. Täglich 4mal, umgeschüttelt, 2 Esslöffel.

Anwend. Gegen atonische Blennorrhöen und Durchfälle.

Vogel.

Sināpis semina. Senfsamen.

(Von Sinapis nigra. L. In England braucht man Sinapis alba L.)

Form u. Gabe. Die ganzen Körner zu ℥ß—ij, 2—3mal täglich. Senfmehl zu ℥j—vj; im Aufguss mit Wasser, Wein, Bier, zu ℥iij—viij auf ℥j, $\frac{1}{2}$ tassenweise, 3—4mal; zu Senfmolken, ℥iij auf ℥ij Milch. Teig, Umschlag, Fussbad, ℥j—iv, selten ganze Bäder, ℥ß—j. — Aether. Oel, in schleimigem Getränk, Emulsion, $\frac{1}{4}$ —1 Tropfen, 2—3mal. Als rothmachendes Mittel in Weingeist oder fettem Oel gelöst. — Alcohol sinapisatum fortius (1: 12), mitius (1: 24), als rothmachendes Mittel.

Man vermeide starke Säuren, Salzbilder, Alkalien.

3425. *Ry.* Semin. sinap. integror.
Baccar. juniper. cont. āā ℥ij
Semin. dauci carott. ℥jß.
Macer. per ij—iij dies in
Cerevisiae fort. ℥xx.

Filtr. S. Drei bis vier Spitzgläser des Tages.

Cerevisia diuretica anglica.

Anwend. Gegen Blasenkatarrhe, Wassersuchten u. s. w.

3426. *Ry.* Olei sinap. aether. gutt. ij
 Gummi arab. $\bar{3}\beta$ —j
 Aquae cujusdam $\bar{3}vj$
 Sacchari albi $\bar{3}ij$ —iv.
M. f. emulsio.

S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Verschleimung des Magens und dadurch bedingte gänzliche Anorexie.

Wolff.

3427. *Ry.* Semin. sinapis $\bar{3}j\beta$ —ij
 Rad. galangae $\bar{3}j$.
Infunde
 Aquae fervid. $\bar{3}iv$.
 Stent in digest. per $\frac{1}{2}$ hor. Colat. adde
 Elix. robor. Whytt. $\bar{3}j$
 Tinct. valerian. $\bar{3}j\beta$.

M. S. Aller 2 Stunden einen halben bis ganzen Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Lähmung.

Schwartze.

3428. *Ry.* Semin. sinap. cont. $\bar{3}j$
 Vini gallici albi $\&j$.
 Digere leni calore per nychthemeron. Colat. adde
 Spirit. angelic. compos. $\bar{3}ij$.

M. S. Mundwasser, umgeschüttelt; auch innerlich, täglich 3—4mal einen Esslöffel.

Anwend. Bei Zungenlähmung.

Thilenius.

3429. *Ry.* Semin. sinap. subtiliss. pulv. $\mathfrak{Zj}$
 Olei amygdal. dulc. $\mathfrak{Ziv}$
 Succu citri q. s.
 ut f. unguentum.

S. Salbe.

Anwend. Gegen Sommersprossen, Leberflecke.

P. Frank.

3430. *Ry.* Farinae semin. sinap. nigr. $\mathfrak{Zij}$
 Kali carbon. crudi $\mathfrak{Zvj}$.

M. S. Mit Wasser angebrüht dem Fussbade beizumischen.

Anwend. Zur starken Ableitung nach den Füssen.

3431. *Ry.* Farinae semin. sinap. $\mathfrak{Z\beta}$
 Spec. emollient. $\mathfrak{Zij}$
 Aceti (Aquae) q. s.
 F. cataplasma.

S. Rothmachender Umschlag.

Anwend. Zur Zertheilung von Drüsengeschwülsten, Bubonen u. s. w.

Berends.

3432. *Ry.* Olei sinap. aether. gutt. xij
 Spirit. vini rectificati $\mathfrak{Z\beta}$.

S. S. s. n.

Solutio spirituosa olei sinapis aetherei, Alcohol sinapisatum.

Anwend. Man reibt bei empfindlicher Haut damit nur ein; bei weniger empfindlicher wird ein damit befeuchtetes Leinwandstück so lange aufgelegt, bis es trocken ist. Gegen subinflammatorische Leiden der Gelenke, Aponeurosen,

Muskeln- und chronische Rheumatismen dieser Theile; gegen rheumatische Neuralgien: als Otagie, Odontalgie, Prosopalgie oder Ischias; hysterische Kolikschmerzen und Gastrodynie; gegen Lähmungen, Gelenkanschwellungen und falsche Ankylosen.

Wolff.

3433. *Ry.* Olei sinapeos aetherei gutt. v—vj
Olei amygdal. dulc. ʒj.

M. S. Zum äussern Gebrauche.

Anwend. In gleichen Fällen.

Wolff.

3434. *Ry.* Semin. sinapeos gross. pulv. ʒiß
Farinae secalis ʒß
Liqu. ammon. caustic. q. s.
ut f. cataplasma mollius. D. in pyxide vesica
tectata.

S. Senfteig.

Anwend. Zur kräftigen Ableitung nach der Haut.

Sundelin.

Spiritus muriatico-aethereus.

Salzäthergeist.

(*Spiritus Salis dulcis, Aether muriaticus alcoholisatus; versüsster Salzgeist, Salzölgeist.*)

Form u. Gabe. Rein auf Zucker, in Mixturen, Saft, zu 10 — 20 Tropfen, mehrmals täglich. Aeusserlich als Pinselsaft, Zusatz zu Gurgelwässern, Einreibungen.

Man vermeide concentrirte Säuren, namentlich Schwefelsäure, Alkalien, Luft, Wärme.

3435. *Ry.* Spirit. muriat.-aether. 3ß
 Aquae petroselini
 Syrupi rhei āā 3j.

M. S. Stündlich einen Theelöffel voll.

Anwend. Als harntreibendes Mittel bei Kindern.

Wendt.

3436. *Ry.* Spirit. muriat.-aether. 3ß
 Aquae chamomill. 3iv
 Sacchari albi 3j.

S. S. Alle Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Bei grossem Gesunkensein der Kräfte nach erschöpfenden Krankheiten alter Leute.

Clarus.

3437. *Ry.* Spirit. muriat.-aether.
 Extr. chinae fusc. frig. par. āā 3j
 Aquae rutae 3j
 Mellis rosati 3ß.

M. S. Pinselsaft; umgeschüttelt.

Anwend. Gegen brandige Bräune bei Kindern.

Wendt.

Spiritus nitrico-aethereus. Sal-
peteräthergeist.

(*Spiritus Nitri dulcis, Aether nitricus alcoholi-
satus; versüsster Salpetergeist, ätherischer
Salpeterspiritus.*)

Form u. Gabe. Rein auf Zucker, in Mixturen,
Saft, zu 10—20 Tropfen, 3—6mal.

Man vermeide concentrirte Säuren, Chlor, Jod, kausti-
sche Alkalien, Luft, Wärme.

3438. R_y. Flor. sambuci ʒij.

Infunde cum

Aquae fervid. q. s. ad colat. ʒv

Oxymell. simpl. ʒβ

Liqu. Mindereri ʒvj

Spirit. nitrico-aether. ʒij—iij.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Mixtura diaphoretica Sch. clin. Lips.

Anwend. Gegen Katarrhe, Rheumatismen ohne beträchtliches
Fieber mit Trägheit der Hautverrichtung.

Clarus.

3439. R_y. Rad. ipecacuanh. ʒβ—ʒβ.

Infunde

Aquae ferv. q. s. ad colat. ʒvj

Spirit. nitrico-aether. ʒj—ʒj

Succi inspiss. juniperi ʒj.

Sol. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen asthenische Wassersucht nach Scharlach.

Wendt.

28 *

828 *

8 * * 828 *

28 * * 828 *

3440. *Ry.* Spirit. nitrico-aether.
Tinct. thebaic. $\bar{3}j$.

M. S. Aller 2 Stunden 20—25 Tropfen.

Anwend. Gegen hysterische Krämpfe.

J. C. Stark.

3441. *Ry.* Aquae menth. pip. $\bar{3}ij$
(Liqu. ammon. succ. $\bar{3}ij$ vel)
Spirit. nitrico-aether. $\bar{3}j$.

M. S. Theelöffelweise zu nehmen.

Mixtura incitans nervina et diuretica Brerae.

Anwend. Gegen Krämpfe mit unterdrückter Hautthätigkeit.

3442. *Ry.* Spirit. nitrico-aether. $\bar{3}ij$
Aquae rosar. $\bar{3}vj$
Syrup. rhoeados $\bar{3}vj$.

M. D. S. Stündlich 2 Esslöffel.

Vogel.

3443. *Ry.* Spirit. nitrico-aether. $\bar{3}ij$
Liqu. kali acetici $\bar{3}\beta$
Oxymell. colchici $\bar{3}v$.

M. S. Alle Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. In der Gicht.

Kaempfer.

3444. *Ry.* Spirit. nitrico-aether.
Tinct. valerianae
„ asae foetidae $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$.

M. S. Alle Stunden 20 Tropfen zu nehmen.

Anwend. Bei hysterischen Krämpfen.

3445. *Ry.* Spirit. nitrico-aether.
 Aceti scillae āā ̄ij
 Aquae juniperi ̄viii
 Spirit. cochlear. compos.
 Syrupi zingiberis āā ̄ij.

M. S. Dreimal täglich 2—3 Esslöffel voll.

Potio diuretica.

Anwend. In der Wassersucht.

Swediaur.

Spiritus sulphurico-aethereus. Schwefeläthergeist.

(*Spiritus Vitrioli dulcis, Liquor anodynus mineralis Hoffmanni; versüsste Schwefelsäure, ätherischer Schwefelspiritus, Hoffmann'sche Tropfen.*)

Form u. Gabe. Rein auf Zucker, in Mixturen u. s. w., zu 10—30 Tropfen, öfters täglich. Aeusserlich als Riechmittel, zu Einspritzungen, Einreibungen.

Man vermeide concentrirte Salpeter- und Schwefelsäure kaustische Alkalien und Chlor.

3446. *Ry.* Spirit. sulphurico-aether.
 Liqu. ammon. succin. āā ̄ij.

M. S. Alle Stunden oder aller 2—3 Stunden 20—30 Tropfen.

Guttae diaphoreticae et antispasmodicae
 Elleri.

Anwend. Gegen chronischen Rheumatismus, Krämpfe und atonische Gicht.

Brera.

Auch bei Brechdurchfällen mit Krämpfen, wie sie bei uns im heissen Sommer vorkommen.

3447. *Ry.* Elaeosacch. menth. pip. ℥ij .

Solve in

Aquae menth. pip. ℥v .

Adde

Spirit. sulphurico-aether. ℥j .

M. S. Stündlich 1 Esslöffel voll.

Anwend. Bei typhösen Fiebern mit Torpidität der Verdauungsorgane.

Richter.

Spongia marina tosta. Gebrannter Schwamm.

(*Spongia usta, calcinata, Carbo Spongiae. Von Spongia officinalis L.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Lattwerge, Trochisken, zu $\text{℥ij}—x$, einigemal; im Aufguss oder Abkochung, selten zu Umschlägen und Kissen.

Man vermeide Salzsäure, Chlor, Brom, salpeters. Silberoxyd, Quecksilbersalze, Blei- und Kupferoxydsalze.

3448. *Ry.* Carbonis spongiae ℥℥

Herb. digital. purp. gr. iv

Elaeosacch. foeniculi ℥ij .

M. f. pulv. Div. in xij part. aequal. *D. ad chart. ceratam.*

S. Täglich 3 Pulver zu nehmen.

Anwend. Gegen Kropf und Scrofulosis.

Bust.

3449. *Ry.* Carbon. spongiae

Stibii sulphur. nigr.

Sulphur. depur.

Pulv. herb. conii macul.

Conchar. praepar. āā 3j.

M. f. pulvis.

D. S. Täglich 2mal 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Kropf.

Kortum.

3450. Rx. Natri carbon. sicci gr. iv
Carbon. spongiae
Hydrargyri stibiato-sulphur. āā gr. vj
Pulv. herb. conii macul. gr. ij
Sacchari albi gr. x.
M. f. pulv. Disp. tal. dos. xij.

S. Täglich 3 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Kropf.

3451. Rx. Spongiae marin. tost. 3ß
Magnes. carbon.
Kali nitrici
Sacchari albi āā 3ij.
M. f. pulv. subtil.

S. Täglich 3mal ein Kaffeelöffelchen voll.

Pulvis strumalis Meadii.

Anwend. Gegen Kropf.

Mead. Clarus.

3452. Rx. Spong. marin. tost.
Kali tartarici
Sacchari albi āā 3ß
Ammon. muriat. dep.
Pulv. rad. imperator.
„ cinnamomi acut. āā 3ij
Sulphur. antimon. aurant.

Piper. longi ʒj.

M. f. pulv. subtiliss.

S. *Früh und Abends 1 gehäuften Kaffeelöffel voll zu nehmen.*

Pulvis contra strumam Hedeni patris.

Anwend. Gegen Kropf.

v. Ammon rath, noch einen Tropfen Sassafrasöl zu jeder Drachme zu setzen, besonders wenn man zu schneller Entscheidung der Krankheit leichte Fieberbewegungen erzielen will.

3453. R_y. Spongiae ustae ʒß
Syrup. cort. aurant. ʒijß.
M. f. electuar.

S. *Täglich 2—4mal 1 gehäuftes Kaffeelöffelchen voll.*

Anwend. Gegen Kropf.

3454. R_y. Carbon. spongiae ʒj
Aquae commun. ℥j.
Ebull. paulisp., postea digerantur in loco tepido
per xij horas. Colat. admisce
Aquae cinnamomi simpl. ʒij.

M. S. *Aller 3 Stunden 2 Esslöffel voll zu nehmen.*

Anwend. Gegen Kropf.

Hufeland.

455. R_y. Carbon. spong.
Chocolad. pulv.
Sacchari albi āā ʒß
Mucilag. gumm. tragacanth. q. s.
ut f. trochisci iij. Consp. cinnamom.

S. *Täglich 3mal 1—2 Stück.*

Anwend. Gegen Kropf und skrofulöse Drüsengeschwülste bei Kindern.

Phoebus.

3456. **Rx.** Ammon. muriat.
 Natri muriat. decrep.
 Spong. calc. non lotae āā part aequal.
 M. f. pulvis.

S. Zum äussern Gebrauch.

Morand's Halsband gegen Kropf.

Anwend. Man streut dieses Pulver auf Watte, welche in Form eines Halsbandes geschnitten ist, wickelt nun das Ganze in Mousseline, durchnäht es und bindet es um den Hals. Alle Monate muss dieses Kissen erneuert werden, und wenn es die Haut etwas reizt, so legt man es für einige Tage ab.

Stannum. Zinn.

A. Stannum limatum; Zinnfeile.

(*Limatura Stanni, Stannum granulatum, raspatum; geraspелtes, gekörntes Zinn.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Lattwerge, zu ʒj—iv, täglich einigemal. Aeusserlich Zucker auf Zinn abgerieben, als Augenpulver.

3457. **Rx.** Stanni limati ʒß
 Semin. cinae gr. xv
 Sacchari albi gr. v.
 M. f. pulvis.

S. Auf einmal zu nehmen.

Anwend. Gegen Bandwurm.

Fordyce.

3458. **Rx.** Stanni granulati
 Pulv. rad. filic. mar. āā ʒvj

Sacchari albi $\bar{3}\beta$.

M. f. pulv. Div. in iiii part. aequal.

S. *Alle halbe Stunden 1 Pulver.*

Anwend. Gegen Bandwurm.

Nach Verbrauch der Pulver ein Drasticum.

v. Autenrieth. Rösch.

3459. R_y. Stanni raspati $\bar{3}j$
 Extr. gentian. $\bar{3}ij$
 Mellis commun. q. s.
 ut f. electuar. spiss.

D. S. *Aller 3 Stunden, umgerührt, 2 Esslöffel.*

Anwend. Gegen Bandwurm.

P. Frank.

3460. R_y. Stanni limati $\bar{3}j$
 Pulv. filic. maris $\bar{3}ij$
 Conserv. rosar. q. s.
 F. electuar.

S. *Täglich 3mal 1 Theelöffel.*

Anwend. Gegen Bandwurm.

Nach jeder Gabe des Mittels einen mässigen Esslöffel Ricinusöl, dabei magere, stärker gesalzene Nahrung.

Hufeland.

3461. R_y. Stanni pulverati $\bar{3}j$ — $\bar{3}\beta$
 Mellis despumati q. s.
 F. electuar.

S. *Früh auf einmal.*

Anwend. Gegen Bandwurm.

Boudet.

3462. *Ry.* Sacchari albiss. ʒij.

Tere in vase stanneo ad color. ciner.

S. In's Auge zu blasen.

Saccharum joviale Boerhaavii.

Anwend. Gegen Hornhautflecke.

Boerhaave.

3463. *Ry.* Stanni subtiliss. pulv. ʒß

Boracis ʒj

Sacchari albi ʒij.

M. f. pulvis.

D. S. Täglich 2mal mit einem trocknen Pinsel aufzutupfen.

Anwend. Bei adynamischen Hornhauttrübungen.

Jüngken.

B. Stannum muriaticum; salzsaures Zinn.

(*Stannum muriaticum oxydulatum.*)

Form u. Gabe. Aetherische Lösung, zu gr. $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{4}$, 2—4mal. Aeusserlich Waschung.

3464. *Ry.* Spirit. muriatico-aether. ʒj

Stanni muriatici gr. j—ij.

S. S. Täglich 5 Tropfen 3—4 mal, und täglich um einige Tropfen zu steigen. — Bisweilen setzt man einige Tropfen Opiumtinktur zu.

Anwend. Gegen Epilepsie, Tetanus, Flechten.

Schlesinger.

3465. *Rx.* Stanni muriatici gr. j—ij
Aqua destillat. $\overline{3}$ vj.

S. S. Zum Waschen.

Anwend. Gegen Prurigo pudendi.

Schlesinger.

Stramonium. Stechapfel, Tollkraut.

(*Datura.* Von *Datura Stramonium L.*)

A. Stramonii herba; Stechapfelkraut.

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, zu gr. β —ij—vj und mehr, vorsichtig steigend, 1—2mal; im Aufguss, zu $\mathfrak{J}$ j—ij auf $\overline{3}$ iv—vj, esslöffelweise, 3—4mal. Als Rauchmittel, 1 auf 6—8 Rauchtabak. — Extrakt in Pillen, zu gr. β —j—ij.

Man vermeide Salzbilder, empfindliche Metallsalze, Gerbestoff.

3466. *Rx.* Asae foetidae
Sapon. medicat. āā $\overline{3}$ ij
Ferri carbonici $\overline{3}$ j
Extr. stramonii gr. vj.
M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Täglich 3mal 8 Stück.

Anwend. Gegen anhaltenden hysterischen Kopfschmerz.

Fricke.

3467. *Rx.* Extr. stramonii $\mathfrak{J}\beta$
Succi liquirit. inspiss. $\overline{3}$ ij.
M. f. pil. lx. Consp. lycop.

S. Täglich 2mal 10 Stück.

Anwend. Gegen Manie und Epilepsie.

Störk. Berends.

B. Stramonii semina; Stechapfelsamen.

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, zu gr. β — ij . — Extrakt eben so. — Tinktur, zu 10—20 Tropfen, 2—3 mal. Aeusserlich zu Augenbähungen und Einreibungen. — Aetherische Tinktur zu 10—25 Tropfen, 3—4 mal.

3468. *Ry.* Semin. stramonii $\mathfrak{z}\beta$
 Conserv. rosar. $\mathfrak{z}\text{ij}\beta$
 Radic. althaeae pulv. q. s.
 F. pil. lx. Consp. lycop.

S. Täglich 2 mal 10 Stück.

Anwend. Gegen Neuralgieen und Rheumatalgieen.

Berends.

3469. *Ry.* Hydrargyri muriat. mit. gr. v
 Fruct. capsici annui ppt. $\mathfrak{z}\beta$
 Semin. stramon. pulv. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Extr. liquirit. q. s.
 F. pil. lx. Consp. lycop.

S. Aller 4 Stunden 2 Stück.

Anwend. Gegen Gesichtsschmerz. — Während der Paroxysmen etwas Opium.

Peacock.

3470. *Ry.* Pulv. semin. stramonii gr. x
 Camphor. trit. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Pulv. sabin. $\mathfrak{z}\text{v}$
 Extr. senegae $\mathfrak{z}\text{iv}$.
 M. f. pil. gr. ij . Consp. flor. cass.

S. Täglich 3—4 mal 6 Stück.

Anwend. Gegen rheumatische Beschwerden.

Vogt.

3471. *Ry.* Extr. semin. stramonii gr. xij
Vini stibiatii $\text{℥}\beta$.

S. S. *Aller 3 Stunden 10 Tropfen in Melissenthee.*

Anwend. Bei mehreren Nervenkrankheiten.

Vogt.

3472. *Ry.* Tinct. stramonii $\text{℥}\beta$
Aquae laurocerasi $\text{℥}\beta$.

M. S. *Täglich 3—4mal 15—20 Tropfen.*

Anwend. Gegen Neurosen der Brust und des Unterleibes.

Read.

3473. *Ry.* Pulv. semin. stramonii $\text{℥}j$
Vini hispanici $\text{℥}iv$
Spirit. vini $\text{℥}\beta$.

Digere per aliquot dies leni calore et filtra.

S. *Zu 6—10—20 Tropfen zu geben.*

Anwend. Gegen Manie, Melancholie und krampfhaftes Beschwerden.

Hufeland.

3474. *Ry.* Tinct. stramonii $\text{℥}ij$
Aquae destill. simpl. $\text{℥}vj$.

M. S. *Als Umschlag mit Lämpchen anzuwenden.*

Anwend. Gegen krampfhaftes Verschliessung der Augenlider.

Hufeland.

3475. *Ry.* Tinct. stramonii aether. $\text{℥}ij$.

S. *Täglich 4mal 12, später 20 Tropfen.*

Anwend. Gegen Herzklopfen, Geistesverwirrung.

Amelung.

Gegen Gesichtsschmerz aller 3 Stunden zu 8—15 Tropfen.

Tott.

Styrax liquida. Flüssiger Storax.

(*Liquidambar liquida*, *Ambra liquida*. Von
Styrax officinalis L. *Liquidambar*
styraciflua L.)

Form u. Gabe. Selten innerlich, in Pillen, Bissen, Emulsion, zu ʒß — j und mehr, einigemal täglich. Aeusserlich, Salbe, Zahntinktur, Räucherspecies.

3476. R̄. Styrac. liquid. purif. ʒj
 Pulv. rad. liquirit. q. s.
 F. boli gr. vj — viij. Consp. cinnamom.

S. Früh und Abends 3 Stück und nach und nach bis 6 zu steigen.

3477. R̄. Styrac. liquid. purif. ʒß
 Aquae destill. ʒß
 Sacchari albi ʒj.
 F. syrupus.

S. Täglich 6mal einen Esslöffel.

Anwend. Gegen weissen Fluss, Tripper.

L' Heretier.

3478. R̄. Colophonii gr. xvj
 Elemi
 Cerae flavae āā ʒj.
 Liquatis admisce
 Styrac. liquid. ʒj

Olei olivar. $\overline{3}\beta$.

Styrace soluto ungt. cola. Refriger.

S. *Storaxsalbe*.

Unguentum de Styrace.

Anwend. Gegen feuchten und trocknen Brand, hartnäckige, phagedänische, krebsige Geschwüre.

Succinum. Bernstein.

(*Electrum. Ambra flava, Carabe; Agtstein.*)

Form u. Gabe. Räucherung. — Tinktur, zu 20—60 Tropfen, 2—3mal.

3479. Rx. Succini
Mastiches $\overline{a}\overline{a}$ $\overline{3}ij$.
M. f. pulv. rudior.

S. Einen halben Kaffeelöffel voll auf Kohlen zu streuen und den Dampf in schafwollenem Zeuge aufzufangen.

Anwend. Bei Gicht und Rheumatismus lässt man die leidenden Theile in das mit Dampf erfüllte, noch warme Zeug einhüllen, bei grosser Reizlosigkeit derselben wohl auch damit reiben.

3480. Rx. Tinct. succini $\overline{3}\beta$
Laud. liquidi $\overline{3}\beta$
Liqu. cornu cervi succinati $\overline{3}j$.

M. S. Täglich 3mal 30 Tropfen in einem Löffel Krausemünzensyrup.

Anwend. Gegen hysterische Krampfbeshwerden.

Hartmann.

Sulphur. Schwefel.

A. Sulphur depuratum; gereinigter Schwefel.

(*Flores Sulphuris loti; Schwefelblumen.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Pillen, Lattwerge, Schüttelmixtur, Plätzchen, zu gr. v—xv, 2—3mal täglich. Aeusserlich in Salben, Linimenten, Waschwässern, Schwefel-Räucherungen.

3481. R_x. Sulphur. depur. $\bar{3}\beta$
Tartari depur. $\bar{3}j$
Elaeosacch. citri $\bar{3}vj$.
M. f. pulv. D. in vitro.

S. Täglich 2—3mal einen Theelöffel voll.

Anwend. Bei Verstopfung von Plethora im Unterleibe, zurück bleibendem Hämorrhoidalfluss.

3482. R_x. Sulphur. depur. $\bar{3}ij$
Tartari depur. $\bar{3}vj$
Pulv. semin. foeniculi $\bar{3}j$
Sacchari albi $\bar{3}\beta$.
M. f. pulvis.

S. Täglich einigemal einen Theelöffel voll.

Anwend. In gleichen Fällen.

3483. R_x. Sulphur depur.
Pulv. rad. calami aromat.

Sacchari albi āā ʒj.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.

S. Abends ein Pulver.

Anwend. Gegen Speichelfluss von Quecksilber. Nebst salpetersaurem Getränk den Tag über.

Wedekind.

3484. *Rx.* Sulphur. depur. loti
Hydrargyr. stibiato-sulphur.
Resin. guajaci āā ʒij
Magnes. carbon. ʒij
Elaeosacch. menth. crisp. ʒij.
M. f. pulvis.

S. Täglich 3mal einen Theelöffel voll.

Anwend. Gegen chronisch-rheumatische Beschwerden.

Vogt.

3485. *Rx.* Camphorae tritae gr. xvj
Sulphur. depur. ʒß
Elaeosacch. anisi ʒij.
M. f. pulv. Div. in viij part. aequal. D. in charta cerata.

S. Täglich 3mal ein Pulver.

Anwend. Bei Hämorrhoidalleiden mit Gefässatonie.

Vogel.

3486. *Rx.* Sulphur. depur. loti gr. viij—xviij
Sacchari lactis ʒj
Rad. irid. florent. gr. j—iij.
M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. Aller 2 Stunden ein Stück in Milch zu geben.

Anwend. Gegen die meisten täglich vorkommenden Brustleiden kleiner Kinder von 3 Wochen bis 1 Jahr. Man kann,

wo die Auflösung des Brustschleims sehr nöthig, zur Gesammtmenge gr. β — $j\beta$ Ipecacuanhae, oder bei krampfhafter Affektion gr. j — ij Bisam setzen.

Kopp.

3487. *Ry.* Sulphur. depur. gr. ix—xx
Mucilag. gummi mimos. rec. par. 3vij
Sacchari albi $\text{3}\beta$
Aquaе rosar. 3j .

M. S. Umgeschüttelt, alle Stunden einen Theelöffel voll.

Anwend. In gleichen Fällen.

Kopp.

3488. *Ry.* Sulphur. depur. 3ij—v
Succi liquirit.
Sacchari lactis
Rad. liquirit. $\text{aa } \text{3iij}$
„ irid. florent. 3j .
M. f. pulvis.

S. Aller 2 Stunden einen Kaffeelöffel voll.

Anwend. Gegen hartnäckige Katarrhe, Stockschnupfen, asthmatische Zufälle, selbst bei hämorrhoidalischem Bluthusten und im Anfange der Lungensucht. Nur darf kein entzündlicher Zustand vorhanden sein.

Kopp.

3489. *Ry.* Flor. sulphur. $\text{3iij}\beta$
Succi liquirit. 3iv
Sacchari albi 3ij .
M. f. trochisci LXX

S. Aller 2 Stunden 2—4 Stück.

Anwend. In gleichen Fällen.

Kopp.

3490. *Ry.* Acidi benzoici $\mathfrak{z}$ j
 Sulphur. depur. $\mathfrak{z}\beta$
 Rad. liquirit.
 „ irid. flor. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}$ ij
 Sacchari albi $\mathfrak{z}$ ij
 Olei anisi
 „ foeniculi $\overline{\text{aa}}$ gutt. x.
 M. f. pulv. D. in vitro.

S. Täglich 2—4mal einen Theelöffel voll.

Pulvis pectoralis Wedelii.

Anwend. Bei chronischen Brustaffektionen.

Wedel.

3491. *Ry.* Sulphur. depur. gr. xv
 Camphor. cum paux. olei oliv. trit. $\mathfrak{z}\beta$
 Unguent. rosati $\mathfrak{z}\beta$
 Olei rosar. gutt. j—ij.
 M. exactiss.; f. unguent. D. in pixid. alb.

S. Augensalbe.

Anwend. Gegen Psorophthalmie, Augenliderflechten, Augenliderkupfer.

Allen.

3492. *Ry.* Sulphur. depur. $\mathfrak{z}$ j
 Pulv. rad. hellebor. albi $\mathfrak{z}$ j
 Nitri depur. $\mathfrak{z}\beta$
 Sapon. mollis
 Adipis suilli $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\beta$.
 M. f. unguentum.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Krätze.

Den ganzen Körper, besonders die vom Ausschlage befallenen Stellen mit $\mathfrak{z}$ iv einzureiben, dann in eine wollene Decke zu hüllen und mit ihr in's Bett sich zu legen, 36 Stunden im Schweisse zu verharren, dann mit brauner Seife zu waschen, worauf die Kur in vielen Fällen beendet ist.

3493. Rx. Sulphur. depur.
 Zinci sulphurici $\overline{aa}$ $\overline{3j}$
 Axung. porci $\overline{3iij}$
 (Olei lauri q. s.).
 M. f. unguentum.

S. Täglich 2mal so viel eine Wallnuss beträgt in die Handfläche und Fusssohlen einzureiben.

Unguentum ad scabiem Jasseri.

Anwend. Gegen Krätze.

3494. Rx. Kali carbonici crudi $\overline{3j-ij}$
 Sulphur. depur. $\overline{3ij}$
 Axung. porci $\overline{3iv}$.
 M. exacte; f. unguentum.

S. Täglich 3—4 Drachmen einzureiben.

Oder:

3495. Rx. Axung. porci part. xvj
 Sulphur. depur. part. iv
 Acid. sulphur. part. j.
 M. exacte; f. unguentum.

S. Täglich 3—4 Drachmen einzureiben.

Unguentum ad scabiem Aliberti.

Anwend. Gegen Krätze.

3496. Rx. Sulphur. depur. $\overline{3ij}$
 Ammon. muriat. $\overline{3ij}$
 Axung. porci q. s.
 F. unguent., cui adde
 Essent. cass. cinnamom. gutt. xxx.
 M. f. unguentum.

S. In 5 Tagen zu verbrauchen.

Unguentum ad scabiem Pringlii.

Anwend. Gegen Krätze.

Pringle liess den einen Tag ein Bein, den andern einen Arm und so fort alle befallene Theile nach einander einreiben, bis alle an die Reihe gekommen waren.

3497. Rx. Sulphur. depur. part. j
 Sapon. nigri part. ij.
 Aquae fervid q. s. ad consist. unguenti tenuioris.

S. Salbe.

Anwend. Gegen Krätze.

Der Kranke reibt sich den ganzen Körper, besonders aber die vom Ausschlage befallenen Theile, mit Ausnahme des Gesichtes und der Geschlechtstheile, täglich 3mal mit der Salbe ein und nimmt dabei täglich 3mal einen Theelöffel von einem Pulver aus 1 Theile Conch. praep. und 3 Theilen Schwefelblumen. Ausserdem wöchentlich 2mal ein Abführmittel aus Glaubersalz, und 3mal wöchentlich ein laues Bad, worin er sich mit schwarzer Seife wäscht. — In einzelnen Fällen, wo das Uebel hartnäckig und rein örtlich geworden zu sein scheint, nur noch die Hände einnimmt, wird eine Salbe aus einem durch essigsaures Blei erhaltenen Niederschlage einer starken Eichenrindenabkochung, die weisse Quecksilberpräcipitatsalbe, eine Auflösung von Quecksilbersublimat (gr. xij auf ℥j Wasser) und das Betupfen der einzelnen Pusteln mit Höllenstein oder ätzendem Kali, abwechselnd in Gebrauch gezogen; oder man lässt auch ℥j—ij Chlorkalk in ℥j Brunnenwasser lösen und nach vorherigem Umschütteln 2—3mal damit waschen und den Kalk auf der Haut eintrocknen.

Horn.

3498. Rx. Sulphur. depur. ℥iij
 Ammon. muriat. crudi ℥ß
 Sapon. domest. nigri ℥viiij
 Aquae fontan. q. s.

F. unguentum.

S. Täglich einmal die ganze Oberfläche des Körpers einzureiben.

Unguentum ad scabiem Neumanni.

3499. Rx. Sulphur. depur.
 Sapon. domest. albi pulv. āā ℥ij

Adip. suilli $\bar{3}$ j.
M. f. unguent.

S. Salbe.

Anwend. Gegen Tinea.

Bielt.

3500. R $\bar{y}$. Sulphur. depur. subtiliss. pulv. $\bar{3}$ ij
Camphor. rasae $\bar{3}$ j
Aquae rosarum $\bar{3}$ vij.

M. S. Umgeschüttelt, bei Tage als Waschmittel zu gebrauchen, die Nacht mit Kompressen auf die Augenlider zu legen.

Anwend. Gegen Augenlidränden überhaupt und gegen Augenlidkrätze, so wie Augenkupfer insbesondere.

Fangen die Lider an zu spannen, röthen sie sich mehr, dann setzt man einige Zeit mit diesem Mittel aus.

v. Gröfe.

3501. R $\bar{y}$. Camphorae tritae gr. xv
Sulphur. depur. $\bar{3}$ j
Aquae calcariae $\bar{3}$ vj.

M. S. Abends ein Läppchen mit der umgeschüttelten Masse anzufeuchten und die Hautstelle damit zu betupfen; des Morgens diese mit einem trockenen, nur angehauchten, leinenen Tuche wieder abzureiben.

Anwend. Gegen Gesichtsflechte und Kupferhandel

B. Sulphur iodatum; Jodschwefel.

(*Ioduretum Sulphuris; Schwefeljodüre.*)

Form u. Gabe. Nur äusserlich, gr. x—xxx auf $\mathfrak{z}\text{j}$.

3502. R_x. Sulphur. iodati $\mathfrak{z}\text{j}$ — $\mathfrak{3}\beta$
 Axungiae porci $\mathfrak{3}\text{j}$.
 M. f. unguent.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen skrofulöse und namentlich tuberkulöse Hautleiden, bei Acne, Prurigo, schuppigen Hautleiden. Man lässt ohngefähr $\mathfrak{z}\text{j}$ Salbe auf einmal einreiben.

Biett.

3503. R_x. Sulphur. iodati gr. iij
 Axungiae $\mathfrak{3}\text{j}$.
 M. f. unguent.

S. Den 3. Theil auf einmal einzureiben.

Anwend. Bei Sycosis, Lupus, Psoriasis u. s. w.

Bayer.

C. Sulphur praecipitatum; niederschlagener Schwefel.

(*Lac Sulphuris; Schwefelmilch.*)

Form u. Gabe. Wie beim gereinigten Schwefel.

3504. R_x. Sulphur. praecip. $\mathfrak{3}\text{j}$ — $\text{j}\beta$
 Magnes. carbon. $\mathfrak{3}\text{ij}$

Elaeosach. menth. crisp. 3iij.

M. f. pulvis.

S. Täglich 3mal 1/2—1 Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Als auflösendes Mittel, besonders bei Hämorrhoidalleiden.

Berends.

3505. *Ry.* Sulphur. praecip.

Myrrhae elect.

Extr. hyoscyami

Magnes. carbon.

Gummi mimos.

Sacchari rosati āā gr. v.

M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.

S. Aller 2 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Gegen chronische Brustaffektionen, besonders wenn sie von Hämorrhoiden abhängen.

Marcus.

3506. *Ry.* Sulphur. praecip.

Kali nitrici

Tart. depur. āā 3ij.

M. f. pulvis.

S. Täglich 3mal 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Für Hämorrhoidarii.

3507. *Ry.* Sulphur. praecip. 3ß

Magnes. carbon. ʒj

Semin. foeniculi ʒß

Sacchari lactis 3jß.

M. f. pulvis.

S. Täglich 4mal 1 Messerspitze voll zu nehmen.

Anwend. Bei Crusta lactea.

Haase.

3508. *Ry.* Sulphur. praecip. $\mathfrak{Z}\text{ij}$
 Cort. aurant. condit. $\mathfrak{Z}\beta$
 Pulp. tamarind. $\mathfrak{Z}\text{ij}$
 Sacchari albi $\mathfrak{Z}\text{j}$.
M. f. electuar.

S. Täglich 3mal 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei Unterleibsstockungen, Hämorrhoidalübeln u. s. w.

Berends.

3509. *Ry.* Sulphur. praecip. $\mathfrak{Z}\text{ij}$
 Tinct. opii simpl. gutt. xx
 Aquae destill. commun. $\mathfrak{Z}\text{iv}$.

M. S. Wohlumgeschüttelt, täglich 3mal 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Quecksilberkrankheit oder Verbindungen von Quecksilberkrankheit und Syphilis.

Dabei badet der Kranke, um den Schweiss abzuwarten, des Abends mit $\mathfrak{Z}\text{j}$ Schwefelleber. Diese Kur muss 4 Wochen fortgesetzt werden. Wo viel Quecksilber in kurzer Zeit genommen worden ist, empfiehlt Dzondi diese Methode als Vorbereitung zu seiner Quecksilberkur.

Dzondi.

3510. *Ry.* Sulphur. praecip. $\mathfrak{Z}\text{j}$
 Aquae rosar. $\mathfrak{Z}\text{iv}$
 Tinct. benzoes $\mathfrak{Z}\text{j}$.

M. S. Waschmittel.

Anwend. Gegen Augenlidflechten und Augenlidkupfer. Auch als Schönheitsmittel zur Verfeinerung der Haut; gegen Sommersprossen.

v. Gräfe.

3511. *Rx.* Sulphur. praecip.
 Hydrargyr. ammoniato-muriat. $\bar{a}\bar{a}$ 3j
 Axung. porci $\bar{z}$ ij.
 M. f. unguent.

S. Auf den Wirbel des Kopfes einzureiben.

Anwend. Gegen skrofulöse Angenentzündung der Kinder.

Rowley.

T.

Tamarindorum pulpa cruda et depurata. Rohes und gereinigtes Tamarindenmark oder Muss.

*(Ersteres fälschlich Fructus Tamar. genannt.
Von Tamarindus indica L.)*

Form u. Gabe. In Mixturen, Lattwergen, Molken, Abkochungen, zu $\mathfrak{z}$ ij—iv—viij. Aeusserlich zu Klystieren.

3512. $\mathcal{R}_x$. Infus. fol. sennae ($\mathfrak{z}$ ij—iij) $\mathfrak{z}$ vj
Pulp. tamarind. dep. $\mathfrak{z}$ j.

S. S. Aller 2 Stunden 2 Esslöffel.

Anwend. Als kühlende Abführung.

3513. $\mathcal{R}_x$. Pulp. tamarind. dep. $\mathfrak{z}\beta$
Pastae althaeae pulv. $\mathfrak{z}$ ij.

Digere cum

Aquae fervid. $\mathfrak{z}$ ij.

S. Als gewöhnliches Getränk.

Anwend. In Gallenfiebern

3514. *Ry.* Pulp. Tamarind. dep. $\bar{\text{z}}\text{ij}$
Mannae elect. $\bar{\text{z}}\text{j}$.

Solve in
Aquae flor. chamomill. $\bar{\text{z}}\text{ix}$.

M. S. Umgeschüttelt, tassenweise.

Anwend. Als Abführtrank.

Selle.

3515. *Ry.* Pulp. tamarind. dep. $\bar{\text{z}}\text{j} - \text{ij}$.

Coque ex

Aquae font. q. s. per $\frac{1}{2}$ hor. ad colat. $\bar{\text{z}}\text{vj}$
Syrupi mannati $\bar{\text{z}}\text{j}$.

M. S. Alle Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Als Abführung in entzündlichen Blattern.

Wendt.

3516. *Ry.* Pulp. tamarind. dep. $\bar{\text{z}}\text{ij}\beta$

Tart. depur. $\bar{\text{z}}\text{j}\beta$

Syrup. rubi idaei q. s.

F. electuar. molle.

S. Umgerührt früh und Abends 2 Kaffeelöffel
voll zu nehmen.

Electuarium antiphlogisticum Wendtii.

Anwend. Als gelindes Eröffnungsmittel in entzündlichen Krank-
heiten.

Wendt.

3517. *Ry.* Pulp. tamarind. dep. $\bar{\text{z}}\text{ij}$

Tartari depur. $\bar{\text{z}}\text{ij}$

Syrup. mannae $\bar{\text{z}}\text{vj}$.

M. f. electuar.

S. Umgerührt, stündlich 1 Theelöffel voll.

Anwend. Als Purgans.

Quarin.

3518. *Ry.* Tamarindor. dep. pulp. $\bar{3}$ ij.
 Coque cum
 Aquae font. $\bar{3}$ x ad reman. colat. $\bar{3}$ vj
 Natri sulphurici $\bar{3}\beta$
 Mannae electae $\bar{3}$ j.

M. S. Alle halbe Stunden eine Tasse voll zu nehmen.

Anwend. Als Abführmittel.

3519. *Ry.* Pulp. tamarind. $\bar{3}$ j β .
 Solve in
 Infusi flor. chamomill. ($\bar{3}\beta$) $\bar{3}$ v
 Olei lini $\bar{3}$ ij.

M. S. Umgeschüttelt, zum Klystier.

Berends.

Tanacetum. Rainfarn, Wurmfarn.

(Von Tanacetum vulgare L.)

A. Tanaceti herba; Rainfarnkraut.

Form u. Gabe. Bisweilen im Aufguss mit Wasser, Milch oder Wein, zu $\bar{3}\beta$ auf $\bar{3}$ viiij; öfter zu Klystieren.
 — *Extrakt in Pillen, Lösung,* zu $\mathfrak{D}\beta$ — j, 2—3mal.

3520. *Ry.* Extr. tanaceti
 „ quassiae $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ij
 Olei tanaceti gutt. x.
M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Früh und Abends 10 Pillen.

Anwend. Gegen Askariden mehrere Monate fortgesetzt.

Hufeland.

3521. *Ry.* Extr. tanaceti
 „ valerianae āā 3j
 Aquae flor. chamomill.
 Tinct. rhei aquos. āā 3iij.
M. S. Aller 2 Stunden 2 Esslöffel.
Anwend. Gegen Wurmsucht.

v. Hildenbrand.

B. Tanaceti flores; Rainfarnblumen.

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Latt-
 werge, zu ʒß—j, 3—4mal; im Aufguss mit Wasser,
 Milch, Wein, 3vj—xij auf 3vj—viij, esslöffelweise, 4—
 6mal. Klystier, 3ß—j auf 3iv—vj. — Aether. Oel, zu 2—
 4 Tropfen, einigemal; äusserlich zu Einreibungen und
 Salben.

3522. *Ry.* Flor. tanaceti
 Herb. absinthii āā 3ij.
 Infunde
 Aquae fervid. q. s. ad colat. 3vj
 Extr. valerianae 3j
 Tinct. cort. aurant. 3ß
 Syrupi cort. aurant. 3vj.
M. S. Umgeschüttelt, aller 2 Stunden 1 Esslöffel
 voll zu nehmen.
Anwend. Gegen Wurmsucht mit Atonie der ersten Wege und
 Krampfszufällen.

Sobernheim.

3523. *Ry.* Flor. tanaceti
 Semin. cinae āā 3j
 Ferri sulphurici cryst. ʒij
 Olei valerianae gutt. x.
M. f. pulv. Div. in x part. aequal. D. in charta
 cerata.
S. Früh und Abends 1 Pul r.
Anwend. Gegen Würmer.

Rosenstein.

3524. Rx. Flor. tanaceti
Rad. valerian. offic.
Semin. cinae āā 3ij.
Conc. M. f. species. Div. in vj part. aequal.

S. Morgens und Abends eine Portion mit 2 Wein-gläsern heissen Wassers aufgegossen zu einem Klystier.

Anwend. Gegen Askariden und Spulwürmer für ein Kind von 10 Jahren.

Vogt.

3525. Rx. Extr. nuc. jugland. 3ij
Olei tanaceti ʒj
Pulv. rad. althaeae q. s.
M. f. pil. lx. Consp. lycop.

S. Aller 2 Stunden 3—5 Stück.

Anwend. Gegen Wurmleiden.

Schubarth.

C. Tanaceti semina; Rainfarrensamen.

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, zu ʒj—ij, 3—4mal. Klystier, Salbe.

3526. Rx. Semin. tanaceti gr. vj
Sulphur. ferri fact. gr. iij
Rad. jalapae 3ß.
M. f. pulv.

D. S. Früh nüchtern auf einmal.

Anwend. Um das Dasein der Würmer zu entdecken.

Wendt.

3527. Rx. Fell. tauri inspiss.
Extr. nuc. jugland. āā ʒiv

Adipis suilli $\bar{3}$ j.
 Leni calore mixtis et refriger. adde
 Olei tanaceti $\bar{2}$ j.
 M. f. unguent.

S. In den Unterleib einzureiben.

Unguentum anthelminthicum.

Anwend. Bei wurmkranken Kindern.

Dörffurt.

Tanninum. Gerbstoff.

(*Acidum tannicum; Tannin, Gerbsäure.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Lösung, zu gr. $\frac{1}{4}$ —ij, 4—6mal täglich. Aeusserlich zu Augenwässern, Einspritzungen und Salben.

Man vermeide Mineralsäuren, Weinsteinsäure, concentrirte Essigsäure, Salzbilder, Basen, fast alle Salze, Eiweissstoff, Kleber, Stärkmehl, thierische Gallerte.

3528. *Ry.* Tannini puri $\bar{3}$ ß
 Conserv. rosarum q. s.
 F. pil. xvij. Consp. lycop.

S. Alle Stunden 1 Pille zu nehmen.

Anwend. Bei Blutspeien, Mutterblutflüssen und chronischen Schleimflüssen.

Cottureau.

3529. *Ry.* Tannini puri $\bar{2}$ ij
 Vini aromatici $\bar{3}$ vij.

M. S. Zum Verbande.

Vinum aromaticum cum Tannino.

Anwend. Zum Verbande der Chanker und Geschwüre.

Ricord.

3530. *Ry.* Tannini puri gr. xvij.
Solve in
Vini generosi $\bar{3}$ vj.

M. S. Zu Injektionen.

Anwend. Bei veralteten Blennorrhöen der Harnröhre — Bei Injektionen in die Scheide soll die Menge des Gerbstoffs auf das Doppelte erhöht und stufenweise gesteigert werden.

Ricord.

Taraxacum. Löwenzahn.

(*Hundebblume, Butterblume, Pfaffenröhrlein.*
Von Leontodon Taraxacum L.)

Kraut und Wurzel.

Form u. Gabe. Frisch ausgepresster Saft zu $\bar{3}$ ij — iv, täglich. — Extrakt zu $\bar{3}$ j — vj; flüssiges Extrakt (*Mellago Tarax.*) zu $\bar{3}$ j — ij, 4—6mal. — Wurzel zur Abkochung, $\bar{3}\beta$ — j auf $\bar{8}$ j Wasser, täglich. Klystier $\bar{3}$ j — ij.

Man vermeide Salzbilder, Metallsalze.

3531. *Ry.* Herb. et radic. taraxaci $\bar{3}$ j
„ trifol. fibrini
Summitat. millefol. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$
Radic. calami aromat. $\bar{3}$ ij.
Conc. M. f. Species.

S. Einen gehäuften Esslöffel voll mit einem halben Quart Wasser auf 3 Tassen einzukochen und täglich zu verbrauchen.

Anwend. Als Solvens.

Berends.

3532. *Ry.* Animae rhei
Liqu. kali acetici
Extr. taraxaci
Mellis puri āā 3j.

M. S. Täglich 4 — 5 mal einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. In nicht zu alter Gelbsucht.

Fr. Jahn.

3533. *Ry.* Kali tartarici 3iij
Aquae sambuci 3vj
Extr. taraxaci liquid.
„ gramin. liquid. āā 3ß
Oxymell. simpl. 3j.

M. S. Umgeschüttelt, aller 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Unterleibsstockungen, Leberleiden, Hämorrhoidalübel.

S. G. Vogel.

3534. *Ry.* Extr. taraxaci liquid. 3ij
Aquae menthae piper. 3vj
Mellis despumati 3j.

M. S. Umgeschüttelt, aller 3 Stunden 2 Esslöffel.

G. A. Richter.

3535. *Ry.* Extr. taraxaci
Gummi ammoniac. depur. āā 3iij
Sapon. medicat. pulv. 3ij
Extr. chelidonii 3j.

M. f. pil. gr. ij. Consp. rad. rhei.

S. Täglich 3mal 10—20 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei Leber-Anschwellungen und Verhärtungen, Gelbsucht u. s. w.

Richter.

3536. Ry. Extr. taraxaci 3ij
 „ trifol. fibrini
 „ valerian. min. āā 3j
 Sapon. medicat. pulv. 3ß
 Radic. rhei pulv. 3jß
 Syrup. simpl. q. s.
 F. pil. gr. ij. Consp. pulv. rad. irid. flor.
 S. *Täglich 3mal 10 Stück.*

Anwend. Bei Stockungen in den Unterleibsorganen, Anomalien im Gallengeschäft, zähen Mukositäten, torpiden Pfortaderstasen.

S. G. Vogel.

3537. Ry. Radic. taraxaci
 „ saponariae
 „ valerianae min.
 „ graminis
 Herb. marrub. albi
 Flor. chamomill. vulg.
 Farinae tritic. āā 3j.
 Conc. M. f. species.

S. *Zu Klystieren.*

Species pro clysmate viscerali Kaempfii.

3538. Ry. Furfur. tritic. 3j
 Taraxaci totius 3iij.
 Coque ex
 Aquae 3xvj ad col. 3viiij.
 Sub finem coct. adde
 Flor. chamomill.
 Rad. valerian. min. āā 3ij.

Col. S. *Zu 2 Klystieren.*

Anwend. Bei Unterleibsstockungen.

Berend's Vereinfachung der Kaempf'schen Visceral-klystiere.

Berends.

Taxi baccatae folia. Eibenbaumblätter.*(Von Taxus baccata L.)*

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, zu gr. j—x. —
Extrakt, in Pillen, Bissen, Lösung, zu gr. j—viij, 2—
4 mal.

3539. *Ry.* Fol. taxi baccat.
Ferri carbon. āā 3j
Secal. cornuti 3ij
Fol. digital. purp. 3β
Syrup. cort. aurant. q. s.
F. pil. ccl. Consp. lycop.

S. Täglich 2mal 8 Stück mit Sabinathee.

Anwend. Gegen jede Bleichsucht, bei welcher noch keine
Wassersucht und kein hektisches Fieber zugegen ist.

C. G. Neumann.

3540. *Ry.* Extr. taxi baccat. ʒj
Aquae cort. aurant. 3vj.

S. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Amenorrhöe.

Murray.

Tormentillae radix. Tormentillwurzel.

(Ruhr-, Blutwurzel. Von *Tormentilla erecta* L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Lattwerge, zu $\mathfrak{J}\beta$ — $\mathfrak{j}$, mehrmals; häufiger in Abkochung, zu $\mathfrak{3ij}$ — $\mathfrak{vj}$ auf $\mathfrak{3vj}$ — $\mathfrak{viij}$, esslöffelweise. Aeusserlich zu Mund-, Gurgelwässern, Einspritzungen, Waschungen, Umschlägen. — Extrakt zu gr. v — x.

3541. Ry. Radic. tormentill. $\mathfrak{3}\beta$.

Coque ex

Aquae font. $\mathfrak{3x}$ ad col. $\mathfrak{3vj}$

Tinct. cinnamomi $\mathfrak{3ij}$

Syrup. cort. aurant. $\mathfrak{3j}$.

M. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Gegen atonische Blutungen.

Berends.

3542. Ry. Aluminis $\mathfrak{Jj}$

Pulv. radic. tormentill. $\mathfrak{3ij}$

„ „ zingiberis

Sacchari albi $\mathfrak{aa}$ $\mathfrak{3j}$.

M. f. pulvis.

S. Aller 3 Stunden eine Messerspitze voll zu nehmen.

Anwend. In ähnlichen Fällen.

Schubarth.

3543. *Ry.* Radic. tormentill. $\bar{3}j$.

Coque ex

Aquae font. $\mathcal{E}j$ ad colat. $\bar{3}viij$

Aluminis $\bar{3}j$

Mellis $\bar{3}j$.

S. Alle Stunden lauwarm zum Gurgeln.

Anwend. Bei Verlängerung und chronischer Entzündung des Zäpfchens.

J. A. Schmidt.

3544. *Ry.* Radic. tormentill. $\bar{3}vj$.

Coque ex

Aquae font., $\bar{3}xij$ ad colat. $\bar{3}vj$

Aceti crudi $\bar{3}ij$.

M. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Gegen Blutflüsse.

Radius.

545. *Ry.* Radic. tormentill. $\bar{3}\beta$.

Coque cum

Aquae comm. q. s. per $\frac{1}{2}$ hor.

Colat. $\mathcal{E}j$ adde

Gummi arabici $\bar{3}\beta$

Camphorae gr viij.

M. S. Ein Drittheil davon als Klystier zu brauchen.

Anwend. In der Dysenterie, wenn kein entzündlicher Zustand mehr zu fürchten ist, die Stuhlentleerungen fortdauern und der Puls und die Kräfte immer schwächer werden.

Quarin.

546. *Ry.* Radic. tormentill.

Cort. ulmi $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$.

Coque cum

Vini rubri q. s. et sub finem coct. adde

Herb. cicutae $\bar{3}j$.

Stent in infusione fervida per $\frac{1}{4}$ hor.

Colat. ℞j adde

Sacch. saturni ℥jß

Spiritus formicar. ℥iv.

M. S. Die kranken Theile damit täglich mehrmals zu waschen und damit angefeuchtete Longuetten aufzubinden.

Anwend. Gegen Varices an den Füßen schwangerer, oder durch mehrere Wochenbetten geschwächter Personen.

Dürr.

3547. *Ry.* Pulv. rad. tormentill. ℥ij.

S. Zum äussern Gebrauch.

Anwend. Mit soviel Essig als nöthig zu einem Teig gemacht und auf die Stirn gelegt gegen starkes Nasenbluten.

Radius.

Trifolium fibrinum s. aquaticum. Fieberklee.

(*Bitterklee, Wasserklee. Von Menyanthes trifoliata L.*)

Form u. Gabe. Frisch ausgepresster Saft, zu ℥ß—ij, täglich; in Pulver, Lattwerge, zu ℥j—ij, einigemal; im Aufguss oder Abkochung, zu ℥iv—vj auf ℥v—viij, esslöffelweise. — Extrakt, in Pillen, Lösung, zu gr. v—xx, 2—4mal. — Aeusserlich zu Visceralklystieren, als Waschwasser.

3548. *Ry.* Herb. trifol. fibrin.

Flor. et herb. millefol.

Herb. cantaur. min.

Herb. menth. piper.

Semin. foeniculi āā 3j.

C. C. M. f. species.

S. *Täglich den 8. Theil mit 4 Tassen kochenden Wassers angebrüht; tassenweise zu nehmen.*

Species amarae Ph. paup. Berol.

Anwend. Bei Schwäche der Verdauung.

3549. R_x. Extr. trifol. fibrin.
Spirit. muriatico-aether. āā 3ß
Aceti scillitici 3vj.

S. S. *Täglich 3mal 60 Tropfen.*

Anwend. Als Diureticum.

Tode.

3550. R_x. Sapon. medicati 3ß
Extr. trifol. fibrin.
„ valerian. āā 3ij
Pulv. radic. rhei 3jß
Syrup. simplic. q. s.
F. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. *Täglich 3mal 10 Stück.*

Anwend. Gegen torpiden, verschleimten Zustand der Gedärme, träge Gallenabsonderung.

Vogel.

U.

Ulmi cortex interior. Ulmenrinde.

(Rüsterrinde. Von Ulmus campestris L.)

Form u. Gabe. In Abkochung zu $\mathfrak{Zj}$ — $\mathfrak{ij}$ auf $\mathfrak{Zviij}$ Wasser. — Aeusserlich abgekocht, zu Waschungen, Einspritzungen, Mund- und Gurgelwässern, Umschlägen, Bädern. — Salbe.

3551. Ry. Cort. ulmi inter. $\mathfrak{Zij}$.

Coque leni calore cum

Aquae font. $\mathfrak{Lij}$ ad reman. colat. $\mathfrak{Lj}\beta$.

S. Den Tag über tassenweise zu verbrauchen.

Anwend. Bei chronischen Hautkrankheiten.

3552. Ry. Decoct. cort. ulmi fort. $\mathfrak{Zvj}$

Aceti plumbi $\mathfrak{Zj}$.

M. S. Zum Verbande.

Anwend. Gegen übermässige Eiterung nach Verbrennung.

Urtica. Brennnessel.*(Von Urtica dioica et urens L.)*

Form u. Gabe. Die Blüthentrauben von *Urtica dioica* unter dem Namen Samen, im Aufguss zu $\overline{3}\beta - j$ auf $\mathfrak{8}j$ Wasser, tassenweise; in Pulver, Lattwerge, zu $\overline{3}\beta - ij$, 2—4 mal. — Das Kraut der kleinen Brennnessel, *Urtica urens*, zur Urtikation.

3553. Rx. Racemi urticae dioicae $\overline{3}\beta$.

Infunde cum

Aquae font. mens. β .

Digere per $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$ horam.

S. Aller 2 Stunden eine Tasse warm zu trinken.

Anwend. Gegen ruhrartige Diarrhöe und Ruhr.

Faber.

Uvae ursi folia. Bärentraubenblätter.*(Von Arbutus Uva Ursi L.)*

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Lattwerge, zu $\mathfrak{3}j - ij$, einigemal täglich; in Abkochung, zu $\overline{3}\beta - j$ auf $\overline{3}viij$ Wasser, täglich. Aeusserlich zu Fomentationen, Einspritzungen.

3554. Rx. Pulv. folior. uvae ursi

Elaeosacch. menth. piper. $\overline{a}\overline{a}$ $\overline{3}ij$.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Täglich 4 mal ein Pulver.

Anwend. Als Diureticum.

3555. *Ry.* Fol. uvae ursi $\bar{3}j$.

Coque ex

Aquae font. $\bar{3}xij$ ad rem. col. $\bar{3}viii$.

S. Aller 2 Stunden $\frac{1}{2}$ —1 Tasse voll.

Anwend. Gegen Blasenkatarrh.

Andr. Haase.

3556. *Ry.* Semin. lycopod. $\bar{3}ij$

Vitell. ovi j .

Terendo adde

Decoct. fol. uvae ursi ($\bar{3}\beta$) $\bar{3}v$

Syrup. cort. aurant. $\bar{3}vj$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Schleimflüsse der Blase.

Fuchs.

3557. *Ry.* Fol. uvae ursi $\bar{3}j\beta$

Summitat. millefol. $\bar{3}j$.

Coque ex

Aquae font. $\&iiij$ ad $\&ij$.

Sub finem coct. adde

Rad. liquirit. $\bar{3}j$.

Colatur. admisce

Syrupi cinnamomi $\bar{3}ij$.

M. S. In 2 Tagen zu verbrauchen.

Anwend. Gegen asthenische Schleim- und Blutflüsse, besonders aus der Brust und den Harnwerkzeugen.

Sundelin.

3558. *Ry.* Fol. uvae ursi $\bar{3}\beta$.

Coque cum

Aquae commun. $\bar{3}xvj$ ad colat. $\bar{3}vij$

Tinct. catechu
Syrupi zingiberis āā 3β.

M. S. Umgeschüttelt, ⁷aller 2 Stunden 2 Esslöffel.

Anwend. Gegen Blennorrhoea urethrae secundaria.

Cooper.

V.

Valerianae officinalis radix.

Officinelle Baldrianwurzel.

(*Valerianae sylvestris s. minoris radix. Von
Valeriana officinalis L.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Trochisken, Lattwerge, Schütteltrank, zu $\mathfrak{3j}$ — $\mathfrak{ij}$, mehrmals täglich; im Aufguss zu $\mathfrak{3j}$ — $\mathfrak{ij}$ auf $\mathfrak{3iv}$ — $\mathfrak{vj}$ Wasser, esslöffelweise, 2 — 6mal täglich; zum Klystier, $\mathfrak{3ij}$ — $\mathfrak{vj}$ im Aufguss. — Extrakt zu gr. v — xx . — Weingeistige Tinktur zu 20 — 60 Tropfen. — Aetherische und ammoniumhaltige Tinktur zu 15 — 30 Tropfen, 2 — 3mal täglich.

Man vermeide Salzbilder, Basen, kohlensaure Salze, Chlorkalk, salzsauren Kalk und Baryt, Alaun, empfindliche Metallsalze.

3559. R_y. Pulv. radic. valerian. $\mathfrak{3j}$
„ cort. cinnamomi $\mathfrak{3j}$.
M. f. pulv.

S. Täglich 4mal 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen krampfhaftes, hysterische Beschwerden.

3560. *Ry.* Pulv. radic. valerian. $\bar{3}\beta$
 „ „ „ jalapae $\bar{3}ij$.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Morgens nüchtern 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. Gegen Würmer.

Störk.

3561. *Ry.* Pulv. radic. valerian. $\bar{3}\beta$

Folior. aurant. $\bar{3}j$

Olei cajeputi gutt. xxiv.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal. D. ad chartam ceratam.

S. Täglich 3mal 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. Gegen Epilepsie.

G. A. Richter.

3562. *Ry.* Ammon. carbon. pyro-oleosi

Castorei $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$

Rad. valerian. min. $\bar{3}\beta$.

M. f. pulv. Div. in xv part. aequal. D. in charta cerata

S. Täglich 3mal 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. Bei allgemein krampfhaft erhöhter Nervenempfindlichkeit.

Richter.

3563. *Ry.* Radic. valerian. offic. $\bar{3}j\beta$

Fol. virid. aurant. $\bar{3}\beta$

Ammon. muriat. $\bar{3}ij$

Magnes. carbon.

Olei cajeputi $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ij$.

Recenter pulv. M. et D. ad vitrum.

S. Täglich 3mal 2 gestrichene Theelöffel voll.

Ragolo's Geheimmittel gegen Epilepsie.

3564. *Ry.* Rad. valerian. offic. $\text{℥}\beta$
 Magnes. carbon.
 Ammon. muriat. dep. $\bar{a}\bar{a}$ gr. xxiv
 Olei cajeputi gutt. xxxij.
 M. f. pulv. D. in vitro.

S. Dreimal täglich 1 Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Epilepsie

Eine Nachahmung von Ragolo's Geheimmittel.

Berends.

3565. *Ry.* Rad. valerian.
 „ caryophyllatae
 Herb. menth. pip.
 Fol. aurant. $\bar{a}\bar{a}$ $\text{℥}\text{vj}$.

Conc. M. S. Auf 1—2 Esslöffel 2—3 Tassen kochendes Wasser gegossen, die Nacht hindurch zugedeckt stehen lassen, abgeseiht und früh und Abends die Hälfte kalt getrunken.

Species nervinae Hufelandi.

Anwend. Zur Stärkung und Regulirung des Nervensystems Monate lang als Thee getrunken. Bei langwierigen Nervenkrankheiten, Hysterie und Krämpfen aller Art.

Hufeland.

3566. *Ry.* Rad. valerian. $\text{℥}\text{ij}$
 Herb. menth. pip.
 „ chenopod. mexic. $\bar{a}\bar{a}$ $\text{℥}\text{j}$
 Zingiberis $\text{℥}\beta$.

C. M. S. Einen Esslöffel voll mit einigen Tassen kochenden Wassers zu brühen und täglich zu verbrauchen.

Anwend. Gegen Schwindel schwächerer Personen.

Fr. Jahn.

3567. *Rx.* Rad. valerian. offic.
 „ serpentar. $\overline{aa}$ $\overline{3ij}$
 Cort. peruv. reg. $\overline{3\beta}$.

Infunde

Aquae ferv. q. s. ad colat. $\overline{3vj}$
 Spirit. muriat.-aeth. $\overline{3j}$
 Syrup. cort. aurant. $\overline{3j}$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen asthenische Fieber.

Berends

3568. *Rx.* Rad. valerian. offic. $\overline{3\beta}$
 „ senegae $\overline{3ij}$.

Infunde

Aquae ferv. q. s. ad colat. $\overline{3vj}$
 Spirit. sulphur.-aether. $\overline{3j}$
 Syrup. cort. aurant. $\overline{3j}$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll.

Anwend. In asthenischen Fiebern.

Berends.

3569. *Rx.* Pulv. rad. valerian. sylv. $\overline{3vj}$
 „ „ serpentar. virg. $\overline{3ij}$
 „ „ scillae (fol. digital. purp. $\overline{3\beta}$).

Digere cum

Aquae ferv. q. s. per $\frac{1}{4}$ hor. Colat. $\overline{3vj}$ adde
 Spirit. Mindereri $\overline{3j}$
 „ nitrī dulcis $\overline{3ij}$
 Syrup. diacodii $\overline{3j}$.

M. S. Alle Stunden 1—2 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei eintretenden Symptomen der Wassersucht in der Abschuppungsperiode des asthenischen Scharlachs.

Hufeland.

3570. *Ry.* Rad. valerian. min. $\bar{3}j$
 Semin. cinae cont. $\bar{3}\beta$.
 Infunde cum
 Aquae bullient. q. s. ad colat. $\bar{3}vij$
 Extr. nuc. jugland. $\bar{3}ij$
 Tinct. valerian. aether. $\bar{3}j\beta$
 Succi dauci inspiss. $\bar{3}j$.

M. S. Umgeschüttelt, esslöffelweise.

Anwend. Gegen Wurmsucht.

Richter.

3571. *Ry.* Pulv. rad. valerian.
 „ „ jalapae
 Sal. polychresti (Tart. natronati) $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$
 Oxymell. scillit. $\bar{3}iv$.
 M. f. electuar. molle.
S. Erwachsenen esslöffel-, Kindern theelöffelweise,
 4—5mal.

Electuarium anthelminthicum Stoerkii.

Anwend. Gegen Spul- und Madenwürmer.

Störk.

3572. *Ry.* Pulv. valerian.
 „ folior. aurant. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$
 Syrup. absinthii q. s.
 F. electuar.
S. Täglich 2—4mal 1 Kaffeelöffel voll zu nehmen.
Anwend. Gegen krampfhaftige Zufälle.

Swediaur.

73. *Ry.* Asae foetidae
 Pulv. rad. valerian. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ij$
 Olei valerian. gutt. x

Extr. valerian. q. s.

F. pil. cxx. Consp. lycop. D. in lagen.

S. *Dreimal täglich 8—10 Stück.*

Anwend. Gegen Hysterie, Epilepsie und andere Krämpfe.

Schubarth.

3574. R_y. Pulv. rad. valerian. ʒβ

Castorei gr. iv

Zinci oxydati ʒj

Syrup. sacchari q. s.

ut f. pil. vj.

S. *Täglich zu verbrauchen.*

Anwend. Gegen epileptische Zufälle.

Hôtel-Dieu.

3575. R_y. Rad. valerian. offic. ʒβ—j.

Infunde

Aquae ferv. q. s. ad colat. ʒviii

Olei lini ʒβ—j.

M. S. *Klystier.*

Anwend. Gegen Krämpfe, manche Arten von Verstopfung.

3576. R_y. Flor. chamomill. ʒj

Rad. valerian.

Herb. menth. crisp. āā ʒβ.

Infunde cum

Aquae ferv. q. s. ad colat. ʒx

Olei lini ʒj.

M. S. *Zu 2 Klystieren.*

Anwend. Krampfstillend.

Berends.

3577. *Ry.* Tinct. valerian. aether. 3ij
Elixir. cort. aurant. 3ß.

M. S. Täglich 3mal 30—40 Tropfen auf Zucker zu nehmen.

Anwend. Gegen krankhafte Empfindlichkeit des Magens und dadurch bedingtes chronisches Erbrechen.

G. A. Richter.

3578. *Ry.* Tinct. valerian. aether.
,, castorei aether. āā 3j
,, opii simpl.
Camphorae āā 3ß.

M. S. 20—30 Tropfen auf einmal zu nehmen.

Anwend. Bei krampfhaften Zufällen.

Vogel.

3579. *Ry.* Tinct. valerian. ammoniat.
,, guajaci ammoniat. āā 3ij
Extr. aconiti 3ß.

S. S. Täglich 4mal 25—30 Tropfen.

Schubarth.

Vanilla. Vanille.

(Von *Vanilla aromatica* Schwtz.)

Form u. Gabe. In Pulver, Plätzchen, Pillen, zu gr. iv—x, mehrmals täglich; im Aufguss, zu 3ß—ij auf 3iij—iv, esslöffelweise, 4—6mal. — Tinktur zu 20—60 Tropfen, allein oder in Mixturen, mehrmals täglich.

3580. *Ry.* Rad. serpentar. virg. gross. pulv. 3vj
Vanillae gross. pulv. 3ij
Vini hispan. q. s.

Macera, saepe agitando, per iv horas.

Colat. & adde

Camphorae $\mathfrak{3}\beta$ in spirit. vini rectific. q. s. solut.

Aether. acetici $\mathfrak{3j}$

Syrup. cinnamomi $\mathfrak{3}\beta$.

M. D. S. Umgeschüttelt, alle $1\frac{1}{2}$ Stunden 2
Esslöffel voll.

Anwend. Sehr kräftig belebend bei Febris nervosa stupida
alter, an Reizmittel gewöhnter Individuen.

Vogt.

3581. Rx. Tinct. vanillae $\mathfrak{3j}$
„ aromatic. acid. $\mathfrak{3ij}$
Aquae cinnamomi vinos. $\mathfrak{3iv}$
Syrup. cinnamomi $\mathfrak{3j}$.

M. S. Alle $\frac{1}{2}$ —1 Stunde 1 Esslöffel voll.

Anwend. Bei typhöser Darmlähmung, septischem Meteoris-
mus, profusen Gebärmutterblutungen und Metritis septica.

Sobernheim.

3582. Rx. Tinct. vanillae $\mathfrak{3vj}$
„ ferri acetici aether. $\mathfrak{3ij}$.

M. S. Täglich 3 mal 20 Tropfen in Wein.

Anwend. Bei atonischen Menostasieen.

Marcus.

3583. Rx. Tinct. vanillae
„ ferri acetico-aether. $\overline{aa}$ $\mathfrak{3ij}$.

M. S. Täglich 4 mal 15—20—30 Tropfen und
mehr.

Tinctura contra Chlorosin.

Anwend. Gegen Bleichsucht, besonders wenn sie im Gefolge
melancholischer Gemüthsstimmung erscheint.

Günther.

Verbasci flores. Königskerzenblumen.

(Himmelbrandblumen, Wollkraut. Von *Verbascum Thapsus* L.)

Form u. Gabe. Gut durchzuseihender Aufguss zu 3j — ij auf 2 — 3 Tassen. Aeusserlich zu Visceralklystieren.

3584. Rx. Flor. verbasci
 „ sambuci
 Herb. tussilaginis
 Rad. liquiritiae
 „ althaeae āā 3β
 „ irid. florent.
 Semin. foeniculi āā 3iij.

C. C. M. S. Brustthee.

Species pectorales Hufelandi.

585. Rx. Flor. primulae veris
 „ „ auriculae
 „ verbasci
 „ meliloti āā 8β
 „ hyperici 3iv
 „ gnaphalii dioici 3x
 Folior. asperulae odorat. 8j
 Flor. arnic. mont. 3ij
 „ pruni mahaleb 3ij
 „ rosae rubiginosae 3j
 Fol. et flor. thymi alpini 8β
 „ „ „ serpylli 3iv.
 Conc. M. f. species.

S. Zum Thee.

Schweitzer Wundkräuter.

Anwend. Als Analepticum bei Krampfszufällen.

Hanin.

Veronicae herba. Ehrenpreiskraut.

(*Veronica officinalis* L.)

Form u. Gabe. Im Aufguss, $\mathfrak{Zij}$ —iv auf $\mathfrak{Ziv}$ —vj Wasser, esslöffelweise. Frisch ausgepresster Saft.

3586. R $\mathfrak{y}$. Herbae veronicae $\mathfrak{Zij}$
 Rad. caryophyllat. $\mathfrak{Zj}$
 „ liquirit. $\mathfrak{Z}\beta$
 Semin. foeniculi $\mathfrak{Ziij}$.
 Conc. cont. M. f. species.

S. Zwei Esslöffel voll mit $\frac{1}{2}$ Quart kochenden Wassers aufzugießen und tassenweise zu trinken.

Anwend. Bei chronischen Brustaffektionen, Schleimsschwindsucht.

Schubarth.

Viola tricolor L. Ackerveilchen.

(*Herba Jaceae*; Stiefmütterchen, Freisamkraut, Dreifaltigkeitsblume.)

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, zu $\mathfrak{Z}\beta$ —ij, täglich; im Aufguss, besser Abkochung mit Wasser oder Milch, zu $\mathfrak{Zj}$ —iij auf $\mathfrak{Zvj}$ —viij, esslöffelweise 2 stündlich. Aeusserlich zu Waschwässern, Umschlägen, Bädern, $\mathfrak{Z}\beta$ —j für ein Kind. — Salbe. — Extrakt, zu $\mathfrak{Z}\beta$ —j.

3587. R $\mathfrak{y}$. Herb. violae tricol. $\mathfrak{Ziij}$
 Semin. foenicul. $\mathfrak{Zj}$

Sacchari lactis 3ij.

M. f. pulvis.

S. Täglich 3mal eine Messerspitze voll.

Anwend. Bei Crusta lactea.

Haase.

3588. *Rx.* Sulphur. praecip.
Magnes. carbon. āā 3β
Violae tricol.
Sacchari lactis āā 3iij.
M. f. pulvis.

S. Aller 2 Stunden eine Messerspitze voll.

Anwend. Gegen Ansprung und chronische Ausschläge der Kinder.

Fr. Jahn.

3589. *Rx.* Violae tricol. 3ij
Aquae fervid. q. s. ad colat. 3ij
Vini stibiati ʒj
Syrup. althaeae 3ij.

S. Aller 2 Stunden 2 Theelöffel.

Anwend. In gleichen Fällen.

Althof. Jahn.

3590. *Rx.* Herb. violae tricol. 3ij.
Coque cum
Lactis vaccini 3ix ad reman. 3vj.

Colat. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel voll zu geben.

Anwend. In gleichen Fällen.

Richter.

3591. **Ry.** Semin. cannabis $\mathfrak{z}\text{j}$.

Coque cum

Aquae font. q. s. ad rem. colat. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Sub finem adde

Flor. jaceae $\mathfrak{z}\beta$.

Stent in infusione per aliquot tempus, et dein affunde colat.

Syrup. althaeae $\mathfrak{z}\text{j}$.

D. S. Nach und nach zu einer halben Tasse voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Haematuria chronica.

Brera.

3592. **Ry.** Herbae jaceae

Caul. dulcamar. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\text{ij}$

Spec. pectoral. $\mathfrak{z}\beta$.

Conc. M. f. species.

S. Zum Thee.

Anwend. Gegen Milchschorf und andere chronische Hautausschläge der Kinder.

Schwartze.

3593. **Ry.** Extr. jaceae

Axung. porci $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\beta$.

M. exacte.

S. Salbe.

Anwend. Gegen chronische Hautkrankheiten.

Stein.

Virgaureae herba. Goldruthenkraut.*(Von Solidago virgaurea L.)*

Form u. Gabe. Im Aufguss zu $\mathfrak{z}\beta$ — j auf $\mathfrak{z}\beta$ — ij Wasser.

3594. **Ry.** Summitat. virgaureae
Radic. ononid. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}\beta$.
Conc. M. f. species.

S. Mit einer Tasse kochenden Wassers aufzugießen, eine Stunde auf einer warmen Stelle ziehen zu lassen und täglich eine Portion zu verbrauchen.

Anwend. Gegen Nierensteine.

Heim. Muhrbeck.

3595. **Ry.** Herb. virgae aureae
„ petroselini
„ caerefol. sativ. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}ij$.

Infunde

Aquae fervid. q. s.

Colat. $\mathfrak{z}xvj$ adde contundendo et terendo

Semin. cucurbit.

„ cucumer. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}ijj$

ut f. l. a. emulsio.

Cola. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Anwend. Bei mangelnder Harnsekretion mit Reizung der Blase.

Vogt.

Viscum quernum. Eichenmistel.

(*Von Loranthus europaeus L.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Lattwerge, zu $\mathfrak{ij}$ — $\mathfrak{iiij}$, besser in Abkochung, zu $\mathfrak{iiij}$ — $\mathfrak{iv}$ auf $\mathfrak{vj}$ — $\mathfrak{viij}$, esslöffelweise, 4—6mal.

3596. *Ry.* Visci querni conc. $\mathfrak{z}\beta$.

Coque cum

Aquae font. q. s. per $\frac{1}{2}$ hor. ad colat. $\mathfrak{xi}$.

S. Aller 2 Stunden eine Tasse voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Epilepsie.

v. Hildenbrand.

3597. *Ry.* Visci querni

Lapid. cancror.

Cornu cervi rasi

Rad. valerian. $\mathfrak{aa}$ $\mathfrak{zj}$.

M. f. pulv. subtiliss.

S. Täglich 3—4mal eine kleine Messerspitze voll.

Pulvis antispasmodicus infantum.

Anwend. Gegen Säure, Durchfälle, Erbrechen, Nervenreizungen, Zahnkrämpfe kleiner Kinder.

Hufeland.

3598. *Ry.* Visci querni

Fol. aurant.

Rad. gentian. rubr.

„ calami aromat. $\mathfrak{aa}$ $\mathfrak{zij}$

„ valerianae $\mathfrak{zj}$

Olei cajeputi gutt. xxx
 Ammon. muriat. depur. ℥β.
 M. f. pulv. D. ad vitrum.

S. Täglich 3mal einen halben Esslöffel voll.

Waitz's Geheimmittel gegen Epilepsie.

3599. *Ry.* Salis anglici ℥j
 Visci querni
 Fol. aurant. āā ℥β
 Rhei optimi ℥ij.
 M. f. pulvis.

S. Täglich 3mal einen Theelöffel voll.

Anwend. Der anhaltende Gebrauch dieses Pulvers wird als vorzüglich heilsam empfohlen bei leichteren Anfällen von Krämpfen junger Frauenzimmer, wenn ein unordentlicher Appetit, bald Verstopfung, bald Durchfall, aufgetriebener Unterleib, kachektisches Ansehen, Neigung zur Bleichsucht u. s. w. zurückbleiben, von

Osiander.

Vitis vinifera L. Weinstock.

A. Vitis baccae recentes; frische Weinbeeren.

3600. *Ry.* Traubenkur. Nach einem kleinen Frühstück aus einer Tasse Taubenbrühe früh um 8 Uhr geniesst man 8β Trauben ohne Weissbrod, und fährt so mit 8β alle 2 Stunden fort. Um 11 Uhr trinkt man wieder eine Tasse Fleischbrühe. — Das Mittagsessen besteht aus Fleischbrühsuppe mit etwas Huhn und dergleichen. — Des Nachmittags wird wieder um 4 Uhr und um 6 Uhr jedesmal 8β Trauben genossen, und diese Menge allmählig in dem Maasse

vermehrt, dass die tägliche Quantität $\mathfrak{z}iv-v$ beträgt. Die Hülsen dürfen nicht mit verschluckt werden, sind aber bei dem angegebenen Gewichte mit eingerechnet.

Die beste Traubensorte ist Gutedel oder Muskateller. Die allzusüssen, edleren Sorten sind weniger zu empfehlen; man muss aber zuweilen mit den Sorten abwechseln. Bisweilen entsteht Stumpfheit der Zähne und Unvermögen zu kauen, daher man nach jedem Genuss von Trauben die Zähne mit China- oder Kohlenpulver abreiben und den Mund mit Wasser und Rum ausspülen muss.

Anwend. Als antiphlogistisches und gelind öffnendes Mittel.

Clarus.

B. Vitis pampini; junge Weinranken.

Form u. Gabe. *Frischer Saft, Abkochung. — Extrakt, in Pillen, Bissen, Lattwerge, Lösung, zu $\mathfrak{z}\beta-ij$, 3—6mal täglich. — Aeusserlich Waschung.*

3601. *Rx.* Extr. pampinorum vitis $\mathfrak{z}iv$
Aquae rubi idaei $\mathfrak{z}iv$.

M. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Epilepsie.

Klose in Königsberg.

3602. *Rx.* Extr. pampin. vitis $\mathfrak{z}ij-ij$
Aquae destill. simpl. $\mathfrak{z}ij$
Sacchari albi $\mathfrak{z}ij$.

S. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel voll; täglich zu verbrauchen.

Anwend. Bei Arthrokace, wo keine recht bestimmte Kausalindikation, besonders bei häufigen Nervenzufällen.

Rust.

C. Vinum; Wein.

Form u. Gabe. Rein, löffel-, glasweise, ein- und mehreremale täglich. — Aeusserlich zu Mund- und Gurgelwässern, Einspritzungen, Waschungen, Bähungen, Umschlägen, Bädern, Klystieren.

3603. *Ry.* Vini rubri calidi ℥j—ij
Alcohol. ℥j—ij.

M. S. Zum äussern Gebrauch.

Anwend. Bei Operation des Wasserbruches durch Injektion, bei kalten Abscessen u. s. w.

Earle.

3604. *Ry.* Panis triticei q. s.
Vini rubri „Port“ dicti q. s.
F. cataplasma.

Anwend. Gegen Brand.

Da der Portwein in Deutschland weniger Sprit hat, so ist es nöthig, noch etwas Rum oder andern Weingeist zuzusetzen, oder halb französischen Rothwein, halb Branntwein zu nehmen.

3605. *Ry.* Vini rubri ℥j
Olei amygdal. dulc. ℥ß.
M. f. l. a. c. pulv. gummi mimos. q. s. linimentum.

S. Zum Befeuchten der Charpie.

Anwend. Nach Exstirpation eines Steatoms aus der Augenhöhle. Später wurde, um der Wucherung vorzubeugen, Bals. peruv. ℥j zugesügt.

J. A. W. Hedenus.

3606. **R.** Specier. aromatic. ℥iv
 Vini rubri gallici ℥ij .
 Macera per viij dies, cola et filtra.
 Aquae vulnerariae vinosae ℥ij .

M. S. Verbandwasser.

Vinum aromaticum Pharm. gall.

Anwend. Zum Verbinden von Chankern.

Ricord.

Z.

Zedoariae radix. Zittwerwurzel.

(*Von Curcuma Zedoaria Salisb.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, zu ʒß—j,
im Aufguss, ʒj—ij auf ʒiij—iv, esslöffelweise.

3607. Rx. Pulv. radic. zedoariae ʒij
Sacchari albi ʒß.
M. f. pulvis.

S. Täglich 4mal einen Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei Verschleimung, Schwäche des Magens.

Schubarth.

3608. Rx. Caryophyllor.
Rad. zedoariae āā ʒß
„ calami aromat.
Cass. cinnamomeae āā ʒj
Herb. menth. piper. ʒij.

Subtiliss. pulver. admisce

Mellis despum. $\mathfrak{z}\text{xv}$.

F. electuar.

S. Umgerührt, täglich 3—4 mal einen Theelöffel.

Anwend. Bei Anorexie.

Phoebus.

Zincum. Zink.

A. Zincum aceticum; essigsaures Zink.

(Zincum oxydatum aceticum, Acetas zincicus
c. Aqua; essigs. Zinkoxyd.)

Form u. Gabe. In Pillen, Lösung, zu gr. j—vj,
2—3mal. Aeusserlich zu Augewässern, Einspritzungen.

Man vermeide stärkere Säuren, Alkalien, alkalische Erden und deren Salze, Schwefellebern, Schleime, Gerbstoff, Aqua communis.

3609. R_y. Zinci acetici $\mathfrak{z}\text{j}—\text{j}\mathfrak{ß}$
Gummi arabici $\mathfrak{z}\text{j}$
Aquae destill. $\mathfrak{z}\text{viij}$.

S. S. Alle Stunden anfänglich $\frac{1}{2}$, später einen
Esslöffel voll.

Anwend. Bei Gehirnfieber, Kopfrothe.

Rademacher.

3610. R_y. Zinci acetici gr. xv
Aquae destill. simpl. $\mathfrak{z}\text{vj}$.

S. S. Zum Waschen der Augen.

Anwend. Gegen chronische Schleimflüsse der Augen u. s. w.

Ware.

3611. *Ry.* Zinci acetici gr. j
Aquae rosar. $\mathfrak{Z}$ ij.

S. S. Augenwasser.

Anwend. In den späteren Zeiträumen der Augenentzündung
Neugeborener.

Dewees.

3612. *Ry.* Zinci acetici gr. viij—x
Aquae destillat. $\mathfrak{Z}$ iv—vj.

S. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Bei chronischer Blennorrhöe der Harnröhre.

Henry.

B. Zincum chloratum; Chlorzink.

(*Zincum oxydatum muriaticum, Butyrum Zinci,
Liquor Zinci muriatici; salzsaures Zinkoxyd,
Zinkbutter.*)

Form u. Gabe. Innerlich nur mit grosser Vorsicht
zu gr. $\frac{1}{20}$ — $\frac{1}{12}$. — Aetzmittel.

3613. *Ry.* Zinci chlorati $\mathfrak{D}\beta$
Alcohol. absoluti $\mathfrak{Z}$ ij
Aether. sulphurici $\mathfrak{Z}\beta$.
Solve, post aliquot dies decanta.

S. Täglich 2mal 4—8 Tropfen in Zuckerwasser.

Anwend. In Nervenkrankheiten, besonders in Krampfformen,
belebend, krampfstillend.

Hufeland.

3614. Ry. Zinci chlorati gr. j
Spirit. mariat.-aether. ℥ij.

S. S. *Aller 4 Stunden 5 Tropfen, später 10, in etwas Zuckerwasser.*

Anwend. Gegen Veitstanz, Epilepsie, Gesichtsschmerz.

Hanke.

3615. Ry. Zinci chlorati gr. viij
Extr. aloes aquos. ℥ij
Aqua destill. ℥iv.

S. S. *Zum Verbande.*

Anwend. Bei atonischen skrofulösen Geschwüren.

Vogt.

3616. Ry. Zinci chlorati part. j
Amyli part. v—iv—iij—ij
Aqua fontan. quantum necesse est ad forman-
dam pastam (gutt. LXX—LX—XL).

S. *Zum Aetzen.*

Man walzt die Paste mit einer Rolle zu Blättern von $\frac{1}{2}$ —4''' Dicke.

Die stärkste von

$\frac{1}{2}$ '''	Dicke macht einen Schorf von					1'''	in 24	Stunden
1'''	"	"	"	"	"	3'''	in 24	"
2'''	"	"	"	"	"	6'''	in 24	"
3'''	"	"	"	"	"	12'''	in 72	"
4'''	"	"	"	"	"	18'''	in 96	"

Anwend. Als sicheres Aetzmittel. Bei Krebs, speckigen und fasrig-knorpeligen Geschwülsten. Der Schorf fällt am 8.—22. Tage.

Canquoin.

32 *

32 + 32 32 + 32

3617. *Ry.* Zinci chlorati part. j
 Butyr. antimonii part. ij
 Amyli part. v—iv—iiij—ij
 Aquae fontan. quant. necesse est ad forman-
 dam pastam (5ij).

S. Aetzpaste.

Anwend. Gegen dicke, unebene Krebsgeschwülste.

Canquoin.

Diese Pasten machen grossen Schmerz, wirken aber tief.

C. Zincum cyanogenatum; Blaustoffzink.

(*Cyanuretum Zinci, Zincum hydrocyanicum sine Ferro; blausaures Zink, Cyanzink.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, zu gr. $\frac{1}{6}$ —j, 2—3mal täglich.

Man vermeide Säuren, Salzbilder, Schwefellebern, Wärme, Luft.

Man hüte sich, dieses Präparat mit dem nachfolgenden zu verwechseln.

3618. *Ry.* Zinci cyanogenati gr. ß
 Magnes. ustae gr. iv
 Pulv. cort. cinnamomi gr. iiij.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. iv.

S. Aller 4 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Gegen nervöse Magenleiden, besonders Magenkrampf. Auch bei Dyspepsie und Koliken, welche sich bei vermindertem Monatsflusse einstellen.

Henning.

3619. *Ry.* Zinci cyanogenati gr. xv
Succi liquiritiae dep. ʒij.
M. f. pil. lx. Consp. rad. althaeae.

S. Dreimal täglich 1 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei Nervenverstimnungen, Nervenschwäche, Neuralgien u. s. w.

Allmählig wird die Gabe verstärkt, so dass die Kranken aller 2 Stunden 2 Stück nehmen.

Kopp.

D. Zincum ferroso-hydrocyanicum;
eisenblausaures Zink.

(*Cyanuretum ferro-zincicum; Zinkeisen-*
cyanür.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Lösung, zu gr. ʒ—iij, 2—3mal täglich.

Man vermeide stärkere Säuren etc., wie bei Zincum aceticum.

3620. *Ry.* Zinci ferroso-hydrocyanic. gr. ij—viij
Sacchari albi ʒj.
M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Aller 2 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Gegen Kardialgie.

Bisweilen werden diesen Pulvern Opii pur. gr. ij beigefügt.

v. Hildenbrand.

3621. *Ry.* Zinci ferroso-hydrocyanic. gr. xv
Rad. valerian. ʒß

Extr. valerian. q. s.

F. pil. lx. Consp. lycop.

S. *Früh und Abends 2 Stück zu nehmen.*

Anwend. Gegen Veitstanz.

Rosenstiel. Herkenrath.

3622. R_y. Zinci ferroso-hydrocyanic. gr. iv
Aquae destill. ℥ij.

S. S. *Auf 4mal zu nehmen.*

Anwend. Gegen Veitstanz.

3623. R_y. Zinci ferroso-hydrocyanic. gr. x
Magnes. carbon. ℥ij.

M. exacte. Adde terendo

Olei valerian. aether. gutt. xx ope Syrup. chamomill. ℥v antea subacti

Pulv. rad. valerian. ℥x.

M. f. pil. gr. iij. Consp. magnes. alb.

S. *Täglich 3mal 6 Stück und allmählig mit der Gabe zu steigen.*

Anwend. Gegen Veitstanz.

Vogt.

E. Zincum iodatum; Jodzink.

(Zincum hydriodicum, Ioduretum Zinci; Zink-jodüre.)

Form u. Gabe. Nur äusserlich.

3624. R_y. Zinci iodati ℥j
Axung. porci ℥j

M. f. unguent.

S. *Täglich 1—2 Drachmen.*

Anwend. Gegen skrofulöse Geschwülste. Auch gegen Bubonen.

Ure. Foy.

3625. *Ry.* Zinci iodati gr. iij—viij
Aquae destill. $\bar{3}$ ij.

S. S. Augewasser.

Anwend. Gegen skrofulöse Augenentzündung.

Proutet. Maunoir.

F. Zincum oxydatum album; weisses
Zinkoxyd.

(*Flores Zinci; Zinkblumen.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Trochisken, zu gr. β —iv, 2—4mal. Aeusserlich zu Streu- und Augenpulver, Salbe, 3β —ij auf $\bar{3}$ j.

Man vermeide Säuren, saure Salze und Säfte.

3626. *Ry.* Zinci oxydati albi gr. ij
Magnes. carbon. gr. vj
Elaeosacch. cajeputi $\mathfrak{A}\beta$.
M. f. pulv. Disp. tal. dos. viij.

S. Aller 3 Stunden 1 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Magenkrampf.

Schubarth.

3627. *Ry.* Zinci oxydat. albi gr. iv
Rad. colombo gr. xv
M. f. pulv. Div. in iv part. aequal.

S. Aller 3 Stunden 1 Pulver.

Pulveres stomachici cum Zinco Brerae.

Anwend. Bei Magenschwäche mit Neigung zum Erbrechen, und bei hartnäckigen Verdauungsübeln.

Brera.

3628. *Rx.* Zinci oxydati albi gr. j—vj
 Extr. hyoscyami gr. j
 Olei valerian. aether. gutt. j
 Rad. valerian. 3ß.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. ix.

S. Täglich 3 Pulver zu nehmen.

Pulvis antepilepticus Hufelandi.

Anwend. Gegen Epilepsie.

Bei hartnäckigen Fällen setzt man Cupri ammoniati gr. ß zu. Unter allen Mitteln leistete dieses am meisten.

Hufeland.

3629. *Rx.* Zinci oxydati albi gr. j
 Rad. valerian. offic. rec. pulv. 3j
 Conch. praep. gr. iv
 Sacchari albi gr. x
 Olei cajeputi gutt. iij.
 M. f. pulv. Disp. tal. dos. xv.

S. Täglich 3 mal 1 Pulver mit Pomeranzenblätterthee zu nehmen.

Anwend. Gegen Epilepsie.

Vogt.

3630. *Rx.* Zinci oxydati albi gr. vj
 Extr. hyoscyami gr. ij
 Sacchari albi 3j.
 M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Aller 2 Stunden 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. Gegen Veitstanz.

v. Hildenbrand.

3631. *Rx.* Ziuci oxydati albi gr. iij—vj
 Rad. valerian. min.

Sacchari albi āā 3β.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. *Aller 3^{en} Stunden 1 Pulver zu nehmen.*

Anwend. Gegen Keuchhusten.

Berends.

3632. R_x. Zinci oxydati albi

Castorei āā gr. vj

Sacchari albi 3j.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. *Aller 3 Stunden 1 Stück zu nehmen.*

Anwend. Gegen Krampfszufälle hysterischer Personen.

3633. R_x. Zinci oxydati albi 3j

Pulv. radic. valerian. 3β

Castorei gr. iv

Syrupi q. s.

F. pil. gr. iij. Consp. lycop.

S. *In einem Tage zu verbrauchen.*

Anwend. Gegen Epilepsie.

Diese Pillen müssen sehr lange Zeit, Jahre lang, gebraucht und damit Bäder und ein Cauterium am Arme verbunden werden.

Dupuytren.

3634. R_x. Extr. millefol. 3jβ

Mass. pilul. Ruffii 3j

Asae foetidae 3β

Flor. zinci gr. xv.

M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. *Morgens und Abends, auch wohl 3mal täglich, 5 Stück zu nehmen.*

Anwend. Bei krampfhafter Engbrüstigkeit, zumal schleimiger Körper und starker Biertrinker.

Er. Jahn.

3635. Rx. Zinci oxydat. albi
Sacchari candidi
Calomelanos āā 3ß.
M. f. pulv. subtiliss.

S. *Mittelst einer Federpose eine Messespitze voll auf die Hornhaut zu blasen.*

Anwend. Gegen Hornhautflecke und gewisse chronische Augenentzündungen.

Dupuytren.

3636. Rx. Zinci oxydati albi gr. xv
Olei nuc. jugland. 3ß
Ungt. rosati 3ß.
M. f. unguent.

S. *Mit einem Pinsel täglich einer Linse gross in's Auge zu streichen.*

Anwend. Gegen Hornhautflecke.

J. A. Schmidt.

3637. Rx. Zinci oxydati gr. xv
Opil puri gr. iij
Unguent. rosati 3ß.
M. f. unguent.

S. *Täglich 3mal einer Linse gross auf den Rand der Augenlider zu streichen.*

Anwend. Bei Ophthalmia pruriginosa palpebrarum.

Conradi.

3638. Rx. Zinci oxydati
Semin. lycopodii āā 3ß
Unguent. saturnini 3ß.

Anwend. Gegen Intertrigo infantum.

Rosenstein.

Hufeland und Pitschaft wendeten dieselbe Salbe

— nur statt Unguent. saturn. nehmen sie Unguent. rosati $\overline{\text{3j}}$ —
gegen wunde Brustwarzen, Exkorationen, wunde Lippen,
herpetische Ausschläge u. s. w. an.

3639. R_y. Zinci oxydati albi ʒj
Hydrargyr. ammon. muriat. ʒj
Unguent. rosati ʒj.
M. f. unguent.

S. Salbe.

Anwend. Gegen hartnäckige Ausschläge.

Wendt.

3640. R $\bar{y}$. Zinci oxydati albi
Hydrargyr. ammon.-muriat. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ij
Pulv. carbon. tiliae $\bar{3}$ ij
Unguent. rosati $\bar{3}\beta$
 „ saturnini $\bar{3}$ j.
M. f. unguent.

S. Salbe.

Anwend. Gegen impetiginöse Geschwüre.

Rust.

G. *Zincum sulphuricum*; schwefelsaures
Zink.

(*Vitriolum Zinci, Vitriolum album; Zinkvitriol, weisser Vitriol.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Lösung, zu gr. β — iiij , 2—3mal; als Brechmittel, zu gr. vj — x , alle 5—10 Minuten, bis Wirkung erfolgt. — Aeusserlich zu Mund-, Augen-, Gurgelwässern, Pinselsäften, Einspritzungen, Waschungen, Salben.

Man *vermeide* Alkalien, alkalische Erden und deren Salze mit schwächeren Säuren, Seifen, Bolus alba und Armena, Schwefellebern, Bleisalze, Schleime, Gerbestoff, Aqua communis.

3641. *Ry.* Zinci sulphurici
Sacchari albi āā gr. xv.
M. f. pulv. Div. in tres part. aequal.

S. Alle Viertelstunden ein Pulver zu nehmen.

Anwend. Brechmittel in Fällen, wo Brechweinstein und Ipecacuanha wegen Mangel an Reizbarkeit des Magens nicht wirksam genug sind, oder schnelle Entleerung des Magens zur Lebensrettung unbedingt erforderlich ist, wie nach kaum verschluckten Giften.

Remer.

3642. *Ry.* Zinci sulphurici gr. xij
Sacchari albi gr. v.
M. f. pulvis.

S. Auf einmal mit Haferschleim zu nehmen.

Anwend. Bei Vergiftungen als Brechmittel.

Unzer.

3643. *Ry.* Zinci sulphurici gr. β
Extr. valerianae gr. v
Elaeosacch. valerianae ʒβ.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj ad chart. ceratam.

S. Morgens und Abends ein Pulver.

Anwend. In der Epilepsie.

Brande.

3644. *Ry.* Zinci sulphurici $\mathfrak{z}\text{j}$ — $\text{j}\beta$.

Solve in

Aquae destillatae $\mathfrak{z}\text{ij}$.

S. Alle 10 Minuten einen Esslöffel voll bis zur Wirkung.

Anwend. Als Brechmittel.

Berends.

3645. *Ry.* Zinci sulphurici gr. iv

Solve in

Aquae destillat. simpl. $\mathfrak{z}\text{iv}$.

S. Aller 8 Stunden einen starken Esslöffel voll.

Anwend. In einem Falle von heftigem krampfhaften Asthma eines 20jährigen Mädchens mit Erfolg angewendet von

Ideler.

3646. *Ry.* Zinci sulphurici $\mathfrak{z}\text{j}$

Asae foetidae $\mathfrak{z}\text{j}$

Extr. valerianae q. s.

F. pil. xxx. Consp. lycop.

S. Täglich 2mal 1—3 Stück.

Anwend. Als Antispasmodicum in Nervenkrankheiten, bei Epilepsie, Veitstanz, Keuchhusten.

G. A. Richter. Berends.

3647. *Ry.* Zinci sulphurici $\mathfrak{z}\text{j}$

Terebinth. latic. gr. xv

Pulv. rad. tormentill. gr. x.

M. f. pil. xxx. Consp. cinnamom.

S. Täglich 3mal 1—2 Stück.

Anwend. Gegen Tripper.

Radius.

2648. *Rx.* Zinci sulphurici ʒj
 Terebinth. venet.
 Extr. calami aromat. āā ʒjß
 Rad. calami aromat. q. s.
 F. pil. c. Consp. irid. flor. D. in vitro.

S. Täglich 3—4mal 8 Stück.

Anwend. Gegen chronischen Tripper.

Graham. Hacker.

3649. *Rx.* Zinci sulphurici gr. jß—iij
 Aquae rosarum ʒjß.

S. S. Augewasser.

Aqua ophthalmica Plenckii.

Anwend. Bei chronischen feuchten Augenentzündungen, gegen Jucken der Augenlider.

3650. *Rx.* Zinci sulphurici gr. iij.

Solve in

Aquae rosarum ʒiij.

Adde

Mucilag. semin. cydon. ʒj

Tinct. opii crocatae ʒß.

M. S. Täglich 1—2mal, umgeschüttelt, einen Tropfen in's Auge fallen zu lassen.

Anwend. Gegen torpide Augenentzündungen und Blennorrhöen.

v. Gräfe.

3651. *Rx.* Zinci sulphurici gr. β.

Solve in

Aquae opii ʒij.

D. S. Umgeschüttelt, 1—2mal täglich einzuträufeln.

Anwend. Gegen erhöhte Empfindlichkeit der Augen in Folge von Ophthalmie.

Jüngken.

3652. *Ry.* Zinci sulphurici gr. ij—vj.

Solve in

Aquae opii $\bar{3}$ ij—iiij.

S. Wohlumgeschüttelt, täglich 3—4 mal zu appliciren.

Anwend. Gegen Hornhautflecke nach Augenentzündung Neugeborener, gegen chronische Encanthis.

v. Ammon.

3653. *Ry.* Zinci sulphurici $\bar{3}$ j

Aquae destillat. simpl. l. rosar. $\bar{3}$ x.

S. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Gegen chronischen Tripper.

Lagneau.

3654. *Ry.* Zinci sulphurici gr. iv

Aquae destillat. $\bar{3}$ ij

Aquae laurocerasi $\bar{3}\beta$

Tinct. opii simpl. $\bar{3}$ j

Mucilag. gummi mimos. $\bar{3}\beta$.

M. S. Umgeschüttelt, täglich 2mal einzuspritzen.

Anwend. Bei veralteten und schmerzlosen Nachtrippern.

Rust.

3655. *Ry.* Zinci sulphurici

Aluminis $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ j

Aquae bullientis mens. j

S. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Bei Hämorrhagieen aus dem Uterus und der Scheide.

Meyer.

3656. *Rx.* Zinci sulphurici gr. j—ij
 Aquae juniperi $\bar{3}\beta$
 Liqu. myrrhae $\bar{3}j$.

S. S. Nach Reinigung des Gehörgangs einige Tropfen in ihn zu giessen und mit Baumwolle zu verschliessen.

Anwend. Gegen atonische Otorrhöe.

Vogt.

3657. *Rx.* Zinci sulphurici $\bar{9}j$
 Extr. cort. peruvian. $\bar{3}j$
 Aquae rosar. $\bar{5}vij$
 Mellis rosar. $\bar{3}j$.

S. S. Mundwasser.

Anwend. In der Mundfäule.

Richter.

3658. *Rx.* Zinci sulphurici $\bar{3}\beta$.
 Solve in
 Decoct. rad. enulae concentr. $\bar{3}x$.

D. S. Zum Waschen.

Anwend. In eingewurzelter Krätze bei reizlosen Individuen.

Harless.

3659. *Rx.* Zinci sulphurici $\bar{3}j$
 Aquae commun. $\bar{3}iv$
 Liqu. myrrhae $\bar{3}j$
 Tinct. opii crocat. $\bar{3}ij$.

S. S. Zum Verband.

Anwend. Bei skrofulösen und atonischen Geschwüren.

Vogt.

3660. *Ry.* Zinci sulphurici $\mathfrak{Z}\text{ij}$
Decoct. fort. rosar. provincial. $\mathfrak{Z}\text{vj}$.

S. S. Zum Betupfen mit dem Pinsel.

Anwend. Nach Ausziehung von Nasenpolypen zur Verhinderung der Wiedererzeugung.

Lisfranc.

3661. *Ry.* Zinci sulphurici gr. v
Butyri rec. insulsi $\mathfrak{Z}\beta$.
M. f. unguentum.

S. Täglich einer Linse gross in den inneren Augwinkel zu bringen.

Anwend. Gegen Triefaugen.

Reil.

3662. *Ry.* Zinci sulphurici gr. ij
Hydrargyr. oxydati rubri gr. xij
Butyri rec. insulsi $\mathfrak{Z}\beta$.
M. exactiss.; *f.* unguentum.

S. Augensalbe; einer Erbse gross Abends auf die geschlossene Augenlidspalte einzureiben.

Anwend. Gegen chronische Entzündung der Augenliderdrüsen mit starker Absonderung.

Beer.

3663. *Rv.* Zinci sulphurici
Semin. lycopodii aa $\mathfrak{Z}\beta$
Unguent. rosati $\mathfrak{Z}\text{j}$.
M. f. unguentum.

S. Salbe.

Anwend. Gegen aufgesprungene Brustwarzen und rissige Lippen.

Hufeland.

Zingiberis radix. Ingwer.*(Von Zingiber officinale Roscoe.)*

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Plätzchen, Lattwerge, zu gr. x — xv, einigemal täglich; im Aufguss, zu $\bar{3}\beta$ auf $\bar{3}vj$, esslöffelweise. — Confectio s. Conditum Z. zu $\bar{3}\beta$ — j, ein- bis 2 mal. — Aeusserlich als Kaumittel (bei Zungenlähmung), im Aufguss zu Gurgelwässern, Umschlägen, Zahntinkturen.

3664. *Ry.* Radic. zingiberis $\bar{3}ij$
 Elaeosacch. cinnamom.
 Pulv. gummosi $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$.
 M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.
S. Aller 3 Stunden ein Pulver mit Wasser zu nehmen.

Anwend. Bei Schleimasthma.

Vogel.

3665. *Ry.* Pulv. rad. zingiberis
 „ cort. aurant.
 Magnes. carbon.
 Elaeosacch. macis $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}iv$.
 M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.
S. Täglich 2—3 mal ein Pulver zu nehmen.

Anwend. Bei dyspeptischen, mit Magensäure und Verschleimung verbundenen Zufällen.

Meyer.

3666. *Ry.* Pulv. rad. zingiberis
 „ „ pimpinellae $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$
 Elaeosacch. caryophyllor. $\bar{3}ij$

Mucilag. gummi arab. q. s.

F. trochisci xv.

S. Bisweilen ein Stück im Munde zergehen zu lassen und langsam zu verschlucken.

Anwend. Bei atonischer, paralytischer Bräune.

Vogt.

3667. *Ry.* Rad. zingiberis 3ß

„ pyrethri 3j

Elaeosacch. carvi 3jß

Mucilag. gummi tragacanth. q. s.

F. trochisci xvij.

S. Täglich 3mal 1—2 Stück.

Anwend. Als magenstärkendes Mittel.

Choulant.

3668. a. *Ry.* Natri bicarbonici 3v

Sacchari albi 3ivß

Zingiberis 3j.

M. f. pulv. Div. in xij part. aequal. D. ad chartam coeruleam.

3668. b. *Ry.* Acidi tartarici pulv. 3vjß.

Div. in xij part. aequal. Det. ad chartam albam.

S. Ingwerbier.

Man löst zuerst ein Pulver im weissen Papier in einem Bierglase Wasser auf und schüttet dann eines im blauen hinzu, rührt um und trinkt während des Aufbrausens.

Anwend. Ein erfrischendes, den Magen nicht erschlaffendes Getränk, besonders bei grosser Sommerhitze zu empfehlen.

I. Register über die Autoren.

(Die arabischen Ziffern zeigen die Nummern der Recepte und nur dann die Seitenzahlen an, wenn ihnen ein S. vorgesetzt ist; die römischen Ziffern bezeichnen den Band.)

A.

Abernethy. 749. 1370. 3406.
Ackermann. 2965.
Adams. I. S. 578.
Aerzte, polnische. 1738.
— wiener. 1509.
Albano. 2082.
Alibert. 137. 715. 1051.
1292. 2240. 3175. 3495.
Allen. 3491.
d'Alquen. 2927.
Althof. 1412. 1547. 3589.
Alyon. 50, 58.
Amelung. 3475.
v. Ammon. 785. 798. 1254.
2830. 2831. 3225. 3652.
Andreä. 205. 901. 1946.
2040. 2219. 2452. 2997.

Andria. 14.
Angelot. 897.
Annesley. 55.
Ansiaux. 867.
Arming. 2003.
Armstrong. 2023. 3018.
Arnemann. 3262.
Arnheimer. 926.
Ascherson. 1950.
Atle. 3379.
Aubergier. 1232.
Augustin. 7. 66. 69. 166.
238. 284. 289. 492. 493.
923. 1104. 1165. 1197.
2465. 2562. 2745. 2784.
3162. 3185. 3337.
v. Autenrieth. 542. 3012.
3036. 3458.

B.

Bacher. 1853.
 Baglivi. 372. 1177. 1596.
 1662.
 Baldinger. 850. 1388. 1839.
 1857. 2087. 2207. 2381.
 2394. 2503. 3343.
 Bally. 1671.
 Bang. 1637.
 Barbut. 843.
 Barkhausen. 2804.
 Barlow. 2364.
 Barth. 79.
 Barthez. 666.
 Barthol. - Hosp. zu London.
 3069.
 Barton. 636.
 Baudeloque. 650.
 Bazzoni. 3388.
 Beach. 1260.
 Becker. 989.
 Beddoes. 916. 2681.
 Beer. 225. 580. 605. 622.
 1408. 1428. 1465. 1942.
 1943. 2036. 2052. 2674.
 3003. 3662.
 Beisser. 1475.
 Belcher. 2824.
 Bell. 1764. 2076. 2303.
 2993.
 Bell, B. 355.
 Bell, Ch. 2991.
 Benedict. 375. 1463. 1471.
 2032. 2037. 2054.
 Bennati. 214.
 Berends. 16. 101. 132. 251.
 279. 295. 340. 348. 369.
 430. 459. 482. 495. 554.
 597. 614. 676. 694. 725.

813. 828. 829. 976. 990.
 999. 1042. 1043. 1061.
 1067. 1089. 1096. 1158.
 1159. 1179. 1205. 1209.
 1224. 1225. 1290. 1333.
 1365. 1380. 1384. 1385.
 1403. 1532. 1541. 1545.
 1600. 1655. 1659. 1769.
 1782. 1786. 1807. 1814.
 1862. 1865. 1983. 2092.
 2132. 2176. 2202. 2247.
 2318. 2319. 2325. 2476.
 2481. 2484. 2486. 2493.
 2496. 2511. 2518. 2529.
 2530. 2536. 2553. 2582.
 2599. 2613. 2617. 2664.
 2679. 2682. 2712. 2721.
 2727. 2732. 2842. 2850.
 2860. 2942. 2943. 3041.
 3081. 3083. 3115. 3119.
 3124. 3132. 3160. 3173.
 3177. 3269. 3281. 3297.
 3302. 3325. 3342. 3368.
 3418. 3431. 3467. 3468.
 3504. 3508. 3519. 3531.
 3538. 3541. 3564. 3567.
 3568. 3576. 3631. 3644.
 3646.
 Berg. 513.
 Bergius. 445.
 Berliner Charité. 1973. 2021.
 2026. 2142.
 Berliner Klinik. 1919.
 Berndt. 792. 974. 1272.
 1485. 1852. 2450.
 Bernstein. 260. 1729. 2794.
 2949. 2950. 3024. 3289.
 Berthold. 1647.
 Berton. 3015.
 Berzelius. 3327.

- Besnard. 2250.
 Bicker. 1451. 1664. 1733.
 Bielt. 273. 651. 789. 929.
 1847. 1880. 1899. 1903.
 1905. 1909. 1911. 1915.
 1917. 1955. 2015. 2051.
 2090. 2689. 2701. 2826.
 3499. 3502.
 Billroth. 1319.
 Bird, Golding. 202.
 Bisson. 843.
 Blasius. 33. 646. 805. 1288.
 1356. 1912. 1913. 1914.
 2062. 2078. 2255. 2311.
 2415. 2953. 3405.
 Blaud. 1645. 1720. 1725.
 1726.
 Blom. 3256. 3259.
 Blouquier. 2296.
 Bobington. 230.
 Böckh. 2276.
 Boerhaave. 172. 1081. 1144.
 1474. 1953. 2001. 2320.
 2638. 3462.
 Boinet. 1907.
 Bonnafoux. 1039. 2929.
 Bories. 2658.
 Boudet. 1700. 1788. 3461.
 Byer. 810.
 Bande. 3643.
 Befeld. 688. 690.
 Bemmer. 3243.
 Bremser. 1305.
 Brera. 34. 114. 124. 127.
 35. 136. 210. 363. 431.
 500. 523. 631. 1086. 1107.
 1108. 1182. 1185. 1218.
 1223. 1268. 1374. 1394.
 1482. 1511. 1521. 1599.
 1600. 1672. 1799. 1837.
 1896. 1993. 2050. 2147.
 2166. 2222. 2226. 2302.
 2338. 2340. 2370. 2398.
 2400. 2433. 2539. 2540.
 2541. 2616. 2822. 2839.
 2852. 2859. 2865. 2887.
 2956. 3044. 3045. 3082.
 3098. 3133. 3165. 3169.
 3218. 3284. 3375. 3441.
 3446. 3591. 3627.
 Breschet. 531.
 Bressler. 653.
 Brodie 2585.
 Brosius. 530. 2341.
 Brückmann. 1563.
 Brückner. 1106.
 Brunner 668. 1850.
 Buchanan. 71. 586.
 Buchholz. 2249. 3147.
 Buchner. 1643.
 Buchhave. 1359.
 Bücking. 150.
 Büttner. 347. 1879.
 Bunsen 1947.
 Burchard. 2336.
 Burdach. 63. 162. 652. 1937.
 2437. 2709. 2909.
 Burleigh - Smart. 2288.
 Burnett. 587.
 Busch. 920.
 von dem Busch. 3260.
- C.**
- Cadet. 232.
 Cadet de Gassicourt. 435.
 1587.
 Canquoin. 3616. 3617.
 Carmichael. 1591. 1604.
 Carron du Villards. 724. 1724.

- Carus. 361. 1406. 1823. 2832.
 3017. 3387.
 Casper. 1050.
 Castello. 2244.
 Caventou. 1439.
 Cazenave. 2051.
 Cerutti. 1171. 1285. 2260.
 2263. 2328. 2786. 3187.
 3276. 3329.
 Chabert. 2783.
 Channing, Will. 1921.
 Charité, berliner. 1973. 2021.
 2026. 2142.
 Chaussier. 808. 1855. 2280.
 2358. 2359.
 Cheselden. 1568.
 Chevalier. 1036.
 Chevallier. 305. 2504.
 Chiappa. 2974.
 Chomel. 2705.
 Chopart. 744.
 Choulant. 480. 604. 698. 996.
 1134. 1361. 1524. 1574.
 1797. 2179. 2196. 2204.
 2205. 2586. 3055. 3056.
 3137. 3270. 3391. 3399.
 3667.
 Chrestien. 710. 713. 715.
 722. 723. 1083. 1369.
 Cima. 892.
 Cirillo. 1975.
 Clarck. 176.
 Clarus. 169. 240. 335. 670.
 835. 960. 1030. 1053.
 1127. 1138. 1299. 1538.
 1601. 1714. 1716. 1744.
 1964. 2422. 2474. 2707.
 2725. 2765. 2999. 3047.
 3100. 3136. 3158. 3194.
3275. 3422. 3436. 3438.
 3451. 3600.
 Clauder. 1722.
 Clemens. 1284.
 Cline 757.
 Clossius. 1829.
 Codex medicamentarius Ham-
 burgensis. 1715. 2692.
 Cohen. 2271.
 Colbatch. 89.
 Colborn. 2254.
 Collin. 1193. 3421.
 Conradi. 474. 661. 1589.
 1940. 3637.
 Consbruch. 1351. 1980. 2750.
 Cooper. 218. 3087. 3558.
 Cooper, Astley. 643. 1117.
 1834.
 Corneliani. 2418.
 Cory. 1438.
 Côme, Frère. 639.
 Coster. 2152.
 Cottereau. 3025. 3528.
 Cullen. 2948. 3415.
 Cunier. 3201.
- D.**
- Dannemann. 762.
 Darling. 2704.
 Daubenton. 2195.
 Deimann. 1294.
 Delpech. 541. 743. 1446.
 Deschamps. 895. 903.
 Deslandes. 1792.
 Dewees. 2150. 3384. 3611.
 Dictionnaire des sciences ré-
 dicales. 388.
 Dieudonné. 1335.

Dispensatorium Fuldense. Ettmüller. 1830.
 1073. 1405. 2644. Evernest, Rob. 49.
 Dispensatorium Lippiacum. Eyr. 2277.
 1570.

Dobler. 192.

Dömling. 100.

Dörffurt. 3527.

Droste. 3034.

Dubla. 808.

Dublanc. 752.

Duchesne-Duparc. 2934.

Dürr. 3091. 3546.

Duncan. 11. 1550. 1551.
 3178.

Dupuytren. 640. 641. 955.
 1777. 1929. 2059. 2119.

2364. 2998. 3633. 3635.

Durande. 136.

Dzondi. 1923. 2055. 2264.
 2361. 3509.

E.

Earle, H. 2022. 3603.

Ebers. 138. 1037. 1392.
 2172. 2248. 2300. 2213.

2407. 2851. 2855. 3203.

Edwards u. Vavasseur. 10.
 200. 692. 1207. 1216.
 2858. 3336.

Ehrhardt. 2671.

Eisenmann. 1935. 2028.

Eller. 370. 3446.

Elliotson. 1492. 1634. 1642.
 2299.

Ellis. 540. 2714. 2881.

Elsholz. 3168.

Elwert. 1275. 1276.

Emerigon. 1820.

F.

Faber. 3553.

Fabini. 546.

Fayerman. 3001.

le Febure. 227. 638.

Fehr. 686. 3014.

Fels. 3317.

Ferriar. 1840.

Fielitz. 709.

Fischer. 269. 312. 341. 357.

784. 871. 1460. 1470.

1472. 1749. 1987. 2039.

2743.

Fischer, J. G. 2215.

Fischer, J. N. 1109.

Fleisch. 509. 1860.

Flemming. 3129.

la Fontaine. 1938.

Fordyce. 2316. 3345. 3457.

la Forest. 1762.

Former. 1269.

Formey. 1602. 2724. 2812.

Formulaire médicale de Mont-
 pellier. 1728.

Fosbroke. 1024. 1025. 1026.

Fothergill. 1417.

Fouquier. 2014.

Fowler. 629. 2738.

Foy. 352. 978. 1640. 2800.
 2892. 2624.

Frahm. 2949.

François. 874.

Frank. 1133.

Frank (in Posen). 1124.

- Frank, Jos. 134. 1101. 2286. 2385. 2818. 3172.
 Frank, L. 2957.
 Frank, Pet. 4. 190. 241. 390. 518. 527. 975. 1203. 1373. 1409. 1819. 2098. 2182. 2217. 2339. 2347. 2606. 2639. 2750. 3084. 3277. 3401. 3429. 3459.
 Franke. 1875.
 Frémanger. 2417.
 Freyberg. 896. 1973.
 Fricke. 59. 229. 331. 423. 421. 593. 734. 755. 1453. 1572. 1597. 1623. 1892. 1972. 1982. 2068. 2304. 2395. 2427. 2524. 2673. 2692. 2694. 2719. 2777. 2857. 3037. 3466.
 Friedländer (in Brody). 2401.
 Fritsch. 654.
 Fritz. 1451.
 Fritze. 2526. 3408.
 Fuchs. 212. 392. 572. 845. 1620. 1635. 1677. 2072. 2139. 2310. 2408. 2588. 2770. 2940. 3000. 3171. 3228. 3361. 3390. 3556.
 Fuller. 318.
 Furnari. 724.
 Fuster. 201.

G.

- Gall. 736. 1130.
 Gannal. 2716.
 Gardes. 3217.
 Gardiner. 231.
 de Gassicourt, Cadet. 435. 1587.
 Gaubius. 2199.
 Gebel. 397. 402.
 Gendrin. 85. 86. 196.
 Gescheidt. 3167.
 Gesner. 15.
 van Geuns. 3242.
 Gibert. 1757.
 Gieckler. 46.
 Gimbernath. 2265.
 Girtanner. 2258. 2825. 2996.
 Göden. 2904.
 Gölis. 181. 446. 600. 819. 889. 985. 1135. 1136. 1137. 1378. 1379. 1476. 1512. 1540. 1543. 1544. 1658. 1816. 2341. 2611. 2731.
 Gördens. 3227.
 van Göscher. 545.
 Gola. 1246.
 Golding Bird. 202.
 Gomez. 1787.
 Gondret. 324.
 Gouzée. 2706.
 v. Gräfe. 140. 311. 313. 360. 433. 582. 606. 799. 865. 951. 1407. 1414. 1466. 1497. 1553. 1712. 1713. 1879. 1926. 1952. 1978. 2054. 2121. 2136. 2266. 2274. 2584. 3033. 3060. 3063. 3066. 3072. 3193. 3500. 3510. 3650.
 Graham. 3648.
 Grashuis. 197.
 Graves. 170.
 Greding. 790.

Griffith. 206. 854. 1648. 1675. 2635.
 Grötzner. 712. 719.
 Günther. 926. 1397. 1518. 2645. 2911. 3583.
 Guibert, Th. 2936. 2937.
 Guibourt. 1645.
 Guillemot. 3385.
 Gumprecht. 2436.
 Guthrie. 594. 1974.

H.

Haase, Wilh. Andr. 454. 943. 1075. 2137. 2138. 2902. 3507. 3555. 3587.
 Hacker. 746. 1937. 3648.
 de Haen. 842. 1503.
 Häser. 684.
 v. Hagen. 2360.
 Hahnemann. 921.
 Halford. 1353.
 Hamburger Krankenhaus. 875.
 Hamilton. 275. 1990. 2241.
 Hancke. 2164. 2301. 2583. 3614.
 Handschuch. 742. 2267. 3306.
 Hanin. 3585.
 Hannay. 540.
 Hansen, Krüger-. 2017.
 Harless. 280. 632. 645. 763. 1530. 2110. 2444. 3658.
 Harrington. 596.
 Harris. 2080.
 Harrison. 2109.
 Hartmann. 1458.
 Hartmann, Fr. X. 2. 1416. 1709. 1723. 1803. 3038. 3040. 3274. 3292. 3480.
 Hausmann. 1449.
 Heberden. 2971.
 Hecker. 26. 87. 1400. 1879. 2019. 3051.
 Hedenus sen. 406. 2140. 3452.
 Hedenus, J. A. W. 3605.
 Heiberg. 907.
 Heim. 73. 157. 491. 568. 630. 633. 663. 678. 931. 1032. 1063. 1152. 1364. 1368. 1557. 1743. 1835. 1836. 2107. 2190. 2819. 2820. 3179. 3339. 3340. 3341. 3412. 3413. 3594.
 Heineken. 1479.
 Heister. 2624. 3029.
 Heller. 239.
 Helling. 88.
 Hellmer. 1248.
 Hellmund. 642.
 v. Helmenstreitt, Knod. 2146. 2148. 2279.
 Henderson. 2773.
 Henke. 304. 1071. 1314.
 Hennen. 1956.
 Henning. 2449. 3618.
 Henry. 2563. 3612.
 Henry, James. 2522.
 Henschel. 237. 733. 1258. 1263. 1680. 2495.
 Herberger. 1693. 1694. 1695.
 l'Hérétier. 3477.
 Herisson. 1822.
 Herkenrath. 3621.
 Hermes. 2703.
 Herrenschwand. 1703.
 Herrmann. 826. 2665.
 Herz. 198.
 Hesselbach. 1618.
 Heun. 656.

Hildebrandt. 99. 2527.

v. Hildenbrand. 115. 256. 516.

655. 735. 848. 879. 952.

1019. 1020. 1044. 1167.

1184. 1257. 1332. 1355.

1480. 1514. 1565. 1566.

1616. 1656. 1701. 1796.

1817. 1821. 1827. 1832.

1833. 1949. 2058. 2183.

2429. 2596. 2757. 2788.

2795. 2807. 2808. 2848.

2856. 2862. 3085. 3099.

3166. 3251. 3267. 3290.

3382. 3521. 3596. 3620.

3630.

(Vergl. Schola clinica Vindob.)

Hillenkamp. 792.

Himly. 433. 465. 1084. 2112.

2256. 2746. 2940. 3000.

3361.

Hinze. 2612.

Hoffmann, Fr. 1188. 2632.

Hoffmann, Heinr. 1490.

Home. 2955. 3154.

Hope. 60.

Hopf. 2448.

Hôpital St. Antoine à Paris.

242. 3042.

Hôpital de la Charité à Paris.

1560. 1811. 2011.

Hôpital des Enfants à Paris.

185. 2702. 3286.

Hôpital St. Louis à Paris.

1951. 2091. 2367. 2748.

2933.

Hôpital de la Maternité à Paris. 2128.

Hôpital de Montpellier. 496.

2686. 3304.

Hôpital de Perfect. 751. 1450.

Hôpital des Vénériens à Paris.

368. 464. 739. 1958. 2537.

3320.

Hôpitaux militaires 3370.

Hôpitaux de Paris. 571.

Horn. 403. 472. 598. 599.

624. 625. 830. 1079. 1526.

1531. 1891. 1897. 2025.

2439. 2445. 2778. 2868.

3046. 3216. 3323. 3497.

Hospitlr., amerikanische. 3358.

Hospitälcr, deutsche. 126.

128. 564.

Hospitälcr, englische. 1023.

2397.

Hospitälcr, italienische. 6. 94.

Hôtel-Dieu à Paris. 40. 93.

249. 250. 353. 772. 1212.

2012. 3305. 3574.

d'Huc. 1270.

Hufeland. 8. 29. 61. 118.

171. 300. 336. 373. 380.

418. 436. 447. 479. 490.

507. 520. 695. 707. 779.

780. 793. 794. 811. 858.

870. 886. 912. 925. 935.

950. 995. 998. 1006. 1060.

1076. 1114. 1141. 1236.

1296. 1297. 1304. 1337.

1360. 1390. 1422. 1430.

1513. 1542. 1548. 1563.

1579. 1585. 1607. 1660.

1689. 1711. 1722. 1729.

1804. 1815. 1836. 1863.

1922. 1976. 1989. 2101.

2102. 2106. 2124. 2129.

2219. 2223. 2272. 2329.

2334. 2387. 2432. 2435.

2454. 2464. 2492. 2493.

2498. 2505. 2532. 2547.

2548. 2565. 2585. 2621. Jasser. 3493.
 2675. 2677. 2699. 2735. Ideler. 2142. 3645.
 2752. 2755. 2756. 2760. Jörg. 765.
 2792. 2809. 2833. 2889. Jüngken. 354. 549. 1928.
 2893. 2899. 2900. 2939. 1944. 1978. 2002. 2039.
 3058. 3072. 3116. 3126. 2095. 2534. 2801. 3463.
 3236. 3239. 3240. 3253. 3651.
 3328. 3338. 3352. 3360.
 3374. 3409. 3454. 3460. **K.**
 3473. 3474. 3520. 3565.
 3569. 3584. 3597. 3613. Kampf. 427. 489. 511. 1116.
 3628. 3638. 3663. 1122. 1135. 1676. 2387.
 Hunter. 215. 1954. 2549. 3309. 3323. 3443.
 d'Husson. 1351. 3537.
 Kausch. 1663. 3407.
 Keck. 306.
 Kemme. 2576.
 Kerndl. 149.
 Kerr. W. I. S. 578.
 Kessler. 1825. 2099.
 Keyser. 1877.
 Kirkhoff. 1615.
 Kirkland. 2647.
 Klein. 515. 702. 1131. 2380.
 965. 1088. 1187. 1188. 2381.
 1316. 1421. 1494. 1528. v. Klein. 2928.
 1529. 1559. 1562. 1613. Kleist. 2379.
 1662. 1663. 1665. 1666. Klinik, berliner. 1919.
 1732. 1740. 1745. 1785. Klose (in Königsberg). 2883.
 1805. 1851. 2000. 2061. 3601.
 2077. 2105. 2108. 2145. Kluge. 578. 896. 899. 972.
 2167. 2181. 2337. 2355. 1930. 1971. 2149. 2524.
 2506. 2519. 2528. 2597. 2670. 2994. 3035. 3266.
 2641. 2656. 2814. 2843. Kneschke. 3113.
 2884. 2890. 2979. 3114. Knod v. Helmenstreitt. 2146.
 3138. 3139. 3176. 3298. 2148. 2279.
 3335. 3415. 3532. 3566. Knox. 905.
 3588. 3589. 3634. Köchlin. 1475. 1879.
 James. 2187. Kölpin. 3159.
 Janin. 405. 853. 1887. 2535. Kölreuter. 657.

König. 1002.

Kopp. 44. 112. 551. 574.

575. 585. 626. 659.

660. 667. 716. 720.

737. 756. 807. 814. 831.

837. 866. 1198. 1253.

1286. 1287. 1319. 1363.

1399. 1475. 1477. 1478.

1489. 1491. 1495. 1515.

I. S. 578. 1749. 1881. 1916.

1918. 1961. 1965. 1966.

1969. 2009. 2013. 2031.

2081. 2085. 2086. 2185.

2191. 2193. 2194. 2270.

2353. 2707. 2738. 2761.

2768. 2834. 2872. 2891.

2980. 2981. 3067. 3097.

3104. 3108. 3164. 3205.

3209. 3210. 3211. 3212.

3213. 3214. 3219. 3220.

3226. 3229. 3416. 3486.

3487. 3488. 3489. 3619.

Kortum, 510. 1760. 2355.

3449.

Krankenhaus, hamburger. 875.

Kranz. 2711.

Kraus. 745. 747. 1003. 1367.

1486. 1688. 2122. 2625.

Kranse 1927.

Kretzschmar. 1202.

Kreysig. 3163.

Krieg. 1169. 1170. 1624.

Krimer. 42. 2976.

Krombholz. 3255.

Krüger-Hansen. 2017.

Krukenberg. 1826.

Kuhl. 2216. 3271.

Kunkel. 517.

L.

Laennec. 524.

Laffecteur. 3319.

La Fontaine. 1938.

La Forest. 1762.

Lagneau. 3653.

Laidlaw. 2983.

Lalesque. 2706.

Lalic. I. S. 623.

Lallemant. 748.

Lampadius. 1054.

Lanfranc. 684.

Langenbeck. 800. 1937.

Lavagna. 316.

Leake. 3365.

Le Febure. 227. 638.

Legrin. 981.

Lehmann. 714.

Lemasson. 2168.

della Lena. 2235.

Lenhossek. 1564.

Lentin. 82. 557. 1099. 1168.

1188. 1206. 1780. 1937.

2404. 2620. 2967. 3195.

3332.

Lerche. 17.

Leviseur. 964.

L'Hérétier. 3477.

v. Lichtenfels. 3167.

van Lil, Jak. 2930.

Lind. 1210.

Linderer. 1095. 2564.

Lisfranc. 786. 899. 3660.

List. 2930.

Little. 2169.

Lobstein. 2892.

Locher. 697.

Lockstädt. 404. 681. 741.

1437. 1593. 1746. 2561.
 2898. 3112.
 Löbenstein. 569.
 Löbenstein-Löbel. 2894. 2901.
 2905.
 Löffler. 120. 272. 1952.
 Löwenhard. 3378.
 Löwenhardt. 3061.
 Lombard. 113. 2296. 2298.
 3395.
 Lorenz. 3380.
 Louis. 2297.
 Lüders. 2776.
 Lugol. 1906. 2153. 2154.
 2159. 2160. 2161. 2162.
 2165. 2168.
 Luxmore. 81.
- M.**
- Mackenzie. 584.
 Magendie. 31. 35. 36. 37.
 855. 856. 857. 1029. 1245.
 1264. 1265. 1266. 1280.
 1281. 1282. 1605. 1772.
 1773. 1873. 1909. 1910.
 2158. 2163. 2210. 2211.
 2212. 2289. 2291. 2293.
 2294. 2295. 2312. 2767.
 2769. 2771. 2853. 2854.
 2864. 3196. 3198. 3199.
 3200.
 Maison de Santé à Paris.
 1291.
 Maitre-Jean. 297.
 de Man. 3326.
 Mappes. 579. 1102.
 Marchall. 769.
 Marcus. 278. 426. 636. 760.
831. 946. 1142. 1180.
 2273. 2315. 2369. 2412.
 2475. 2633. 2816. 2977.
 2985. 3505. 3582.
 Ste. Marie. 377. 1584. 1866.
 2203. 3318.
 Marinus. 1787.
 Marryat. 2749.
 Martens. 1458. 1924.
 Martin. 2376.
 Martinet. 309. 2958. 2959.
 2961.
 Martius. 1016. 1534. 2925.
 2926.
 Matthieu. 1705.
 Mauchard. 226.
 Maunoir. 3625.
 Mayer. 2559.
 Mead. 3451.
 Mederer. 2262.
 Meissner, Ludw. 1004.
 Mellin. 664. 2938.
 Mendoza. 1895.
 Merlitsch. 680.
 Merrem. 1418. 1419.
 Meurer. 1644.
 Meyer, C. J. 1. 167. 183.
 228. 244. 385. 455. 880.
 1072. 1077. 1386. 2451.
 2628. 3094. 3234. 3377.
 3655. 3665.
 Meyer, H. (in Berlin). 1998.
 Millar. 669.
 Miquel. 1719. 1727. 2775.
 3174.
 Mitchill. 1034.
 Mönch. 919.
 Moll. 1442.
 Monro. 2389.
 van Mons. 1878. 2349. 2388.

de Montmahou. 281. 726.
 1153. 1221. 1464. 1858.
 Morand. 3456.
 Morton. 504.
 Most. 1288.
 Müller. 2471.
 Münchmaier. 1644.
 Muhrbeck. 2787. 3594.
 Murray. 3540.
 Mursinna. 485. 2186.
 Mutzel. 2383.
 Mylius. 2141.
 Mynsicht. 260. 2483. 2791.

N.

Natorp. 1274.
 Naumann, M. E. A. 816. 1233.
 1249. 1250. 1389. 2233.
 2244. 2453. 2846. 3145.
 Neumann. 139. 282. 473.
 607. 909. 971. 1247. 1448.
 2693. 2696. 3237. 3307.
 3411. 3498.
 Neumann, C. G. 1194. 1242.
 2539.
 Nevermann. 809. 1277.
 Nicolai. 2127. 3369.
 Niemann. 224. 913. 1488.
 1768. 2440. 2749. 3261.
 Nuffer. 1702.

O.

Odier. 1704.
 Oesterlen. 2416. 2736.
 v. Oldbruitenborg, Sloet. 1507.
 Oppert. 56. 57.

Osann. 1789; 2384.
 Osiander. 1517. 3331. 3599.
 Osiander d. V. 3246.
 Otto. 1252.
 Oxley. 3068.

P.

Parent. 1893. 1894. 1898.
 Parmentier. 1120. 3346.
 Parrish. 1392.
 Pasquier. 3392.
 Peacock. 1018. 3469.
 Pearson. 90. 1520. 2659.
 Peart. 277.
 Peerbom. 2970.
 Pelletan. 1908.
 Percival. 1371.
 dal Persico. 2157.
 Peschier. 525. 1706. 2683.
 2698.
 Peysson. 532.
 Pezold. 1395.
 Pharmacopoea Austriaca. 922.
 — — — — vet.
 2952.
 — — Batava. 175.
 — — Bavarica. 411.
 — — pauperum Be-
 rolinensis. 2334. 3548.
 Pharmacopoea Borussica. 705.
 — — militaris Borus-
 sica. 415. 3059. 3330.
 Pharmacopoea Edinburgensis.
 2601.
 — — Gallica. 416.
 2590.
 — — Hamburgensis.
 1273.

- Pharmacopoea pauperum Ham-
burgensis. 1718. 2869. 400. 401. 803. 883. 1592.
2029. 2088. 2089. 2446.
- Pharmacopoea Hannoverana. 2631. 2663. 2677. 2733.
414. 1306. 1845. 2970. 2740. 2744. 2752. 2805.
- Pharmacopoea Londinensis. 2912. 2945. 2946. 2951.
506. 1537. 3638.
- — med. chir. 72. Planche. 806. 3327.
- — pauperum Pra- Planché. 1809.
gensis. 1941. Pleischl. 2218.
- — Saxonica. 704. Plenk. 47. 860. 980. 1717.
1753. 2509. 2574. 1972. 2008. 2033. 2045.
- Pharmacopoea Slesviaca. 1047. 2046. 2052. 2672. 2921.
1132. 1776. 3649.
- — Suecica. 419. Plieninger. 1002. 2698.
- — Wirtembergica. Plummer. 478. 1997.
1571. Polidoro. 526.
- Phöbus. 106. 129. 130. 153. Pollini. 2218.
158. 165. 209. 243. 262. Polnische Aerzte. 1738.
302. 330. 345. 346. 371. Polya. 468. 469. 470. 471.
382. 413. 456. 483. 552. v. Pommer. 1611.
696. 701. 781. 787. 795. Pope. 1441.
882. 890. 894. 914. 1059. Popken. 1675. 3419.
1120. 1147. 1161. 1238. Portal. 1992.
1251. 1261. 1307. 1312. Pott. 1413. 3030.
1336. 1342. 1431. 1436. Pradier. 3321.
1462. 1652. 1747. 1756. Prescott. 3386.
1778. 1779. 2115. 2198. Prieger. 1889. 2292.
2221. 2253. 2356. 2402. Pringle. 315. 378. 945. 1848.
2423. 2551. 2560. 2592. 3415. 3496.
2593. 2655. 2667. 2690. Proutet. 3625.
2697. 2723. 2759. 2817.
2871. 2897. 2915. 2920.
3057. 3070. 3080. 3089.
3170. 3235. 3245. 3252.
3364. 3455. 3608.
- Piazza. 308.
- Pierquin. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1631. 1632.
1771. 2960.
- Pitschaft. 77. 78. 396. 399.
- Q.
- v. Quarin. 497. 498. 508.
1556. 1598. 1670. 1818.
2597. 3039. 3315. 3353.
3517. 3545.

R.

- Rademacher. 986. 3609.
 Radius. 131. 154. 159. 204.
 211. 240. 261. 334. 344.
 410. 439. 443. 444. 476.
 494. 521. 536. 573. 583.
 594. 609. 664. 672. 706.
 819. 820. 832. 840. 864.
 1028. 1031. 1045. 1068.
 1085. 1166. 1171. 1172.
 1174. 1175. 1196. 1243.
 1255. 1259. 1273. 1278.
 1313. 1337. 1410. 1435.
 1445. 1523. 1561. 1562.
 1573. 1608. 1633. 1707.
 1754. 1787. 1806. 1884.
 2034. 2100. 2189. 2230.
 2282. 2290. 2292. 2306.
 2307. 2331. 2352. 2377.
 2396. 2489. 2517. 2591.
 2607. 2739. 2762. 2803.
 2836. 2861. 2863. 2864.
 2876. 2906. 2978. 2988.
 3200. 3206. 3334. 3396.
 3397. 3403. 3544. 3547.
 3647.
 Ragolo. 3563.
 Ranque. 804.
 Ratier. 2063. 2064. 3011.
 Rau. 2287. 2382. 2434.
 Rayer. 273. 2024. 3503.
 Read. 3472.
 Recamier. 841. 2296.
 Rehmann. 731.
 Reich. 2409. 2411.
 Reil. 23. 104. 155. 519.
 544. 570. 827. 947. 1157.
 1505. 1575. 1581. 1770.
 1849. 2399. 2456. 2473.
 2482. 2523. 2555. 2569.
 2594. 2729. 2780. 2815.
 2910. 3048. 3230. 3273.
 3278. 3282. 3366. 3661.
 Reinhold. 861.
 Remer. 292. 307. 384. 565.
 615. 915. 1802. 2079.
 2885. 3356. 3641.
 Renard. 2790. 3106.
 Rennie. 2828.
 Reuss. 1227.
 Rey. 2156.
 Reynaud. 2057.
 Ribke. 766. 1149. 2180.
 2213. 3118.
 Richard. 1267. 1322. 1425.
 1790. 1957. 2478.
 Richter, A. 2761.
 Richter, A. G. 1010. 1097.
 1103. 1150. 1162. 1164.
 1192. 1411. 1501. 1984.
 Richter, A. L. 797.
 Richter, G. A. 92. 96. 108.
 109. 111. 173. 245. 286.
 288. 290. 296. 298. 321.
 337. 349. 359. 389. 408.
 460. 481. 535. 553. 608.
 612. 616. 637. 662. 714.
 761. 818. 838. 869. 878.
 954. 969. 987. 992. 1115.
 1123. 1148. 1181. 1294.
 1300. 1317. 1328. 1330.
 1375. 1391. 1393. 1401.
 1424. 1468. 1484. 1493.
 1496. 1535. 1539. 1578.
 1588. 1595. 1673. 1801.
 1838. 1841. 1854. 1941.
 1991. 1995. 2001. 2042.
 2075. 2083. 2110. 2197.
 2251. 2283. 2322. 2323.
 2324. 2332. 2354. 2372.

2425. 2479. 2480. 2514. Roux. 804.
 2556. 2580. 2595. 2602. Rowley. 3511.
 2654. 2672. 2684. 2722. Rudolphi. 673.
 2728. 2742. 2781. 2789. Ruef. 566.
 2793. 2810. 2837. 2838. Rüte. 351.
 2878. 2879. 2882. 2907. Ruff. 161.
 2975. 2986. 3010. 3049. Rush. 2707.
 3052. 3125. 3128. 3149. Rust. 53. 64. 88. 117. 141.
 3150. 3241. 3244. 3250. 142. 199. 216. 221. 222.
 3279. 3296. 3301. 3347. 314. 364. 538. 578. 581.
 3349. 3351. 3417. 3447. 602. 620. 634. 717. 770.
 3534. 3535. 3561. 3562. 773. 801. 849. 865. 899.
 3570. 3577. 3590. 3646. 937. 940. 941. 968. 975.
 3657. 988. 997. 1005. 1049.
 Ricord. 550. 588. 589. 591. 1080. 1082. 1105. 1151.
 592. 754. 956. 979. 1630. 1154. 1155. 1234. 1327.
 1901. 1904. 1962. 3026. 1347. 1396. 1402. 1469.
 3027. 3101. 3529. 3530. 1498. 1591. 1636. 1641.
 3606. 1752. 1885. 1886. 1947.
 Riecke. 233. 234. 1239. 2067. 1959. 1985. 1996. 2004.
 2308. 2007. 2038. 2043. 2056.
 Rink. 1708. 2067. 2096. 2261. 2269.
 Ritscher. 2984. 2330. 2333. 2646. 2671.
 Ritter. 2028. 2821. 2829. 2841. 3004.
 Ritton. 1349. 3007. 3064. 3065. 3394.
 Riverius. 2245. 3395. 3448. 3602. 3640.
 Rodewald. 2490. 2491. 3654.
 Rösch. 687. 796. 3458.
 Romberg. 1444. 1977.
 Ronander. 1271.
 Roncalli. 2717.
 v. Rosas. 2393. 2861. 2896. Sachs, L. W. 39. 193. 223.
 Rosenstein. 412. 417. 448. 277. 328. 417. 1048.
 665. 1069. 1083. 1301. 1594. 1617. 1662. 2521.
 1302. 1308. 1423. 2497. 2708. 2726.
 2507. 2510. 2546. 3523. Sachse. 2431. 3363.
 3638. Sachse, J. D. W. 2021.
 Rosenstiel. 3621. Sachtleben. 2467.
 Roth. 2142. 2143. 2144. Sainte - Marie. 377. 1584.
 Rothamel. 2430. 1866. 2203. 3318.
 Saint - Yves. 2041.

- Saunders. 2877.
 Sauter. 1334. 2262.
 Saviard. 2688.
 Scarpa. 18. 851. 1452. 2010. 2989.
 Schäffer. 2231. 2512.
 Scheibler. 3168.
 Schindler. 1399.
 Schlegel. 1461. 2867.
 Schlesier. 1936.
 Schlesinger. 3464. 3465.
 Schmalz. 2170.
 Schmalz (in Pirna). 3053.
 Schmidt. 957.
 Schmidt (in Celle.). 3381.
 Schmidt, C. A. (in Berlin). 1831.
 Schmidt, J. A. 9. 187. 220. 254. 258. 885. 1066. 1143. 1310. 1345. 1519. 1522. 1555. 1934. 2035. 2111. 2113. 2130. 2220. 2259. 2603. 3006. 3190. 3191. 3268. 3376. 3543. 3636.
 Schmidt, J. K. 2438. 2968.
 Schmidtman. 821. 1186.
 Schmucker. 257. 682. 1502. 2348.
 Schneider. 32. 146. 147. 235. 441. 628. 1015. 1326. 1443. 1937. 2438. 2657. 2695. 3264. 3265. 3389.
 Schneider, P. 247.
 Schneider, P. J. 3355.
 Schnur. 804.
 Schön. 711. 1945.
 Schönlein. 908. 1035. 1473. 2344.
 Schola clinica Gotting., s. Fuchs u. Himly.
 Schola clinica Lips., s. Clarus.
 Schola clinica Vindob. 2206. 2896. (Vergl. v. Hildenbrand.)
 Schreger. 984. 2060.
 Schröder. 195.
 Schubarth. 25. 255. 287. 329. 381. 461. 486. 558. 623. 699. 759. 778. 824. 833. 839. 868. 881. 1033. 1046. 1064. 1074. 1078. 1090. 1163. 1298. 1331. 1338. 1340. 1343. 1387. 1440. 1476. 1535. 1699. 1734. 1767. 1771. 1810. 1824. 1869. 1876. 2093. 2174. 2357. 2485. 2554. 2995. 3075. 3077. 3078. 3088. 3156. 3224. 3247. 3249. 3300. 3359. 3373. 3525. 3542. 3573. 3579. 3586. 3607. 3626.
 Schult. 3404.
 Schupmann. 1319.
 Schwartz. 2756.
 Schwartze. 533. 679. 1126. 1580. 1737. 1931. 1932. 2081. 2123. 2134. 2345. 3013. 3076. 3123. 3427. 3592.
 Schwarz. 2874.
 Scott. 48. 50. 54.
 Scudamore. 1350.
 Sédillot. 2049.
 Seidler. 3062.
 Seiler. 97. 1434.
 Selig. 2326.

- Selle. 84. 102. 248. 338. 556. 603. 949. 1146. 1178. 1303. 1426. 1596. 2021. 2135. 2181. 2232. 2284. 2575. 2849. 2913. 2947. 3005. 3514.
 Seraphinen-Hospital zu Stockholm. 2754. 2772.
 Serlo. 792.
 Serre. 559. 560. 562. 563. 595.
 Sertürner. 1272.
 Seymour. 3002.
 v. Siebold. 332. 2375.
 v. Siebold d. V. 1003.
 Siedler. 2799.
 Siemerling. 67.
 Silvy. 2542.
 Simon. 219. 2835.
 Simon, J. Fr. 732. 733. 1925.
 Sinogowitz. 387.
 Skoda. 192.
 Sloet v. Oldbruitenborg. 1507.
 Smart, Burleigh-. 2288.
 Smith. 89.
 Smyth. 2351.
 Sobernheim. 262. 291. 463. 466. 501. 1093. 1200. 1614. 2234. 2462. 2779. 3161. 3522. 3581.
 Sommer. 3393.
 Sommervail. 963.
 Sommerville. 1171.
 Soubeiran. 693.
 Spajrani. 3383.
 Spielmann. 317. 393. 1241.
 Spitta. 1447.
 Sprague. 2080. 3071.
 Stahl. 160. 503. 1129. 1362. 2275.
 Stark. 119. 265. 379. 2016. 2546. 2987.
 Stark, J. C. 1783. 2660. 3232. 3440.
 Starke. 2118.
 Stegemann. 2362.
 Stegmayr. 3257.
 Stein. 938. 939. 3593.
 Steinheim. 1330.
 Steinrück. 817.
 Stiebel. 1222. 3222.
 Stieglitz. 2521.
 Störk. 1354. 1385. 1674. 3060. 3189. 3467. 3560. 3571.
 Stokes. 548.
 Stoll. 514. 1193. 1341. 1994. 2215. 3421.
 v. Stosch. 1244.
 Strack. 1662.
 Strahl. 277. 1761. 3157.
 Struve. 1508.
 Stütz. 2242.
 Sulzer. 783.
 Sundelin. 27. 301. 327. 486. 567. 619. 683. 700. 846. 862. 917. 918. 1017. 1021. 1208. 1262. 1283. 1344. 1370. 1377. 1432. 1433. 1527. 1536. 1567. 1590. 1639. 1691. 1698. 1859. 2094. 2173. 2177. 2239. 2243. 2314. 2515. 2747. 2785. 2844. 2880. 2895. 3079. 3096. 3109. 3127. 3215. 3333. 3400. 3434. 3557.
 Suttcliff. 1008.

- Swediaur. 21. 70. 148. 285.
 429. 432. 576. 933. 1483.
 1651. 1781. 2065. 2281.
 3403. 2589. 2992. 3022.
 3313. 3348. 3371. 3445.
 3572.
 van Swieten. 274. 1325.
 1933. 2224. 2964. 3248.
 3264.
 Sydenham. 83. 422. 658.
 1098. 1131. 1359. 1549.
 1667. 1742.
- Trampel. 859.
 Trauttsch. 843. 2463.
 Trinius. 2763.
 Tronchin. 2941.
 Troschel. 2522.
 Troussseau. 323. 841. 2006.
 2237. 2296. 2687. 3372.
 Trümpy. 2965.
 Trusen. 910. 2236.
 Tünnermann. 1905.
 Turnbull. 121. 122. 123.
 3197. 3200. 3202.
 Tyrrel. 2151.

T.

- Taylor. 356.
 Teallier. 525.
 Textor. 1721.
 Thaer. 953. 1998.
 Theden. 1501. 1668.
 Thilenius. 529. 621. 1094.
 3428.
 Thomas. 2752.
 Thompson. 1900. 2954. 3303.
 Thomson. 28. 1022. 1121.
 1339. 1619. 3023.
 Thorstenson. 2442.
 Tissot. 246. 505.
 Tittmann. 2710.
 Tode. 91. 359. 994. 1190.
 1204. 1309. 1582. 1603.
 1812. 1953. 2018. 2513.
 2649. 2949. 3074. 3142.
 3143. 3362. 3367. 3414.
 3549.
 Toel. 293. 2435.
 Töpken. 1062.
 Tott. 2044. 3475.
 Tourtual. 333. 442. 675. 685.
 1657. 1661. 2342. 2343.
 2447. 2615.

U.

- Ullmann. 2312.
 Ulrich. 2922.
 Unzer. 888. 2335. 3043.
 3642.
 Ure. 52. 3624.

V.

- Vallet. 1646.
 Varlez. 902.
 Velpeau. 750.
 Velsen. 2685. 2718.
 Venables. 1653.
 Verducci. 1968.
 du Villards, Carron. 724.
 1724.
 Villars. 2542.
 Vogel. 194. 195. 339. 462.
 617. 618. 928. 942. 959.
 1091. 1092. 1110. 1111.
 1125. 1183. 1199. 1320.
 1346. 1372. 1381. 1382.
 1748. 1784. 2126. 2229.

2368. 2502. 2626. 2627. 3350. 3420. 3470. 3471.
 2730. 2886. 3114. 3152. 3484. 3524. 3580. 3595.
 3155. 3181. 3182. 3299. 3615. 3623. 3629. 3656.
 3424. 3442. 3485. 3533. 3659. 3666.
 3536. 3550. 3578. 3664. Vogt (in Wildbad). 3291.
 Vogel, R. A. 1329. Voigtel. 2870.
 Vogler. 103. 362. 365. 366. Voyers. 1189.
 367. 438. 873. 934. 1058.
 1690. 2104. 2178. 2373.
 2374. 2508. 2678. 2802.
 3122.
- W.**
- Vogt. 24. 43. 68. 174. 184. Wagler. 1829.
 203. 207. 208. 213. 217. Waitz. 239. 2557. 2598.
 252. 253. 266. 271. 294. Walch. 1678.
 299. 342. 343. 350. 351. Wallace. 2300.
 440. 452. 458. 555. 601. Waller. 276.
 703. 740. 767. 791. 802. Wallis. 1352.
 815. 822. 836. 924. 970. Walther. 319. 394. 590. 610.
 991. 1012. 1014. 1038. 613. 627. 689. 691. 774.
 1052. 1087. 1100. 1168. 823. 898. 1065. 1335.
 1191. 1215. 1217. 1228. 1404. 1415. 1970. 2030.
 1230. 1311. 1315. 1323. 2066. 2069. 2070. 2458.
 1358. 1366. 1487. 1569. 2676. 3288.
 1576. 1583. 1686. 1710. Walther. 3032.
 1736. 1758. 1766. 1828. v. Walther. 2309.
 1870. 1871. 1948. 1960. Wardrop. 1013.
 2097. 2103. 2114. 2117. Ware. 3610.
 2227. 2268. 2285. 2305. Weber. 110. 1357.
 2317. 2321. 2350. 2371. v. Wedekind. 51. 1954. 2133.
 2388. 2428. 2466. 2468. 2365. 3483.
 2577. 2579. 2598. 2609. Wedel. 2214. 2662. 3490.
 2619. 2622. 2652. 2668. Wedemeyer. 958.
 2669. 2700. 2713. 2753. Weickard. 5. 116. 168. 421.
 2758. 2766. 2811. 2813. 1398. 1454. 1577. 1669.
 2845. 2847. 2873. 2875. 2131. 2192. 2666. 3207.
 2908. 2914. 2918. 2966. 3344.
 3019. 3020. 3095. 3102. Weinhold. 1793. 1794. 1795.
 3105. 3110. 3111. 3120. 1800. 2005.
 3121. 3134. 3135. 3144. Weisse. 730. 1027.
 3153. 3221. 3287. 3314. Weller. 312. 872. 3823.

- Wendt. 45. 98. 268. 303. 374. 376. 386. 395. 398. 611. 671. 721. 753. 771. 776. 777. 876. 877. 932. 944. 962. 1000. 1206. 1213. 1219. 1220. 1383. 1481. 1506. 1525. 1558. 1679. 1708. 1735. 1843. 1981. 2020. 2025. 2027. 2053. 2071. 2074. 2116. 2208. 2263. 2346. 3443. 2461. 2525. 2604. 2614. 2618. 2629. 2634. 2798. 2827. 2944. 2990. 3050. 3086. 3146. 3186. 3233. 3326. 3435. 3437. 3439. 3515. 3516. 3526. 3639.
 Wendt, Fr. 1348. 1856. 2327.
 Wenzel. 143. 911.
 Wepfer. 180.
 Werlhof. 320. 758. 1001. 1882.
 Werneck. 561. 644. 718. 893. 898. 900. 906. 1606. 1621. 1622. 1888. 1889. 1890. 1986. 2488. 2489. 2962. 3200.
 Wesener. 1755.
- Westring. 936.
 Wetzler. 983.
 Whytt. 1609.
 Wiener Aerzte. 1509.
 Wigand. 2661.
 Wilkinson, E. 76. 277. 383.
 Willan. 2935.
 Williams. 1868. 2963.
 Willis. 1113.
 Withering. 277.
 Witzmann. 547.
 Wolff. 1516. 1988. 2406. 2413. 3426. 3432. 3433.
 Wurzer. 65.
 Wutzer. 1055. 1240. 2120.
 van Wy. 41.
 Wylie. 782.
- Y.**
- St. Yves. 2041.
- Z.**
- Zeller. 50.
 Zittmann. 3316.
 Zollikofer. 1615.

II. Register über die Arzneimittel.

- | | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">A.</p> <p>Abrotanum. I. S. 67.</p> <p>Absinthium. I. S. 68.</p> <p>Acetas Ammonii solutus. I. S. 140.</p> <p>— cupricus cum Aqua. I. S. 519.</p> <p>— Ferri. I. S. 563.</p> <p>— hydrargyros. I. S. 663.</p> <p>— Kali. II. S. 36.</p> <p>— morphicus. II. S. 243.</p> <p>— plumbicus cum Aqua. II. S. 282.</p> <p>— zincicus cum Aqua. II. S. 497.</p> <p>Acetum. I. S. 71.</p> <p>— antisepticum. I. S. 73.</p> <p>— aromaticum. I. S. 73.</p> <p>— bezoardicum. I. S. 73.</p> <p>— commune. I. S. 71.</p> <p>— concentratissimum. I. S. 74.</p> | <p>Acetum concentratum. I. S. 74.</p> <p>— per Frigus concentratum. I. S. 74.</p> <p>— crudum. I. S. 71.</p> <p>— glaciale. I. S. 74.</p> <p>— Lithargyri. II. S. 290.</p> <p>— pestilentielle. I. S. 73.</p> <p>— Plumbi. II. S. 290.</p> <p>— prophylacticum. I. S. 73.</p> <p>— radicale. I. S. 74.</p> <p>— saturninum. II. S. 290.</p> <p>— Vini. I. S. 71.</p> <p>Acidum aceticum. I. S. 74.</p> <p>— arsenicosum. I. S. 255.</p> <p>— benzoicum. I. S. 321.</p> <p>— caïnicum. I. S. 337.</p> <p>— Coerulei berol. I. S. 75.</p> <p>— hydricum dep. I. S. 77.</p> <p>— hydrochloric. I. S. 77.</p> <p>— hydrocyanic. I. S. 75.</p> <p>— lacticum. I. S. 77.</p> <p>— ligneum. I. S. 85.</p> <p>— muriaticum. I. S. 77.</p> |
|--|---|

- Acidum muriaticum oxygenatum. I. S. 463.
 — nitricum. I. S. 80.
 — — concentratum. I. S. 82.
 — — dilutum. I. S. 80.
 — phosphoricum dep. I. S. 83.
 — — ex ossibus. I. S. 83.
 — — siccum. I. S. 83.
 — — vitrificatum. I. S. 83.
 — pyro-lignosum crudum. I. S. 85.
 — — — rectificatum. I. S. 87.
 Acidum Salis communis. I. S. 77.
 — — marini. I. S. 77.
 — stibiosum et stibicum. I. S. 216.
 — succinicum crudum. I. S. 88.
 — — depur. I. S. 89.
 — sulphuricum depurat. I. S. 89.
 — — dilutum. I. S. 91.
 — tannicum. II. S. 465.
 — tartaricum. I. S. 95.
 — Vitrioli rectificatum. I. S. 89.
 — — tenue. I. S. 91.
 — zooticum. I. S. 75.
 Ackerveilchen. II. S. 487.
 Aconitum. I. S. 97.
 Aconitinum. I. S. 100.
 Aerugo. I. S. 515.
 — crystallisata. I. S. 519.
 Aether aceticus. II. S. 178.
 Aether, gephosphorter. I. S. 102.
 — muriaticus. I. S. 101.
 — — alcoholisatus. II. S. 433.
 — nitricus. I. S. 102.
 — — alcoholisatus. II. S. 435.
 — phosphoratus. I. S. 102.
 — sulphurico-phosphoratus Lobsteinii. 2892.
 — sulphuricus. I. S. 103.
 — — ioduratus Magendii. 2158.
 — — phosphoratus. I. S. 102.
 — Vitrioli. I. S. 103.
 Aethiops antimonialis. I. S. 734.
 — martialis. I. S. 584.
 — mercurialis. I. S. 730.
 — mineralis. I. S. 730.
 Aetzammonium. I. S. 140.
 Aetzammoniumflüssigkeit. I. S. 154.
 Aetzkali. II. S. 46.
 — geschmolzenes. II. S. 46.
 — reines. II. S. 48.
 — trocknes. II. S. 48.
 Aetzkalklösung. II. S. 50.
 Aetzlauge. II. S. 50.
 Aetzpulver, londoner. 2257.
 Aetzstein. II. S. 46.
 Agaricum. I. S. 325.
 Agaricus albus. I. S. 325.
 — muscarius. I. S. 106.
 Agtstein. II. S. 448.
 Agtsteinsalz. I. S. 88.
 Alantwurzel. I. S. 551.
 Alaun. I. S. 119.

- Alaun gebrannter. I. S. 128.
 Alaunerde, gereinigte. I. S. 131.
 Alaunzucker. II. S. 364.
 Albumen Ovi. II. S. 223.
 Alcohol Aceti. I. S. 74.
 — ammoniatum. I. S. 162.
 — Martis. I. S. 587.
 — sinápisatum. 3432.
 — Sulphuris. I. S. 390.
 Alkali. II. S. 36.
 — flüchtiges. I. S. 140.
 — volatile siccum. I. S. 144.
 Allium Cepa. I. S. 107.
 — sativum. I. S. 109.
 Aloë lucida. I. S. 109.
 — succotrina. I. S. 109.
 Aloëelixir, saures. I. S. 116.
 Althaea. I. S. 116.
 Alumen. I. S. 119.
 — calcinatum. I. S. 128.
 — crudum. I. S. 119.
 — ustum. I. S. 128.
 Alumina depurata. I. S. 131.
 — kalico - sulphurica. I. S. 119.
 Amanita muscaria. I. S. 106.
 Amber, grauer. I. S. 131.
 Amberkraut. II. S. 147.
 Ambra flava. II. S. 448.
 — grisea. I. S. 131.
 — liquida. II. S. 447.
 Ameisen. I. S. 603.
 Amerikanisches Bitterholz. II. S. 315.
 Amidon. I. S. 194.
 Ammoniacum. I. S. 140.
 — — cuprico - sulphuricum. I. S. 525.
 Ammoniacum depur. I. S. 134.
 Ammoniak. I. S. 140.
 — arseniksaures. I. S. 144.
 — flüssiges hydrothionichtsaures I. S. 177.
 Ammoniakgummi, gereinigtes. I. S. 134.
 Ammoniakkupfer. I. S. 523.
 — — schwefelsaures. I. S. 525.
 Ammoniakliniment, seifenhaltiges. 326.
 Ammoniaksilber, salzsaures. I. S. 233.
 Ammonii acetici Liquor. I. S. 140.
 — carbonici Liquor. I. S. 148.
 — — pyro - oleos Liquor. I. S. 153.
 — caustici Liquor. I. S. 154.
 — Liquor anisatus. I. S. 160.
 — — vinosus. I. S. 162.
 — succinici Liquor. I. S. 173.
 — sulphurati Liquor. I. S. 177.
 Ammonium. I. S. 140.
 — aëratum. I. S. 144.
 — arsenicic. I. S. 144.
 — brenzlich-öliges kohlensaures. I. S. 149.
 — carbonicum empyreumatic. I. S. 149.
 — carbonicum pyrooleosum. I. S. 149.

- Ammonium causticum. I. S. 140.
 — flüssiges essigsaures. I. S. 140.
 — kohlensaures. I. S. 144.
 — liquidum causticum. I. S. 154.
 — mite. I. S. 144.
 — muriaticum. I. S. 162.
 — — — ferratum. I. S. 165.
 — muriatic. ferruginosum. I. S. 565.
 — muriaticum hydrargyrum. I. S. 664.
 — muriaticum martiatum. I. S. 565.
 — nitricum. I. S. 173.
 — — — cum Oxydo hydrargyroso. I. S. 726.
 — salpetersaures. I. S. 173.
 — salzsaures. I. S. 162.
 — subcarbonicum. I. S. 144.
 Ammoniumflüssigkeit, anishaltige. I. S. 160.
 — — — bernsteinsaure. I. S. 173.
 — — — brenzlich-ölige kohlensaure. I. S. 153.
 Ammoniumflüssigkeit, essigsaure. I. S. 140.
 — — — — geistige. I. S. 162.
 — — — — weinige. I. S. 162.
 Ammonium - Schwefelleber. I. S. 177.
 Amygdalae amarae. I. S. 178.
 — — — dulces. I. S. 186.
 Amygdalarum Syrupus. I. S. 188.
 Amygdalina. I. S. 185.
 Amygdalinum. I. S. 185.
 Amylum. I. S. 194.
 — — — Marantae. I. S. 196.
 Andorn, weisser. II. S. 145.
 Anethum Foeniculum. I. S. 197.
 — — — graveolens. I. S. 199.
 Angelicae radix. I. S. 199.
 Angelikwurzel. I. S. 199.
 Angusturae cortex. I. S. 202.
 Angusturarinde. I. S. 202.
 Anis, gemeiner. I. S. 204.
 Anisum stellatum. I. S. 204.
 — — — vulgare. I. S. 204.
 Antimonii chlorati Liquor. I. S. 207.
 Antimonium. I. S. 207.
 — — — crudum praep. I. S. 218.
 — — — diaphoreticum ablutum. I. S. 216.
 — — — hydrosulphurat. luteum. I. S. 209.
 — — — hydrosulphurat. rubrum. I. S. 214.
 — — — oxydatum album. I. S. 216.
 — — — sulphuratum nigrum. I. S. 218.
 — — — tartarizat. I. S. 221.
 Anthrakokali, einfaches. I. S. 205.
 — — — simplex. I. S. 205.
 — — — sulphurat. I. S. 207.
 Aqua Acetatis Ammoniae. I. S. 140.

- Aqua Amygdalarum amararum concentrata. I. S. 181.
- Amygdalarum amararum diluta. I. S. 184.
- antihysterica Pragensis. 677.
- antimiasmatica composita. 1476.
- antimiasmatica Koechlini s. Beisseri. 1475.
- antipsorica Clari. 1964.
- argentea. I. S. 663.
- arsenical. Pearsoni. 2659.
- benedicta Rulandi. I. S. 232.
- Calcariae. I. S. 354.
- Calcis vivae. I. S. 354.
- Chlori. I. S. 463.
- discussoria Vogleri. 362.
- Ferri hydriodati Pierquini. 1628.
- foetida Pragensis. 677.
- grisea. I. S. 708.
- hydriod. Pierquini. 1629.
- Laurocerasi. II. S. 108.
- laxativa Mannagettae. II. S. 425.
- laxativa Viennensis. II. S. 425.
- Luciae. 310.
- mercurialis balsamica Plenckii. 2008.
- metallorum. I. S. 663.
- Nicotianae Nosocom. Ludovic. Paris. 2748.
- ophthalmica coelestis. 1452.
- ophthalmica coerulea. 1452.
- ophthalm. Conradi. 1940.
- Aqua ophthalmica Plenckii. 3649.
- ophthalmica saphirina. 1452.
- oxymuriatica. I. S. 463.
- phagedaenica. 1963.
- — — nigra Rustii. 2007.
- Plumbi. II. S. 295.
- saphirina Taylori. 356.
- saturnina. II. S. 295.
- temperans Anglorum. 2520.
- vegeto-mineralis Goulardi. II. S. 296.
- viridis Hartmanni. 1458.
- vulneraria Thedenii. I. S. 95.
- Aquila alba. I. S. 697.
- Arabisches Gummi. II. S. 162.
- Arcanum duplicatum. II. S. 82.
- Ragoloi contra Epilepsiam. 3563.
- Waitzii contra Epilepsiam. 3598.
- Argentum. I. S. 233.
- ammoniato-muriaticum. I. S. 233.
- chloratum. I. S. 234.
- cyanogenatum. I. S. 235.
- hydrocyanicum. I. S. 235.
- iodatum. I. S. 235.
- liquidum. I. S. 663.
- muriaticum. I. S. 234.
- nitricum fusum et crystallis. I. S. 236.
- oxydatum. I. S. 244.

- Argentum oxyd. hydroiodicum. I. S. 235.
 — purum. I. S. 244.
 — salitum. I. S. 234.
 — vivum. I. S. 663.
 Argilla. I. S. 131.
 — ferruginea rubra. I. S. 327.
 Arnicae extractum. I. S. 251.
 — flores. I. S. 245.
 — oleum aether. I. S. 254.
 — radix. I. S. 250.
 — tinctura. I. S. 253.
 Arrowmehi. I. S. 196.
 Arrow-root. I. S. 196.
 Arsenicum. I. S. 255.
 — album. I. S. 255.
 — iodatum. I. S. 263.
 — oxydatum album. I. S. 255.
 — sulphuratum flavum. I. S. 262.
 Arsenik, weisser. I. S. 255.
 Arsenikjodüre. I. S. 263.
 Arsenikoxyd, weisses. I. S. 255.
 Arseniksolution, Brera's. 631.
 — — Fowler's. 629.
 — — Harless'. 632.
 — — Heim's. 630.
 Artemisia Abrotanum. I. S. 67.
 — Absinthium. I. S. 68.
 — Contra. I. S. 466.
 — santonica. I. S. 466.
 Artemisiae vulgaris radix. I. S. 263.
 Asa dulcis. I. S. 319.
 — foetida. I. S. 265.
 Asand, stinkender. I. S. 265.
 — wohlriechender. I. S. 319.
 Aselli jecinoris oleum. I. S. 273.
 Asparagi. I. S. 275.
 Asseln. II. S. 161.
 Assion. II. S. 228.
 Augenstein, Beer's. I. S. 520.
 Aurantii flores. I. S. 276.
 — folia. I. S. 277.
 — fructus immaturi. I. S. 279.
 Aurantiorum corticum flavedo. I. S. 279.
 Aurantium. I. S. 276.
 Aurin. I. S. 634.
 Auripigmentum. I. S. 262.
 Aurum. I. S. 282.
 — chlorato-natronatum. I. S. 284.
 — chloratum. I. S. 282.
 — cyanogenat. I. S. 287.
 — hydrocyanic. I. S. 287.
 — muriaticum. I. S. 282.
 — — natronatum. I. S. 284.
 — oxydatum. I. S. 288.
 — purum divisum. I. S. 288.
 — stannatum. I. S. 288.
 Austerschalen, präparirte. I. S. 340.
 Avena. I. S. 288.
 — excorticata. I. S. 288.
 Azotsäure. I. S. 80.
- B.**
- Baccae Lauri. II. S. 111.
 — Vitis viniferae recent. II. S. 492.

- Backenpillen, Kämpf's rothe 1676.
 Bärentraubenblätter. II. S. 475.
 Bärlappkraut. II. S. 123.
 Bärlappsamen. II. S. 124.
 Baldrianwurzel, officinelle. II. S. 478.
 Ballotaelanatae herba. I. S. 291.
 Ballote, wollige. I. S. 291.
 Balneum cum Ferro hydriodato Pierquini. 1631.
 — gelatinoso-sulphuratum Dupuytreni. 1777.
 — hydriodatum Pierquini. 1631.
 — ioduratum Lugolii. 2160.
 Balsam, schwarzer peruvianischer. I. S. 299.
 Balsamum Arcaei. 1552.
 — aromaticum aether. Augustini. 1104.
 — Copaivae. I. S. 292.
 — indicum nigrum. I. S. 299.
 — mercuriale. I. S. 710.
 — Metensium. 1456.
 — ophthalmicum St. Yvesii. 2041.
 — peruvianum nigrum. I. S. 299.
 — terebinthinatum Frahmii. 2949.
 — viride. 1456.
 — vitae externum. II. S. 275.
 — vitae Hoffmanni. 775.
 Bardanae radix. I. S. 305.
 Baryum chloratum. I. S. 306.
 — iodatum. I. S. 309.
 Baryta. I. S. 306.
 — hydroiodica. I. S. 309.
 — muriatica. I. S. 306.
 Beer's Augenstein. I. S. 520.
 Beifusswurzel. I. S. 263.
 Belladonnae herba. I. S. 309.
 — radix. I. S. 315.
 Belladonnapflaster, Planche's 806.
 Benzoë. I. S. 319.
 Benzoëblumen. I. S. 321.
 Benzoësäure. I. S. 321.
 Bergöl. II. S. 250.
 Bernstein. II. S. 448.
 Bernsteinsäure, gereinigte. I. S. 88.
 — — rohe. I. S. 88.
 Bernsteinsalz, flüchtiges. I. S. 88.
 Bertramschamillenwurzel. II. S. 312.
 Bertramswurzel. II. S. 312.
 Bestucheff'sche Nerventinktur. I. S. 572.
 Bibergeil. I. S. 405.
 Bibernellwurzel, weisse. II. S. 260.
 Bichloretum Hydrargyri. I. S. 679.
 Bier, bitteres. 2919.
 Bilis bovina. I. S. 559.
 Bisam. II. S. 164.
 Bismuthum nitricum praecipitat. I. S. 322.
 Bisulphuretum Carbonii. I. S. 390.
 Bittererde II. S. 127.
 — kohlensäure. II. S. 129.
 Bitterholz, amerik. II. S. 315.

- Bitterklee. II. S. 472.
 Bittermandelöl, ätherisches. I. S. 184.
 Bittermandelwasser, concentrirtes. I. S. 181.
 Bittermandelwasser, verdünntes. I. S. 184.
 Bittersalz. II. S. 134.
 Bittersüsstengel. I. S. 545.
 Blättererde, krystallisirte. II. S. 180.
 Blankenheimer Thee. I. S. 619.
 Blaud's von Guibourt verbesserte Eisenpillen. 1645.
 Blaue Pillen der Engländer. 2048.
 Blauholz. I. S. 358.
 Blausäure. I. S. 75.
 Blaustein. I. S. 528.
 Blaustoffeisen. I. S. 573.
 Blaustoffgold. I. S. 287.
 Blaustoffkalium. II. S. 58.
 Blaustoffquecksilber. I. S. 669.
 Blaustoffzink. II. S. 500.
 Blei. II. S. 282.
 Blei, essigsäures. II. S. 282.
 — hydriodsaures. II. S. 297.
 — kohlenaures. II. S. 296.
 Bleiasche. II. S. 298.
 Bleichpulver. I. S. 342.
 Bleiessig. II. S. 290.
 Bleiextrakt. II. S. 290.
 Bleiflüssigkeit, basische essigsäure. II. S. 290.
 Bleiglätte. II. S. 299.
 Bleioxyd, essigsäures. II. S. 282.
 — kohlen. II. S. 296.
 — rothes. II. S. 300.
 Bleioxyd, verglastes. II. S. 299.
 Bleioxyde. II. S. 298.
 Bleisafran. II. S. 300.
 Bleiwasser. II. S. 295.
 Bleiweiss. II. S. 296.
 Bleizinnober. II. S. 300.
 Bleizucker. II. S. 282.
 Blitzpulver. II. S. 124.
 Blue pils der Engländer. 2048.
 Blutholz. I. S. 358.
 Blut-Lungenmoos. II. S. 115.
 Blutwurzel. II. S. 470.
 Bohne, brasilianische II. S. 248.
 Boletus Laricis. I. S. 325.
 Boli deprimentes Brerae. 1521.
 — emmenagogi martiales Brerae. 3218.
 — resolventes et deprimentes Brerae. 1993.
 Bolus armena. I. S. 327.
 — armenischer. I. S. 327.
 — drasticus Brerae. 1837.
 — rother. I. S. 327.
 Boras natricus cum Aqua. II. S. 181.
 Borax. II. S. 181.
 Boraxweinstein. II. S. 67.
 Brasilianische Bohne. II. S. 248.
 Braunsteinoxyd, schwarzes. II. S. 141.
 Brechnuss. II. S. 210.
 Brechnussalkaloïd. II. S. 215.
 Brechstoff. II. S. 27.
 Brechwein. I. S. 232.
 Brechweinstein. I. S. 221.
 Brechweinsteinpflaster. 543.
 Brechwurzel. II. S. 17.
 Brechwurzelalkaloïd. II. S. 27.

- Brennessel. II. S. 475.
 Brera's Arseniksolution. 631.
 Bromeisen. I. S. 569.
 Brometum hydrargyricum. I. S. 668.
 — hydrargyrosus. I. S. 669.
 Bromkalium. II. S. 57.
 Bromquecksilber, doppeltes. I. S. 668.
 — — einfaches. I. S. 669.
 — — in maximo. I. S. 668.
 Brucin. I. S. 329.
 Brucina. I. S. 329.
 Brucinum. I. S. 329.
 Brucium. I. S. 329.
 Brunner's Nieswurzelauflguss. 1850.
 Brustalandwurzel. I. S. 551.
 Brustkräuter, Lieber'sche. I. S. 619.
 Brustpulver, Selle's. 949.
 Brustwurzel. I. S. 199.
 Bryoniae radix. I. S. 330.
 Bubon. I. S. 614.
 Buccublätter. I. S. 544.
 Buchublätter. I. S. 544.
 Bulbus Colchici. I. S. 481.
 — Squillae. II. S. 399.
 Burgundisches Pech. II. S. 265.
 Butterblume. II. S. 466.
 Butyrum Antimonii. I. S. 207.
 — Zinci. II. S. 498.
- C.**
- Cacao. I. S. 332.
 Cadmium sulphuricum. I. S. 333.
 Cajeputöl. I. S. 334.
 Cäincaensäure. I. S. 337.
 Cäincawurzelrinde. I. S. 336.
 Calamus aromaticus. I. S. 337.
 Calcareum sulphuratum stibiatum. I. S. 351.
 Calcaria. I. S. 340.
 — carbonica. I. S. 340.
 — chlorata. I. S. 342.
 — muriatica. I. S. 348.
 — oxymuriatica. I. S. 342.
 — sulphurata. I. S. 350.
 — sulphurato-stibiata. I. S. 351.
 — viva. I. S. 353.
 Calendula officinalis. I. S. 356.
 Calomel. I. S. 697.
 Calx. I. S. 340.
 — Antimonii cum Sulphure Hoffm. I. S. 351.
 — Arsenici. I. S. 255.
 — caustica. I. S. 353.
 — pura. I. S. 353.
 — salita. I. S. 348.
 — usta. I. S. 353.
 — viva. I. S. 353.
 Campecheholz. I. S. 358.
 Campechianum lignum. I. S. 358.
 Camphora. I. S. 360.
 Cancrorum lapides. I. S. 340.
 Caneel. I. S. 474.
 Canella ceylanica. I. S. 474.
 Caniranium. I. S. 329.
 Cannabis semina. I. S. 373.
 Cantharides. I. S. 375.
 Capsici annui fructus. I. S. 380.
 Carabe. II. S. 448.
 Carabesalz. I. S. 88.
 Carageen-Chokolade. 1716.

- Carageentang. I. S. 604.
 Carbo animalis. I. S. 383.
 — Carnis. I. S. 383.
 — ligni. I. S. 385.
 — praeparatus. I. S. 385.
 — purus. I. S. 385.
 — Spongiae. II. S. 438.
 — Tiliae. I. S. 385.
 — vegetabilis. I. S. 385.
 Carbonas Ammoniae solidus.
 I. S. 144.
 — Calcis. I. S. 340.
 — Ferri. I. S. 578.
 Carboneum sulphuratum. I.
 S. 390.
 Cardui benedicti herba. I.
 S. 392.
 Caricae. I. S. 395.
 Caricis arenariae radix. I.
 S. 394.
 Caro vitulina tosta. I. S. 383.
 Carvi semina. I. S. 396.
 Caryophyllatae radix. I. S. 397.
 Caryophylli aromat. I. S. 399.
 Cascarillae cortex. I. S. 401.
 Cascarillrinde. I. S. 401.
 Cassia cinnamomea. I. S. 404.
 Castoreum. I. S. 405.
 Catalpa. I. S. 408.
 Cataplasma acre Kerndlii. 149.
 — ad Cancrum apertum
 Disp. Fuld. 1405.
 — ammoniacale Vogleri.
 366.
 — antisepticum Reussii.
 1227.
 — cephalicum Vogleri.
 365.
 — ex Bryonia Plenckii.
 860.
 Catechu. I. S. 409.
 Caules Dulcamarae. I. S. 545.
 Causticum ammoniacale Gon-
 dreti. 324.
 — antimoniale. I. S. 207.
 Centaurii minoris herba et
 summitates. I. S. 413.
 Cera ad dentes cariosos Clari.
 1127.
 — alba et flava. I. S. 414.
 Ceratum ophthalmicum. 433.
 — saponaceum Pottii.
 3030.
 Cerevisia diuretica anglica.
 3425.
 Cerussa alba. II. S. 296.
 Cervi Cornu. I. S. 416.
 Cetaceum. I. S. 419.
 Cetrarinum. II. S. 117.
 Chamomillae vulg. flores. I.
 S. 421.
 Chelidonii herba. I. S. 426.
 Chenopodium ambrosioides. I.
 S. 428.
 — — mexicanum. I.
 S. 428.
 — — olidum. I. S. 429.
 Chimophilae umbellatae folia.
 I. S. 430.
 Chinae cortex. I. S. 431.
 — tinctura composita. I.
 S. 449.
 Chinarinde. I. S. 431.
 Chinatiuktur, zusammenge-
 setzte. I. S. 449.
 Chinin. I. S. 449.
 — citronsaures. I. S. 450.
 — essigsaures. I. S. 450.
 — gerbsaures. I. S. 459.

- Chinin, gerbstoffs. I. S. 459.
 — phosphors. I. S. 451.
 — resinöses. I. S. 459.
 — salzsaures. I. S. 450.
 — schwefels. I. S. 451.
 — tanninsaures. I. S. 459.
 Chininalkohol, Magendie's. 1266.
 Chininsyrup, Magendie's. 1264.
 Chininum. I. S. 449.
 Chininwein, Magendie's. 1265.
 Chinioïdinum. I. S. 459.
 Chinium. I. S. 449.
 — aceticum. I. S. 450.
 — citricum. I. S. 450.
 — muriaticum. I. S. 450.
 — phosphoric. I. S. 451.
 — resinosum. I. S. 459.
 — sulphuricum. I. S. 451.
 — tannicum. I. S. 459.
 Chlor, flüssiges. I. S. 463.
 Chlorbaryum. I. S. 306.
 Chlorcalcium. I. S. 348.
 Chloretum Auri acidum. I. S. 282.
 — — cum Chloreto Natrii. I. S. 284.
 — Calcii. I. S. 348.
 — Ferri. I. S. 570.
 — Hydrargyri. I. S. 697.
 Chlorgold. I. S. 282.
 Chlorgoldnatrium. I. S. 284.
 Chlorig aqua. I. S. 463.
 Chloris calcicus. I. S. 342.
 Chlorkalk. I. S. 342.
 Chlornatrium. II. S. 196.
 Chlornatrum. II. S. 194.
 Chlorquecksilber in maximo. I. S. 679.
 Chlorquecksilber in minimo. I. S. 697.
 Chlorsilber. I. S. 234.
 Chlorstibiumflüssigkeit. I. S. 207.
 Chloruretum Argenti. I. S. 234.
 — — et Ammoniaci. I. S. 233.
 Chlorwasser. I. S. 463.
 Chlorwasserstoffsäure. I. S. 77.
 Chlorzink. II. S. 498.
 Chocolata cum Ferro hydrato Pierquini. 1627.
 Chokolade, weisse. 1716.
 Chrestien's Goldpastillen. 713.
 — Goldpillen. 715.
 Christwurzel. I. S. 653.
 Cinae semina. I. S. 466.
 Cinchonia. I. S. 462.
 Cinchonin. I. S. 462.
 — schwefelsaures. I. S. 462.
 Cinchoninsulphat. I. S. 462.
 Cinchoninsyrup, Magendie's. 1280.
 Cinchoninum. I. S. 462.
 — sulphuricum. I. S. 462.
 Cinchoninwein, Magendie's. 1281.
 Cinchonium. I. S. 462.
 Cinchonstoff. I. S. 462.
 Cinis Plumbi. II. S. 298.
 Cinnabaris factitia. I. S. 732.
 Cinnamomum. I. S. 474.
 — chinense. I. S. 404.
 — indicum. I. S. 404.
 Cirillo's Quecksilbersalbe. 1975.

- Cirillo's Quecksilbersalbe, von Hufeland verbessert. 1976.
 Citrone. I. S. 476.
 Citronenmelisse. II. S. 151.
 Citrus medica. I. S. 476.
 Clavus cerealis. II. S. 414.
 — secalis. II. S. 414.
 Clyster anodynus Vogleri. 2802.
 — anticolicus Vogleri. 873.
 Coccionella. I. S. 479.
 — septempunctata. I. S. 478.
 Cochenille. I. S. 479.
 Cochleariae Armoraciae radix. I. S. 479.
 — officinalis herba rec. I. S. 481.
 Coeruleum parisiense. I. S. 573.
 Colchici bulbus s. radix. I. S. 484.
 — flores. I. S. 486.
 — semina. I. S. 486.
 Colchicum autumnale. I. S. 484.
 Colcothar Vitrioli. I. S. 583.
 Colla animalis. I. S. 626.
 — Piscium. I. S. 627.
 Collutorium acidulum Swe-
 diauri. 2477.
 Collyrium adstringens luteum
 Fischeri. 357.
 — Lanfrancii. 648.
 Colocynthis pulpa. I. S. 487.
 Colombo. I. S. 491.
 Colophonium. II. S. 267.
 Columba. I. S. 491.
 Columbo radix. I. S. 491.
 Conchae praeparatae. I. S. 340.
 Coni Lupuli. I. S. 660.
 Conii herba. I. S. 495.
 Contrayervae radix. I. S. 504.
 Copaivabalsam. I. S. 292.
 Copaivaharz. I. S. 298.
 Corallina corsicana. I. S. 655.
 Cornu Cervi. I. S. 416.
 — — ustum album. I. S. 419.
 Corsikanisches Moos. I. S. 655.
 Cortex adstringens brasiliensis. I. S. 505.
 — Cascarillae. I. S. 401.
 — Chinae. I. S. 431.
 — Mezerei. II. S. 156.
 — peruvianus. I. S. 431.
 — Quercus junior. II. S. 318.
 — radices Caincae. I. S. 336.
 — radices Granati rec. I. S. 630.
 — Salicis. II. S. 368.
 — Sassafras. II. S. 397.
 — Simarubae. II. S. 429.
 — Ulmi interior. II. S. 474.
 Cremor Tartari. II. S. 88.
 — — Borace solubilis. II. S. 67.
 Creosotum. II. S. 94.
 Creta alba. I. S. 340.
 — praeparata. I. S. 340.
 Crocus. I. S. 506.
 — Martis adstringens. I. S. 583.
 — Martis aperitivus. I. S. 578.
 — Saturni. II. S. 300.

Crotonis oleum. I. S. 509.
 Crystalli Tartari. II. S. 88.
 — Veneris. I. S. 519.
 Cubebae. I. S. 513.
 Cubebenpfeffer. I. S. 513.
 Cupri ammoniato - muriatici
 Liquor. I. S. 523.
 Cuprum. I. S. 515.
 — aceticum basicum. I.
 S. 515.
 — aceticum neutrale. I.
 S. 519.
 — aluminatum. I. S. 520.
 — ammoniato - sulphuri -
 cum. I. S. 525.
 — ammoniatum. I. S. 523.
 — subaceticum. I. S. 515.
 — sulphuricum. I. S. 528.
 Cyaneisenkalium, einfaches. II.
 S. 56.
 Cyangold. I. S. 287.
 Cyankalium. II. S. 58.
 Cyansilber. I. S. 235.
 Cyanquecksilber. I. S. 669.
 Cyanuretum Auri. I. S. 287.
 — ferro - zincicum. II.
 S. 501.
 — Mercurii. I. S. 669.
 — potassicum. II. S. 58.
 — Zinci. II. S. 500.
 Cyanzink. II. S. 500.
 Cydonium. I. S. 533.

D.

Dacrydium. II. S. 398.
 Datura Stramonium. II. S. 444.
 Decoctum album Sydenh. 1131.

Decoctum Chinae factitiae Hu-
 felandi. 3240.
 — Felsii. 3317.
 — pectorale incitans
 Brerae. 3044.
 — Pollini. 2218.
 — Zittmanni. 3316.
 Deutobromuretum Mercurii. I.
 S. 668.
 Deutoioduretum Hydrargyri. I.
 S. 675.
 Diagrydion. II. S. 398.
 Dictamni albi radix. I. S. 535.
 Digitalis purpureae folia. I.
 S. 536.
 Dill. I. S. 199.
 Diosmae crenatae folia. I.
 S. 544.
 Dippel'sches Oel. II. S. 220.
 Diptamwurzel. I. S. 535.
 Doppelt - Bromquecksilber. I.
 S. 668.
 Doppelt - Chlorquecksilber. I.
 S. 679.
 Doppelt - Jodquecksilber. I.
 S. 675.
 Drageae Keyseri. 1877.
 Dreifaltigkeitsblume. II. S. 487.
 Dulcamarae caules. I. S. 545.
 Dzondi's Sublimatpillen. 1923.

E.

Eau de Luce. 310.
 — médicinale d'Husson. 1351.
 Eberraute. I. S. 67.
 Eberreis. I. S. 67.
 Ehrenpreiskraut. II. S. 487.

- Eibenbaumblätter. II. S. 469.
 Eibisch. I. S. 116.
 Eicheln, gebrannte, geröstete.
 II. S. 321.
 Eichenmistel. II. S. 491.
 Eichenrinde, junge. II. S. 318.
 Eidotter. II. S. 224.
 Eigelb. II. S. 224.
 Einreibungs- und Entziehungskur, Rust's. 2056.
 Eisen. I. S. 563.
 — äpfelsaures. I. S. 586.
 — essigsaures. I. S. 563.
 — — mit Eisenoxydhydrat. I. S. 583.
 — gepulvertes. I. S. 587.
 — grünes salzsaures. I. S. 570.
 — kohlensaures. I. S. 578.
 — schwefels. I. S. 592.
 — weinsteinsaures. I. S. 596.
 Eisenbromid. I. S. 569.
 Eisenextrakt, äpfelsaures. I. S. 586.
 Eisenfeile, präparirte. I. S. 587.
 Eisenflüssigkeit, salpetersaure. I. S. 578.
 Eisenhut. I. S. 97.
 Eisenkali, blausaures. II. S. 56.
 Eisenmohr. I. S. 584.
 Eisenöl. I. S. 572.
 Eisenoxyd, arsensaures. I. S. 568.
 — braunes. I. S. 578.
 — bromwasserstoffsaureres. I. S. 569.
 — flüssiges salpetersaures. I. S. 578.
 Eisenoxyd, hydrionsaures. I. S. 574.
 — rothes. I. S. 583.
 — salzsaures. I. S. 571.
 — rothes salzsaures. I. S. 571.
 Eisenoxydhydrat. I. S. 582.
 Eisenoxydlösung, salzsaure. I. S. 572.
 Eisenoxydul, blausaures. I. S. 573.
 — hydrionsaures. I. S. 574.
 — phosphorsaures. I. S. 585.
 — salzsaures. I. S. 570.
 — schwarzes. I. S. 584.
 Eisenoxydulpillen, Vallet's. 1646.
 Eisenphosphat. I. S. 585.
 Eisenpillen, Blaud's, von Guibourt verbesserte. 1645.
 Eisensafran, brauner, eröffnender. I. S. 578.
 — rother, zusammenziehender. I. S. 583.
 Eisensalmiak. I. S. 565.
 Eisentinktur, ätherische essigsaure. I. S. 564.
 Eisenvitriol. I. S. 592.
 Eisenweinstein. I. S. 596.
 Eisenweinsteinkugeln. I. S. 598.
 Eiweiss. II. S. 223.
 Elaterina. I. S. 549.
 Elaterium. I. S. 548.
 Electrum. II. S. 448.
 Electuarium anthelminthicum Bremseri. 1305.
 Electuarium anthelminthic. Hufelandi. 1304.

- Electuarium anthelminthicum Pharm. Hannov. 1306.
 Electuarium anthelminthicum Rosensteinii. 1302.
 Electuarium anthelminthicum Sellii. 1303.
 Electuarium anthelminthicum Störkii. 3571.
 — antiphlogisticum Wendtii. 3516.
 — dentifricium Hamburgense. 2395.
 — deobstruens Swediauri. 3348.
 — e Senna Pharm. mil. Bor. 3059.
 — eccoproticum. II. S. 424.
 — lenitiv. II. S. 424.
 — mundificans Himlyi. 465. 2139.
 — tonicum resolvens Brerae. 1599.
 Elemi. I. S. 550.
 Elemiharz. I. S. 550.
 Elixir acidum Halleri. I. S. 93.
 — anticatarrhale Hufelandi. 1060.
 — Aurantior. compos. 705.
 — balsamicum Francogalorum. 748.
 — balsamicum Hoffmanni. 704.
 — proprietatis acidum s. Paracelsi. I. S. 116.
 — roborans s. Roberti Whyttii. I. S. 449.
 — temperatum Hoffmanni. 704.
 — viscerale Hoffmanni. 704.
 Elix. viscerale Pharm. Bor. 705.
 — Vitrioli Mynsichti. I. S. 94.
 Emetin, gereinigtes. II. S. 27.
 Emetina depurata. II. S. 27.
 Emetinplätzchen, Magendie's. 2212.
 Emetinsyrup, Magendie's. 2211.
 Emetinum. II. S. 27.
 Emplastrum ad Lupum. 1459.
 — Ammoniaci. 259.
 — Calcariae piceum. 926.
 — consolidans. 3024.
 — Capucinatorum. 1571.
 — de Labdano. 2952.
 — diaphoreticum Mynsichti. 260.
 — electricum Harringtoni. 596.
 — foetidum Schmuckeri. 682.
 — fuliginosum Bernhardi. 1729.
 — ischiadicum. 1570.
 — resolvens. 1459.
 — — Schmuckeri. 257. 682.
 — stomachicum Pharm. Austr. vet. 2952.
 — Tartari emetici. 543.
 — terebinthinatum Thompsoni. 2954.
 — universale Waltheri. 3032.
 Emulsio oleosa Pharm. mil. Bor. 415.
 — papaverina. 2866.
 Engelkraut. I. S. 245.
 Engelsüßswurzel. I. S. 199.

- Engelwurzel. I. S. 199.
 Englisches Salz. II. S. 134.
 Ens Martis. I. S. 565.
 Enulae radix. I. S. 551.
 Enzianstoff. I. S. 625.
 Enzianwurzel, rothe. I. S. 623.
 Epsomer Salz. II. S. 134.
 Equisetum arvense. I. S. 554.
 Erdrauchkraut. I. S. 610.
 Ergota. II. S. 414.
 Eselsgurkenextrakt. I. S. 548.
 Eselsgurkensaft. I. S. 548.
 Eselskürbissaft. I. S. 548.
 Essentia Chenopodii olidi.
 1169.
 — Terebinthinae. II. S.
 275.
 Essig, concentrirter. I. S. 74.
 — gemeiner. I. S. 71.
 — roher. I. S. 71.
 Essigäther. II. S. 178.
 Essignaphtha. II. S. 178.
 Essigsäure. I. S. 75.
 Euphorbium. I. S. 555.
 Euphorbiumharz. I. S. 555.
 Extractum Arnicae. I. S. 251.
 — Catechu. I. S. 409.
 — catholicum. II. S. 340.
 — Elaterii. I. S. 548.
 — Ferri malici. I. S. 586.
 — — pomati. I. S. 586.
 — Ipecacuanh. II. S. 27.
 — Lactuae. II. S. 103.
 — — virosae. II. S.
 105.
 — panchymagogum Crol-
 lii. II. S. 340.
 — Plumbi. II. S. 290.
 — Rhei compositum. II.
 S. 340.
 Extractum Saturni. II. S. 290.
 — thebaicum. II. S. 228.
- F.**
- Faba Pichurim. II. S. 248.
 — Sancti Ignatii. II. S. 5.
 Faecula. I. S. 194.
 — Marantae arundinaceae
 s. indicae. I. S. 196.
 Fallkraut. I. S. 245.
 Farfarae Folia. I. S. 558.
 Farina avenacea. I. S. 290.
 — Hordei praeparata. I. S.
 658.
 — sem. Lini. II. S. 118.
 Farrnkrautwurzel. I. S. 599.
 Feigen. I. S. 395.
 Fel Bovis. I. S. 559.
 Fel Tauri. I. S. 559.
 Feldkümmelkraut. II. S. 428.
 Fenchel. I. S. 197.
 Fenchelholz. II. S. 397.
 Ferri acetici Tinctura aetherea.
 I. S. 564.
 — nitrici Liquor. I. S. 578.
 — oxydati hydrato - acetici
 Liquor. I. S. 583.
 — perchlorati Liquor. I. S.
 572.
 Ferrum. I. S. 563.
 — aceticum oxydatum. I.
 S. 563.
 — alcoholisatum. I. S.
 587.
 — ammoniacale. I. S.
 565.
 — ammoniatum. I. S.
 565.
 — arsenicicum. I. S. 568.

- Ferrum bromatum.** I. S. 569.
 — carbonatum. I. S. 632.
 — carbonicum. I. S. 578.
 — chloratum. I. S. 570.
 — cyanogenatum. I. S. 573.
 — hydrico - aceticum in aqua. I. S. 583.
 — hydriodicum. I. S. 574.
 — hydrobromicum oxydatum. I. S. 569.
 — iodatum. I. S. 574.
 — kalico - tartaricum. I. S. 596.
 — oxydatum fuscum. I. S. 578.
 — — hydricum ad modum Bertholdi parat. I. S. 582.
 — oxydat. muriat. I. S. 571.
 — — — rubrum. I. S. 571.
 — — rubrum. I. S. 583.
 — oxydulat. hydrocyanicum. I. S. 573.
 — oxydulat. muriat. I. S. 570.
 — — nigrum. I. S. 584.
 — perbromatum. I. S. 569.
 — perchloratum. I. S. 571.
 — phosphoricum oxydulat. I. S. 585.
 — pomatum. I. S. 586.
 — pulveratum. I. S. 587.
 — subcarbonic. I. S. 578.
- Ferrum sulphuricum.** I. S. 592.
 — tartaricum. I. S. 596.
 — vitriolatum. I. S. 592.
- Fichte.** II. S. 263.
Fichtenharz. II. S. 265.
Fichtensprossen. II. S. 263.
Fiebertlee. II. S. 472.
Fieberlattwerge, Tode's. 1190.
Fiebermittel, Peysson's. 532.
Fieberpulver, berliner. 1187.
Fieberrinde. I. S. 431.
 — graue. I. S. 401.
- Filicis maris radix.** I. S. 599.
Fingerhut, rother. I. S. 536.
Fischleim. I. S. 627.
- Flavido cort. Aurant.** I. S. 279.
- Flechte, isländische.** II. S. 115.
Fleckenschierling. I. S. 495.
Fliegen, spanische. I. S. 375.
Fliegenschwamm. I. S. 106.
- Flores Aeruginis.** I. S. 519.
 — Arnicae. I. S. 245.
 — Aurantii. I. S. 276.
 — Benzoës. I. S. 321.
 — Chamomillae vulg. I. S. 421.
 — Colchici. I. S. 486.
 — Lavandulae. II. S. 112.
 — Lupuli. I. S. 660.
 — Malvae. II. S. 139.
 — Naphae. I. S. 276.
 — Salis ammoniaci martiales. I. S. 565.
 — Sambuci. II. S. 379.
 — Sulphuris loti. II. S. 449.
 — Tanaceti. II. S. 463.
 — Verbasci. II. S. 486.

- Flores Zinci. I. S. 503.
 Foeniculum. I. S. 197.
 Folia Chimophilae umbellatae. I. S. 430.
 — Digitalis purpureae. I. S. 535.
 — Diosmae crenat. I. S. 544.
 — Farfarae. I. S. 558.
 — Nicotianae. II. S. 205.
 — Rhododendri chrysanthi. II. S. 341.
 — Rhois radicans. II. S. 343.
 — — toxicodendri. II. S. 343.
 — Rutae. II. S. 350.
 — Sabinae. II. S. 357.
 — Sennae alexandrinae. II. S. 419.
 — Taxi baccatae. II. S. 469.
 — Uvae Ursi. II. S. 475.
 Fomentatio frigida Schmuckeri. 2348.
 Fomentationes ioduratae Lugolii. 2160.
 Fomentum resolvens Brerae. 353.
 Formicae. I. S. 603.
 Fowler's Arseniksolution. 629.
 Franzosenholz. I. S. 637.
 Franzosenholzharz. I. S. 639.
 Fraxinellae radix. I. S. 535.
 Freisamkraut. II. S. 487.
 Freyberg's Mundwasser. 896.
 Frondes Sabinae. II. S. 357.
 Frostsalbe, Plenk's. 980.
 Fructus Capsici annui. I. S. 380.
 — immaturi Aurantii. I. S. 279.
 Fructus Tamarindorum. II. S. 460.
 Fucus crispus. I. S. 604.
 — Helminthochortos. I. S. 655.
 Fuligo splendens. I. S. 606.
 Fumariae herba. I. S. 610.
 Fungus Laricis. I. S. 325.
- G.**
- Gänsefuss, mexikan. wohlriechender. I. S. 428.
 — stinkender. I. S. 429.
 Galangae radix. I. S. 612.
 Galbansilge. I. S. 614.
 Galbanum. I. S. 614.
 Galbanumpillen, Heim's auflösende. 1743.
 Galeopsidis grandiflorae herba cum floribus. I. S. 619.
 Galgantwurzel. I. S. 612.
 Gallae. I. S. 620.
 — aleppenses. I. S. 620.
 — quercinae. I. S. 620.
 — tinctoriae. I. S. 620.
 — turcicae. I. S. 620.
 Galläpfel. I. S. 620.
 Gallerte, thierische. I. S. 626.
 Gargarisma antisyphiliticum Brerae. 1896.
 Garoffel. I. S. 397.
 Gartenraute. II. S. 350.
 Gartensalat. II. S. 102.
 Gartenschnecke. I. S. 650.
 Gartheil. I. S. 67.
 Geheimmittel, Ragolo's, gegen Epilepsie. 3563.
 Geheimmittel, Waitz's, gegen Epilepsie. 3598.

- Geigenharz. II. S. 237.
 Gelatina animalis. 1775.
 — Fuci crisp. 1715.
 — Ichthyocollae. 1779.
 — Lichenis islandici. 2468.
 — sicca. I. S. 626.
 Gentianae cruciatae radix. I. S. 623.
 — rubrae radix. I. S. 623.
 Gentianinum. I. S. 625.
 Gentianium. I. S. 625.
 Gerbestoffblei. II. S. 301.
 Gerbsäure. II. 465.
 Gerbstoff. II. S. 465.
 St. Germain-Thee. 3398.
 Germerwurzel, weisse. I. S. 651.
 Gerste. I. S. 657.
 — geschälte. I. S. 658.
 Gerstengraupen. I. S. 658.
 Gerstenmalz. I. S. 659.
 Gerstenmehl, präparirtes. I. S. 658.
 Gewürzessig. I. S. 73.
 Gewürznägelein. I. S. 399.
 Gewürztinktur. I. S. 613.
 — — saure. I. S. 94.
 Gichtrose. II. S. 226. S. 341.
 Gichtrübe. I. S. 330.
 Giftlattigextrakt. II. S. 105.
 Giftmehl. I. S. 255.
 Giftsumachblätter. II. S. 343.
 Giftwurzel. I. S. 504.
 Glandes Quercus tostae. II. S. 321.
 Glanzruss. I. S. 606.
 Glaubersalz. II. S. 202.
 Globuli Ferri tartarici. I. S. 598.
 Globuli Tartari chalybeati. I. S. 598.
 — — ferruginosi. I. S. 598.
 — — martiales. I. S. 598.
 Gluten animale. I. S. 626.
 Gnadenkraut. I. S. 634.
 Gold. I. S. 282.
 — blausaures. I. S. 287.
 — reines, fein zertheiltes. I. S. 288.
 — salzsaures. I. S. 282.
 — — natrumhaltiges. I. S. 284.
 Goldoxyd. I. S. 288.
 Goldoxyd-Natron, salzsaures. I. S. 284.
 Goldpastillen, Chrestien's. 713.
 Goldpillen, Chrestien's. 715.
 Goldpurpur. I. S. 288.
 Goldruthenkraut. II. S. 490.
 Goldschwefel. I. S. 209.
 Goldtropfen, Lamotte's. I. S. 572.
 Goldwurzel. I. S. 426.
 Gottesgnadenkraut. I. S. 634.
 Gonlardisches Wasser. II. S. 296.
 v. Gräfe's Sublimatpillen. 1926
 Graminis radix. I. S. 628.
 Granati radice cortex rec. I. S. 630.
 Granatillöl. I. S. 509.
 Granatwurzelrinde. I. S. 630.
 Graphit. I. S. 632.
 Graphites dep. I. S. 632.
 Graswurzel. I. S. 628.
 Gratiolae herba. I. S. 634.
 Graubraunsteinerz. II. S. 141.

Grindwurzel. II. S. 107.

Grünspan. I. S. 515.

— krystallisirter. I. S. 519.

— neutraler. I. S. 519.

Grünspansauerhonig. I. S. 518.

Guajaci lignum. I. S. 637.

— resina nativa. I. S. 639.

— tinctura ammoniata. I. S. 642.

— — cum Taffia parata. 1820.

Guajakharz, natürliches. I. S. 639.

Guajaktinktur, ammoniumhaltige. I. S. 642.

— — flüchtige. I. S. 642.

Gummi Acaciae II. S. 162.

— ammoniacum depur. I. S. 134.

— arabicum. II. S. 162.

— Asae foetidae. I. S. 265.

— Galbani. I. S. 614.

— gambiense. II. S. 91.

— Guttae. I. S. 643.

— Kino. II. S. 91.

— Mastiches. II. S. 147.

— Mimosae. II. S. 162.

— senegal. II. S. 162.

Gummigutt. I. S. 643.

Gummi-Resina Myrrhae. II. S. 171.

Guttae antiodontalgicae Rustii. 1080.

— diaphoreticae et antispasmodicae Elleri. 3446.

Guttae Gummi. I. S. 643.

Gutti. I. S. 643.

III.

Hafer. I. S. 288.

Hafergrütze. I. S. 288.

Hafermehl. I. S. 290.

Haller's Sauer. I. S. 93.

Halsband, Morand's, gegen Kropf. 3456.

Hanfnessel, grossblumige gelbe. I. S. 619.

Hanfsamen. I. S. 373.

Harless' Arseniksolution. 632.

Harthagel. I. S. 67.

Hauhechelwurzel. II. S. 222.

Hausenblase. I. S. 627.

Hanslauch, kleiner. II. S. 418.

Haustus antilyssus Pharm. Sax. 2574.

Hefe. I. S. 194.

Heiligegeistwurzel. I. S. 199.

Heim's Arseniksolution. 630.

— auflösende Galbanumpillen. 1743.

— stärkere Purgirpillen. 1835.

Helenenkraut. I. S. 551.

Helenii radix. I. S. 551.

Helix Pomatia. I. S. 650.

Hellebori albi radix. I. S. 651.

— nigri radix. I. S. 653.

Helminthochortos. I. S. 655.

Hepar Antimonii calcareum. I. S. 351.

— Calcis. I. S. 350.

— Sulphuris alcalinum. II. S. 77.

— — calcareum. I. S. 350.

— — salinum. II. S. 77.

— — volatile. I. S. 177.

Herba Anthos. II. S. 348.

— Ballotae lanatae. I. S. 291.

— Belladonnae I. S. 309.

— Cardui benedicti. I. S. 392.

— et summitates Centaurii minor. I. S. 413.

— Chelidonii. I. S. 426.

— Cicutae. I. S. 495.

— recens Cochleariae officinal. I. S. 481.

— Conii I. S. 495.

— Digitalis purpureae. I. S. 536.

— Fumariae. I. S. 610.

— cum floribus Galeopsidis grandiflorae. I. S. 619.

— Hyoscyami. I. S. 737.

— Jaceae. II. S. 487.

— Lycopodii. II. S. 123.

— Majoranae. II. S. 138.

— Malvae. II. S. 139.

— Mari veri. II. S. 147.

— Marrubii albi. II. S. 145.

— et summitates Meliloti. II. S. 150.

— Melissa citratae II. S. 151.

— Menthae crispae. II. S. 153.

— — piperitae. II. S. 154.

— et summitates Millefolii. II. S. 158.

— Nicotianae. II. S. 205.

— Polygalae amarae. II. S. 302.

— Pulsatillae nigricantis. II. S. 310.

— Rorismarini. II. S. 348

Herba Rutae. II. S. 350.

— Sabinae. II. S. 357.

— Salviae. II. S. 375

— Scordii. II. S. 413.

— Sedi acris. II. S. 418.

— Serpylli. II. S. 428.

— Stramonii. II. S. 444.

— Tanacetii. II. S. 462.

— Taraxaci. II. S. 466.

— Trifolii fibrini. II. S. 472.

— Veronicae. II. S. 487.

— Virgaureae. II. S. 490.

Herbstzeitlose. I. S. 484.

Hexenmehl. II. S. 124.

Himmelbrandblumen. II. S. 486.

Hirschhorn. I. S. 416.

— weissgebranntes. I. S. 419.

Hirschhorngest, bernsteinsaurer. I. S. 173.

— — rektificirter. I. S. 153.

Hirschhornöl. II. S. 219.

— rektificirtes. II. S. 220.

Hirschhornsalz, flüchtiges. I. S. 149.

Höllenstein. I. S. 236.

Hoffmann's Lebensbals. 775.

Hoffmann'sche Tropfen. II. S. 437.

Hohlzahn, grossblüthiger. I. S. 619.

Holz, heiliges. I. S. 637.

Holzessig. I. S. 85.

Holzkohle. I. S. 385.

Holzsäure, brenzliche. I. S. 85.

— gereinigte. I. S. 87.

— rektificirte. I. S. 87.

- Holzsäure, rohe. I. S. 85.
 Honig, roher u. abgeschäumter. II. S. 149.
 Hopfen. I. S. 660.
 Hopfenkegel. I. S. 660.
 Hopfenstoff. I. S. 662.
 Hopfenzapfen. I. S. 660.
 Hordei farina praeparata. I. S. 658.
 — Maltum. I. S. 659.
 Hordeum. I. S. 657.
 — excorticatum. I. S. 658.
 — mundatum. I. S. 658.
 — perlatum. I. S. 658.
 Hornsilber. I. S. 234.
 Hühnerei. I. S. 223.
 Hüttenrauch. I. S. 255.
 Hufeland's Sublimatpillen. 1922.
 Huflattigblätter. I. S. 558.
 Humuli Lupuli strobili. I. S. 660.
 Hundebblume. II. S. 466.
 Hundskürbis. I. S. 330.
 Hundswurzel. I. S. 628.
 Hydrargyri nitrici oxydati Liquor. I. S. 708.
 — nitrici oxydulati Liquor. I. S. 709.
 — Oxymurias. I. S. 679.
 Hydrargyrum. I. S. 663.
 — amidato-bichloratum. I. S. 664.
 Hydrargyrus. I. S. 663.
 — aceticus. I. S. 663.
 — ammoniato-muriaticus. I. S. 664.
 — bibromatus. I. S. 668.
 — biiodatus. I. S. 675.
 — borussicus. I. S. 669.
 Hydrargyrus bromatus. I. S. 669.
 — chloratus. I. S. 697.
 — cinereus Moscati. I. S. 718.
 — cyanogenatus. I. S. 669.
 — hydrobromicus oxydatus. I. S. 668.
 — hydrocyanicus. I. S. 669.
 — iodatus. I. S. 672.
 — — flavus. I. S. 672.
 — — ruber. I. S. 675.
 — kalico-iodatus. I. S. 678.
 — muriaticus corrorivus. I. S. 679.
 — — mitis. I. S. 697.
 — oxydatus. I. S. 711.
 — — muriaticus. I. S. 679.
 — oxydulat. muriaticus. I. S. 697.
 — — niger. I. S. 726.
 — — trituratione paratus. I. S. 718.
 — perbromat. I. S. 668.
 — perchlorat. I. S. 679.
 — periodatus. I. S. 675.
 — persulphuratus. I. S. 732.
 — phosphoricus oxydulatus. I. S. 728.
 — praecipitatus albus. I. S. 664.

- Hydrargyrum præcipitatus cosmeticus.** I. S. 664.
 — **sublimatus corrosivus.** I. S. 679.
 — **sublimatus dulcis.** I. S. 697.
 — **sulphurato - stibiatus.** I. S. 734.
 — **sulphuratus niger.** I. S. 730.
 — — **ruber factitius.** I. S. 732.
 — **vivas depuratus.** I. S. 736.
 — **zoticus.** I. S. 669.
Hydras ferricus. I. S. 578.
Hydrochloras ammonicus. I. S. 162.
 — **morphicus.** II. S. 246.
Hydrogenazot. I. S. 140.
Hydromel. 2566.
Hyoscyami herba. I. S. 737.
 — **semina.** I. S. 743.
- I.**
- Jaceae herba.** II. S. 487.
Jakobs-Pulver. 506.
Jalapae radix. II. S. 1.
Jalapenwurzel. II. S. 1.
James-Powder. 506.
James-Pulver. 506.
Ichthyocolla. I. S. 627.
Ignatii Sancti Faba. II. S. 5.
Ignazbohne. II. S. 5.
Imperatoriae radix. II. S. 6.
Indigo. II. S. 7.
Indigum. II. S. 7.
Infusum Nicotianae Fowleri. 2738.
- Ingwer.** II. S. 514.
Ingwerbier. 3668.
Injectio antiblennorrhoeica Burnettii. 587.
Inulae radix. I. S. 551.
Jod. II. S. 8.
Jodarsenik. I. S. 263.
Jodbad, Lugol's. 2160.
Jodbaryum. I. S. 309.
Jodblei. II. S. 297.
Jodeisen. I. S. 574.
Iodidum hydrargyrosus. I. S. 672.
 — **Kalii.** II. S. 60.
Jodine. II. S. 8.
Iodinum. II. S. 8.
Jodinwasserstoffkali. II. S. 60.
Iodium. II. S. 8.
Jodkaliquecksilber. I. S. 678.
Jodkalium. II. S. 60.
Jodquecksilber. I. S. 672.
 — **doppeltes.** I. S. 675.
 — **gelbes.** I. S. 672.
 — **in maximo.** I. S. 675.
 — **in minimo.** I. S. 672.
 — **rothes.** I. S. 675.
Jodschwefel. II. S. 456.
Jodsilber. I. S. 235.
Jodsolution, Lugol's. 2153.
 — — **concentrirte.** 2154.
 — — **kaustische.** 2161.
 — — **rothmachende.** 2160.
 — — **zum äusseren Gebrauche.** 2159.
Iodum. II. S. 8.
Jodumschläge, Lugol's. 2160.
Ioduretum Arsenici. I. S. 263.

Ioduretum Hydrargyri et Potassii. I. S. 678.

— hydrargyric. I. S. 675.

— Sulphuris. II. S. 456.

— Zinci. II. S. 502.

Jodzink. II. S. 502.

Johannisgürtel. II. S. 123.

pecacuanhae extractum. II. S. 27.

— radix. II. S. 17.

Iridis florentinae radix. II. S. 29.

Irländisches Moos. I. S. 604.

Isländisches Moos. II. S. 115.

Juglandes. II. S. 30.

Juglandis regiae folia. II. S. 30.

Julapium pectorale amarum. 3042.

Juniperus communis. II. S. 33

K.

Kaddig. II. S. 33.

Kadmium, schwefelsaures. I. S. 333.

Kaiserwurzel. II. S. 6.

Kakaobohnen. I. S. 332

Kali. II. S. 36.

— aceticum. II. S. 36.

— bicarbonicum. II. S. 44.

— blausaures. II. S. 58.

— borussicum. II. S. 56.

— bromwasserstoffsäures. II. S. 57.

— carbonicum. II. S. 39.

— — acidul. II. S. 44.

— — crudum. II. S. 39.

— — dep. II. S. 39.

— — — ex Ciner. clav. II. S. 39.

Kali carbonicum dep. ex Tartaro. II. S. 40.

— — perfecte saturatum. II. S. 44.

— causticum. II. S. 46.

— — fusum. II. S. 46.

— — siccum. II. S. 48.

— — vegetab. II. S. 46.

— chloricum. II. S. 52.

— chlorsaures. II. S. 52.

— chromicum. II. S. 54.

— — flavum. II. S. 54.

— chromsaures. II. S. 54.

— — einfach gelbes. II. S. 54.

— citratum. II. S. 54.

— citricum. II. S. 54.

— citronensaures. II. S. 54.

— cyanwasserstoffsäures. II. S. 58.

— doppelt kohlen-säures. II. S. 44.

— eisenhaltiges blausäures. II. S. 56.

— essigsäures. II. S. 36.

— ferro-borussicum. II. S. 56.

— ferro-cyanogenat. II. S. 56.

— ferroso-hydrocyanicum. II. S. 56.

— hydrobromicum. II. S. 57.

— hydrocyanicum. II. S. 58.

— hydriodicum. II. S. 60.

— hydriodsaures. II. S. 60.

— hydroiodinicum. II. S. 60.

— hyperoxygenirt salzsäures. II. S. 52.

— kohlen-säures. II. S. 39.

— — gereinigtes. II. S. 39.

- Kali, koblens., mildes, aus Weinstein bereitet. II. S. 40.
 — kohleusaures unreines. II. S. 39.
 — muriaticum oxygenatum. II. S. 52.
 — natronato - tartaricum. II. S. 64.
 — neutrales kohlensaures. II. S. 44.
 — nitricum. II. S. 70.
 — oxydirt salzs. II. S. 52.
 — oxymuriaticum. II. S. 52.
 — salpetersaures. II. S. 70.
 — saures kohlens. II. S. 44.
 — — schwefelsaures. II. S. 85.
 — — weinsteinsaures. II. S. 88.
 — schwefelsaures. II. S. 82.
 — sulphuratum. II. S. 77.
 — sulphuricum. II. S. 82.
 — — acidulum. II. S. 85.
 — tartaricum. II. S. 86.
 — — acidulum. II. S. 88.
 — vegetabile purum. II. S. 48.
 — vitriolatum. II. S. 82.
 — weinsteinsaures. II. S. 86.
 — — — und boraxsaures Natrum. II. S. 67.
 — zooticum. II. S. 56.
 Kali-Alaun, gemeiner. I. S. 119.
 Kali et Natrum boracico-tartaricum. II. S. 67.
 Kalischwefelleber. I. S. 77.
 Kalitinktur. II. S. 51.
 Kalium bromatum. II. S. 57.
 — cyanogenatum. II. S. 58.
 — iodatum. II. S. 60.
 Kalk. I. S. 340.
 — ätzender. I. S. 353.
 — gebrannter. I. S. 353.
 — oxydirt-salzs. I. S. 342.
 — salzsaurer. I. S. 348.
 Kalkerde. I. S. 340.
 — kohlensaure. I. S. 340.
 Kalköl. I. S. 348.
 Kalkschwefelleber. I. S. 350.
 Kalkwasser. I. S. 354.
 Kalmuswurzel. I. S. 337.
 Kalomel. I. S. 697.
 Kamillen, gemeine. I. S. 421.
 Kampher. I. S. 360.
 Kampherseife, Wetzler's. 983.
 Kampherwein der Engländer. 972.
 Kapuzinersamen. II. S. 353.
 Karbe. I. S. 396.
 Kardobenediktenkraut. I. S. 392.
 Kastoröl. II. S. 345.
 Katalpa. I. S. 408.
 Kataplasma, Paradier'sches. 3321.
 Katechu. I. S. 409.
 Katzenkräutlein. II. S. 418.
 Katzenkraut. II. S. 147.
 Kellerbalsrinde. II. S. 156.
 Kellerwürmer. II. S. 161.
 Kermes minerale. I. S. 214.
 Kerndl's scharfer Umschlag. 149.
 Kiefersprossen. II. S. 263.
 Kindermilch, Rosenstein's. 417.
 Kinin. I. S. 449.
 Kino. II. S. 91.
 Kinogummi. II. S. 91.
 Kirschlorbeerwasser. II. S. 108.

- Klapperschlangenwurzel. II. S. 304.
 Klettenwurzel. I. S. 305.
 Knoblauch. I. S. 109.
 Knochenasche. I. S. 419.
 Knochenöl. II. S. 219.
 Kochsalzsäure. I. S. 77.
 Königskerzenblumen. II. S. 486.
 Kohle, präparirte. I. S. 385.
 — thierische. I. S. 383.
 — vegetabilische. I. S. 385.
 Kolophonium. II. S. 267.
 Koloquintermark. I. S. 487.
 Korsikanisches Moos. I. S. 655.
 Krähenauge. II. S. 210.
 Krähenaugenbitter. II. S. 215.
 Kraftmehl. I. S. 194.
 Krause's Sublimatpillen. 1927.
 Krausemünzkraut. II. S. 153.
 Krebsaugen. I. S. 340.
 Krebssteine. I. S. 340.
 Kreide, weisse präparirte. I. S. 340.
 Kreidnelken. I. S. 399.
 Kreosot. II. S. 94.
 Kreuzblume, bittere. II. S. 302.
 Kreuzenzianwurzel. I. S. 623.
 Kropfmittel, Peschier's. 2698.
 Krotonöl. I. S. 509.
 Kubeben. I. S. 513.
 Küchensalz. II. S. 196.
 Küchenschellenkraut. II. S. 310.
 Kümmel. I. S. 396.
 Kuhmilch. II. S. 99.
 Kuhmolken. II. S. 99.
 Kunkel's Spiessglangzmorsellen. 517.
 Kupfer. I. S. 515.
 — basisches essigsäures. I. S. 515.
 Kupfer, essigsäures. I. S. 519.
 — schwefels. I. S. 528.
 Kupferalaun. I. S. 520.
 Kupferammoniakflüssigkeit, salzsäure. I. S. 523.
 Kupfervitriol. I. S. 528.
- L.**
- Lac artificiale Rosensteinii. 412.
 — Infantum Rosensteinii. 417.
 — mercuriale. I. S. 664.
 — Sulphuris. II. S. 456.
 — vaccinum. II. S. 99.
 — Virginum. 388.
 Lachenknoblauchkraut. II. S. 413.
 Lactis Saccharum. II. S. 101.
 — vaccini Serum. II. S. 99.
 Lactuca sativa. II. S. 102.
 Lactucæ sativæ extractum. II. S. 103.
 — virosæ extractum. II. S. 105.
 Lactucarium. II. S. 103.
 Läusesamen, mexikanischer. II. S. 353.
 Lait virginal. 388.
 Lamotte's Goldtropfen. I. S. 572.
 Landschierling, grosser. I. S. 495.
 Lapathi acuti radix. II. S. 107.
 Lapides Cancrorum. I. S. 340.
 Lapis causticus chirurgorum. II. S. 46.
 — divinus. I. S. 520.
 — — Pharm. Sax. I. S. 532.

- Lapis infernalis. I. S. 236.
 — ophthalmicus. I. S. 520.
 Lattigextrakt. II. S. 103.
 Lattigopium. II. S. 103.
 Lattigsaft. II. S. 103.
 Lattwerge, eröffnende. II. S. 424.
 Laugensalz, ätzendes vegetabilisches. II. S. 46.
 — basisches. I. S. 144.
 — flüchtiges. I. S. 144.
 — mineralisches. II. S. 180.
 — trocknes. I. S. 144.
 — vegetabilisches. II. S. 36.
 Laudanum. II. S. 228.
 — flüssiges. II. S. 239.
 — liquidum Sydenh. II. S. 239.
 Lauri baccae. II. S. 111.
 Laurocerasi aqua. II. S. 108.
 Lavandulae flores. II. S. 112.
 Lavendelblumen. II. S. 112.
 Lebensbalsam, äusserer. II. S. 275.
 — Hoffmann's. 775.
 Leberthran, Berger. I. S. 273.
 Leinöl. II. S. 120.
 Leinsamen. II. S. 118.
 Leinsamenmehl. II. S. 118.
 Lemithochorton. I. S. 655.
 Lerche. II. S. 263.
 Lerchenschwamm. I. S. 325.
 Lerchenterpenthin. II. S. 270.
 Levistici radix. II. S. 113.
 Lichen Carageen. I. S. 604.
 — Islandicus. II. S. 115.
 Licheninum, II. S. 117.
 Lieber'sche Brustkräuter. I. S. 619.
 Liebstöckelwurzel. II. S. 113.
 Lignum Brasilianum rubrum s. coeruleum. I. S. 358.
 — Campechian. I. S. 358.
 — Guajaci. I. S. 637.
 — Quassiae. II. S. 315.
 — sanctum. I. S. 637.
 — Sassafras. II. S. 397.
 Limatura Ferri praeparata. I. S. 587.
 — Stannai. II. S. 441.
 Limax rufus. II. S. 117.
 Limone. I. S. 476.
 Linctus anthelminthicus Chausieri. 1855.
 — emeticus Hufelandi. 520.
 — leniens Pharm. Hann. 414.
 Lindenholzkohle. I. S. 385.
 Lini oleum. II. S. 120.
 — semina. II. S. 118.
 — seminum farina. II. S. 118.
 Linimentum ammoniatum. 325.
 — antispasmodicum Hufelandi. 870.
 — antispasmodic. Starkii. 379.
 — Calcar. piceum. 927.
 — Calcis Vogleri. 934.
 — caustic. Vogelii. 928.
 — diureticum Lentini. 2966.
 — gingivale mundificans Disp. Fuld. 2644.
 — saponato - ammoniatum. 326.
 — volatile. 325.

- Liquamen Martis. I. S. 572.
 Liquidambar liquida. II. S. 447.
 Liquiritiae radix. II. S. 121.
 Liquor Acetatis Ammoniae. I. S. 140.
 — acidus phosphoricus ex ossibus. I. S. 83.
 — aethereus Vitrioli. I. S. 103.
 — Ammonii acetici. I. S. 140.
 — — anisatus. I. S. 160.
 — — benzoici Harlessii. 280.
 — — carbon. I. S. 148.
 — — caustici. I. S. 154.
 — — hydrothionosi. I. S. 177.
 — — pyro-oleosi succinici. I. S. 173.
 — — succinici. I. S. 173.
 — — sulphurati. I. S. 177.
 — — vinosus. I. S. 162.
 — anodynus martialis Klaprothii. I. S. 564.
 — — martiatus. I. S. 572.
 — — mineralis Hoffmanni. II. S. 437.
 — antarthriticus Elleri. 370.
 — — de Ste. Marie. 377.
 — antherethisticus Hufelandi. 2454.
 — Antimonii chlorati. I. S. 207.
 — Beguini. I. S. 177.
 Liquor Belladonnae cyanicus Hufelandi. 793.
 — Bellostii. I. S. 708.
 — Calcis. I. S. 354.
 — Chloreti Stibii. I. S. 207.
 — Chlori. I. S. 463.
 — Cornu Cervi rectificatus. I. S. 153.
 — — — succinatus. I. S. 173.
 — Cupri ammoniato-muriatici. I. S. 523.
 — Ferri nitrici. I. S. 578.
 — — oxydati hydrato-acetici. I. S. 583.
 — — perchlorati. I. S. 572.
 — — Sesquinitratis. I. S. 578.
 — fumans Boylii. I. S. 177.
 — Hydrargyri nitrici oxydati. I. S. 708.
 — Kali caustici. II. S. 50.
 — mercurialis Swietenii. 1933.
 — Mindereri. I. S. 140.
 — nervinus Peerbomii. 2970.
 — Nitratis Ferri. I. S. 578.
 — — hydrargyrici. I. S. 708.
 — — hydrargyrosi. I. S. 709.
 — ophthalmic. mercurial. Pharm. paup. Prag. 1941.
 — Plumbi acetici basici. II. S. 290.
 — — subacetici. II. S. 290.
 — Saponis stibiati. I. S. 213.

- Liquor Stibii muriatici. I. S. 207.
 — Subcarbonatis Ammoniae. I. S. 148.
 — Succinatis Ammoniae. I. S. 173.
 — Zinci muriatici. II. S. 498.
 Lithargyros. II. S. 299.
 Lixivium causticum vegetabile. II. S. 50.
 Lobelia inflata. II. S. 123.
 Löffelkraut. I. S. 481.
 Löffelkresse. I. S. 481.
 Löwenzahn. II. S. 466.
 Looch sanum et expertum. 419.
 Lorbeeren. II. S. 111.
 Luftwurzel. I. S. 199.
 Lugol's Jodbad. 2160.
 — Jodsolution. 2153.
 — — concentrirte. 2154.
 — — kaustische. 2161.
 — — rothmachende. 2160.
 — — zum äusseren Gebrauche. 2159.
 — Jodumschläge. 2160.
 Lupulinum. I. S. 662.
 Lycopodii herba. II. S. 123.
 — semina. II. S. 124.
- M.**
- Macis. II. S. 168.
 Magendie's Chininalkohol. 1266.
 — Chininsyrup. 1264.
 — Chininwein. 1265.
 — Cinchoninsyrup. 1280.
- Magendie's Cinchoninwein. 1281.
 — Emetinplätzchen. 2212.
 — Emetinsyrup. 2211.
 Magenelixir, Whytt'sches. I. S. 449.
 Magisterium Bismuthi. I. S. 323.
 Magma scytodepsicum e Quercu. 3036.
 Magnesia. II. S. 127.
 — alba. II. 129.
 — calcinata. II. S. 127.
 — carbonica. II. S. 129.
 — Edinburgensis. II. S. 129.
 — kohlensaure. II. S. 129.
 — leichte. II. S. 129.
 — lockere. II. S. 129.
 — nigra. II. S. 141.
 — pura. II. S. 127.
 — reine. II. S. 127.
 — Salis amari. II. S. 129.
 — schwefels. II. S. 134.
 — subcarbonica. II. S. 129.
 — sulphurata. II. S. 133.
 — sulphurica. II. S. 134.
 — usta. II. S. 127.
 — vitrariorum. II. S. 141.
 — vitriolata. II. S. 134.
 Magnesiaschwefelleber. II. S. 133.
 Majoranae herba. II. S. 138.
 Majorankraut. II. S. 138.
 Mairan. II. S. 138.
 Maiwurm. II. S. 152.
 Maltum Hordei. I. S. 659.

- Malvae flores et herba. II. S. 139.
 Malvenblüthen und Blätter. II. S. 139.
 Malztrank. I. S. 659.
 Mandeln, bittere. I. S. 178.
 — süsse. I. S. 186.
 Mandelöl, frisches süsses. I. S. 188.
 Mandelstoff. I. S. 185.
 Mandelsyrup. I. S. 188.
 Manganesium oxydatum nigrum. II. S. 141.
 Manganoxyd, schwarzes. II. S. 141.
 Manganum oxydatum nativum. II. S. 141.
 Manna. II. S. 142.
 Marantae Amylum. I. S. 196.
 Marcasita alba. I. S. 323.
 Mari veri herba. II. S. 147.
 Marrubii albi herba. II. S. 145.
 Mars. I. S. 563.
 — solubilis. I. S. 596.
 Mastiche. II. S. 147.
 Mastix. II. S. 147.
 Maueresel. II. S. 161.
 Mauerpfeffer. II. S. 418.
 Meconium. II. S. 228.
 Meerrettig. I. S. 479.
 Meerzwiebel. II. S. 399.
 Meisterwurzel. II. S. 6.
 Mel crudum et despumatum. II. S. 149.
 Meliloti herba et summitates. II. S. 150.
 Melissa citratae herba. II. S. 151.
 Melithochorton. I. S. 655.
 Meloë majalis et Proscara-baeus. II. S. 152.
 Mennige. II. S. 300.
 Menthae crispae herba. II. S. 153.
 — piperitae herba. II. S. 154.
 Mercurius. I. S. 663.
 — acetatus. I. S. 663.
 — dulcis. I. S. 697.
 — gummosus Plenckii. 2045.
 — nitrosus. I. S. 708.
 — oxydulatus hydriodicus. I. S. 672.
 — phosphoratus. I. S. 728.
 — praecipitatus albus. I. S. 664.
 — — niger. I. S. 726.
 — — ruber. I. S. 711.
 — solubilis Hahnemanni. I. S. 726.
 — sublimatus corrosivus. I. S. 679.
 Mexikanischer Läusesamen. II. S. 353.
 — — Thee. I. S. 428.
 Mezerei cortex. II. S. 156.
 Milchsäure. I. S. 77.
 Milchzucker. II. S. 101.
 Millefolii herba et summitates. II. S. 158.
 Millepedes. II. S. 161.
 Mimosae gummi. II. S. 162.
 Mimosengummi. II. S. 162.
 Minderer's Geist. I. S. 140.
 Mineralalkali. II. S. 186.

- Mineralkermes.** I. S. 214.
Minium. II. S. 300.
Mixtura acetico - camphorata
 Schol. clin. Lips. 960.
 — antihectica Griffithi.
 1675.
 — antimiasmatica Swie-
 teni. 274.
 — contra morsum canis
 rabidi. 2574.
 — diaphoretica Schol.
 clin. Lips. 3438.
 — hydragoga Hufelandi.
 1548.
 — incitans nervina et diu-
 retica Brerae. 3441.
 — oleoso-balsamica. 775.
 — salino-scillitica Himlyi.
 3361.
 — sulphurico - acida. I.
 S. 93.
 — vulneraria acida. I.
 S. 95.
Mohn. II. S. 227.
Mohnmilch. 2866.
Mohnöl. II. S. 248.
Mohnsaft. II. S. 228.
Mohnsamen. II. S. 247.
Moos, corsikanisches. I. S.
 655.
 — irländisches. I. S. 604.
 — isländisches. II. S. 115.
Moosbitter. II. S. 117.
Moosgelée, isländisches. 2468.
Morand's Halsband gegen
 Kropf. 3456.
Morphia. II. S. 242.
Morphinum. II. S. 242.
Morphium. II. S. 242.
 — aceticum. II. S. 243.
Morphium, essigsaures. II.
 S. 243.
 — muriaticum. II. S. 246.
 — salzsaures. II. S. 246.
 — schwefels. II. S. 246.
 — sulphuric. II. S. 246.
Morsellen, Tode's wurmtrei-
 bende. 1309.
Morsuli anthelminthici Todii.
 1309.
 — antimoniales Kunkelii.
 517.
Moschus. II. S. 164.
Mückenschwamm. I. S. 106.
Mundwasser, Freyberg's. 896.
Murias aurico-natricus. I. S.
 284.
Muskatblüthe. II. S. 168.
Muskatbohne. II. S. 248.
Muskatenbaum. II. S. 168.
Muskatennuss. II. S. 169.
Mutterharz. I. S. 614.
Mutterkorn. II. S. 414.
Mutterwurz. I. S. 245.
Mynsicht's saures Elixir. I.
 S. 94.
Myristica aromatica. II. S.
 168.
Myrrha. II. S. 171.

N.

- Naphae flores.** I. S. 276.
Naphtha Aceti. II. S. 178.
 — — martiata. I. S.
 564.
 — muriatica. I. S. 101.
 — Vitrioli. I. S. 103.
Natrium chloratum. II. S. 196.
Natron. II. S. 180.

Natronweinstein. II. S. 64.

Natrum. II. S. 180.

- aceticum. II. S. 180.
- arsenicum II. S. 181.
- arseniks. II. S. 181.
- basisch boraxsaures. II. S. 181.
- bicarbonicum. II. S. 190.
- boracicum. II. S. 181.
- carbonicum acidulum. II. S. 190.
- — depur. II. S. 186.
- — neutrale. II. S. 190.
- — perfecte saturatum. II. S. 190.
- chloratum. II. S. 194.
- chloricum. II. S. 195.
- chlors. II. S. 195.
- doppelt kohensaures. II. S. 190.
- essigs. II. S. 180.
- gesättigtes kohlen. II. S. 190.
- hyperoxygenirt salzs. II. S. 195.
- kohlen., gereinigtes. II. S. 186.
- mildes. II. S. 186.
- muriaticum. II. S. 196.
- — oxygenatum. II. S. 195.
- nitricum. II. S. 199.
- oxymuriaticum. II. S. 195.
- phosphoricum. II. S. 200.
- phosphors. II. S. 200.

Natrum, säuerliches kohlen. II. S. 190.

- salpeters. II. S. 199.
- salzs. II. S. 196.
- schwefels. II. S. 202.
- subboracicum. II. S. 181.
- subcarbonicum. II. S. 186.
- sulphuric. II. S. 202.

Nelkenwurzel. I. S. 397.

Nerventinktur, Bestucheff'sche. I. S. 572.

Nicotianae folia s. herba. II. S. 205.

Nieswurzel, schwarze. I. S. 653.

— weisse. I. S. 651.

Nieswurzelauflguss, Brunner's. 1850.

Nitras ammonicus cum Oxydo hydrargyroso. I. S. 726.

— argenticus fusus. I. S. 236.

Nitratis Ferri Liquor. I. S. 578.

Nitrum cubicum. II. S. 199.

— depuratum. II. S. 70.

Nux moschata. II. S. 169.

— vomica. I. S. 210.

O.

Ochsenbrechwurzel. II. S. 222.

Ochsengalle. I. S. 559.

Oculi Cancrorum. I. S. 340.

Oel, Dippel'sches. II. S. 220.

Oelbaumharz. I. S. 550.

- Oelmischung, balsamische.
 775.
 Oleum Amygdalarum amarar.
 aethereum. I. S. 184.
 — Amygdal. dulcinum rec.
 expressum. I. S. 188.
 — animale aethereum II. S.
 220.
 — — foetidum. II. S.
 219.
 — — Dippelii. II. S.
 220.
 — — empyreumatic.
 II. S. 219.
 — Antimonii. I. S. 207.
 — Arnicae aether. I. S.
 254.
 — Cajeputi. I. S. 334.
 — Cornu Cervi foetidum.
 II. S. 219.
 — — — rectificat.
 II. S. 220.
 — Crotonis. I. S. 509.
 — jecinatoris Aselli. I. S.
 273.
 — Lini. II. S. 120.
 — Martis per deliquium.
 I. S. 572.
 — Palmae Christi. II. S.
 345.
 — — liquidum. II. S.
 345.
 — Papaveris albi. II. S.
 248.
 — Petrae. II. S. 250.
 — pyro - animale. II. S.
 219.
 — — — depurat.
 II. S. 220.
 Oleum Ricini. II. S. 345.
 — Ricini artificiale Hufe-
 landi. 1430.
 — Salis. I. S. 77.
 — Terebinthinae. II. S.
 275.
 — Vitrioli dulce. I. S. 103.
 — — purissimum. I.
 S. 89.
 — — rectificatum. I.
 S. 89.
 Ononidis radix. II. S. 222.
 Operment. I. S. 262.
 Opium. II. S. 228.
 Opiumalkaloid. II. S. 242.
 Opiumtinktur, einfache. II. S.
 237.
 — safranhaltige. II. S.
 239.
 Opodeldoc liquidum. 3291.
 Orangenblüthen. I. S. 276.
 Ostracodermata. I. S. 340.
 Ovi Albumen. II. S. 223.
 — Vitellus. II. S. 224.
 Oxychloretum hydrargyricum
 cum Ammonio. I. S. 664.
 Oxydum calcicum. I. S. 353.
 — ferricum. I. S. 583.
 — ferrosus. I. S. 584.
 — Plumbi album. II. S.
 296.
 Oxylapathi radix. II. S. 107.
 Oxymel Aeruginis. I. S. 518.
 — simplex. II. S. 150.
 Oxymurias Hydrargyri. I. S.
 679.
 Oxysaccharum liquidum herbae
 Digitalis. 1534.

P.

Päden. I. S. 628.

Paeoniae radix. II. S. 226.

Pampini Vitis viniferae. II. S. 493.

Panacea mercurialis. I. S. 697.

Papaver somniferum. II. S. 227.

Papaveris albi oleum. II. S. 248.

— albi semina. II. S. 247.

— capita. II. S. 227.

Paraguay-Roux. 3072.

Pariserblau. I. S. 573.

Pech, burgundisches. II. S. 265.

— flüssiges. II. S. 268.

— schwarzes. II. S. 268.

— weisses. II. S. 265.

Pechurim faba. II. S. 248.

Pechurimbohne. II. S. 248.

Perlgraupen. I. S. 658.

Perlsalz. II. S. 200.

Perlweiss. I. S. 322.

Perubalsam. I. S. 299.

Perurinde. I. S. 431.

Peschier's Kropfmittel. 2698.

Pestessig. I. S. 73.

Petroleum crudum et rectificatum. II. S. 250.

Peysson's Fiebermittel. 532.

Pfaffenröhrlein. II. S. 466.

Pfeffer, schwarzer. II. S. 281.

— spanischer. I. S. 380.

Pfeffermünzkrant. II. S. 154.

Pfefferstranchrinde. II. S. 156.

Pfeilwurzelmehl. I. S. 196.

Pfingstrosenwurzel. II. S. 226.

Pflaumenmuss. II. S. 309.

Phellandrii semina. II. S. 253.

Phosphas Ferri. I. S. 585.

Phosphorsäure aus Knochen. I. S. 83.

— — trockne. I. S. 83.

— — verglaste. I. S. 83.

Phosphorus. II. S. 256.

— Hombergii. I. S. 348.

Pillen, blaue, der Engländer. 2048.

Pilulae adstringentes Hufelandi. 1114.

— alterantes Plummeri. 1997.

— antichloroticae Kaempferi. 1676.

— antidysentericae Willisii. 1113.

— antihystericae Sydenh. 658. 1098.

— antilacticae. 2658.

— antisepticae Dupuytreni. 955.

— aperientes s. resolventes Stahlii. 160. 1362.

— asiatica. 635.

— Balsam. Copaivae comp. Cod. med. Hamb. 734.

— balsamicae Boerhaavii. 1114. 2638.

— — Selli. 1426.

— Blandii, a Guibourt correctae. 1645.

— coeruleae Angl. 2048.

— — Edinburg. 1481.

- Pilulae Cupri ammoniacalis Brerae. 1482.
 — eccoproticae Vogleri. 2374.
 — emmenagogae Schol. clin. Lips. 1744.
 — hydragog. Heimii. 1836.
 — Hydrarg. Pharm. Lond. et Dublin. 2048.
 — ex Hydrargyro muriatic. corros. Dzondii. 1923.
 — ex Hydrargyro muriatic. corros. Graefii. 1926.
 — ex Hydrargyro muriatic. corros. Hufelandi. 1922.
 — ex Hydrargyro muriatic. corros. Krausii. 1927.
 — Keyseri. 1877.
 — mercuriales Anglicae. 2047.
 — — Ritteri. 2028.
 — Moscoviticae s. tonicae. 1376.
 — physagogae. 3347.
 — purgantes. 1999.
 — — Graefii. 2136.
 — — fortiores Heimii. 1835.
 — — mites Hufelandi. 3409.
 — resolventes Richteri. 535.
 — — cum Fuligine Pharm. paup. Hamb. 1718.
 Pilulae resolventes cum Galbano Heimii. 1743.
 — Ruffii. 161.
 — sedativae Hufelandi. 2106.
 — de Sédillot. 2049.
 Pilulae tonicae Bacheri. 1853.
 — tonico-resolventes Clari. 1601.
 — Valleti e Ferro oxydulato. 1646.
 Pimpinellae albae radix. II. S. 260.
 Pimpinellwurzel. II. S. 260.
 Pini resina. II. S. 265.
 — turiones. II. S. 263.
 Piper Hispanicum. I. S. 380.
 — Indicum. I. S. 380.
 — nigrum II. S. 281.
 Piperinum. II. S. 281.
 Pix Burgundica. II. S. 265.
 — liquida. II. S. 268.
 — navalis. II. S. 268.
 Plenck's Frostsalbe. 980.
 Plumbago. I. S. 632.
 Plumbi acetici basici liquor. II. S. 290.
 — Oxyda. II. S. 298.
 Plumbum. II. S. 282.
 — aceticum. II. S. 282.
 — carbonicum. II. S. 296.
 — hydroiodicum. II. S. 297.
 — hyperoxydatum rubr. II. S. 300.
 — iodatum. II. S. 297.
 — iodidum. II. S. 297.
 — oxydat. aceticum. II. S. 282.
 — — vitrificatum. II. S. 299.
 — suboxydatum. II. S. 298.
 — tannicum. II. S. 301.
 Pockenholz. I. S. 637.
 Pollinisches Dekokt. 2218.

- Polychrestsalz. II. S. 64.
 Polygala amara. II. S. 302.
 Polygalae Senegae radix. II. S. 304.
 — Virginianae radix. II. S. 304.
 Pomatum ammoniacale Gondreti. 324.
 Pomeranzen, unreife. I. S. 279.
 Pomeranzenblätter. I. S. 277.
 Pomeranzenblüthen. I. S. 276.
 Pomeranzenschalen, das Gelbe derselben. I. S. 279.
 Potasche, gereinigte. II. S. 39.
 — rohe. II. S. 39.
 Potassa. II. S. 36.
 Potio anthelminthica laxativa Brerae. 3169.
 — antiphlogistica Brerae. 523.
 — — P. Frankii. 2339.
 — diuretica Swediauri. 3445.
 — hydragoga Augustini. 1165.
 — Riverii. 2245.
 — temperaus Clari. 335.
 Pott's beruhigende Salbe. 1413.
 Potus antatrophicus Hufelandi. 2792.
 Pradier'sches Kataplasma. 3321.
 Präcipitat, weisser. I. S. 664.
 Protobromüre des Quecksilbers. I. S. 669.
 Protobromuretum Mercurii. I. S. 669.
 Protochloretum Hydrargyri. I. S. 697.
 Protoioduretum Hydrargyri. I. S. 672.
 — — Plumbi II. S. 297.
 Prunorum Pulpa. II. S. 309.
 Pulpa Colocynthis. I. S. 487.
 — Prunorum. II. S. 309.
 — Tamarindor. cruda et dep. II. S. 460.
 Pulsatillae nigricant. herba rec. II. S. 310.
 Pulver, Unzer's säuretilgendes kühlendes 888.
 Pulveres absorbentes stomachici et resolventes Brerae. 1374.
 — antifebriles compositi Brerae. 1182.
 — — resolventes Brerae. 1185.
 — deprimentes et adstringentes Brerae. 2398.
 — diuretici Brerae. 1511.
 — — cum Manganesio Brerae. 2539.
 — Sedlitzenses. 2520.
 — stomachici cum Zinco Brerae. 3627.
 — tonico-martiales Brerae. 1650.
 Pulvis adstringens Brerae. 1086.
 — aërophorus Cod. med. Hamb. 2692.
 — — Hufelandi. 2505.
 — — martialis Hufelandi. 1689.
 — — Vogleri. 2678.

- Pulvis alterans Plummeri. 478.**
 — — Edinburgensis.
 478.
 — antacidus Todii. 3074.
 — — Vogleri. 2508.
 — antarthriticus Portlandii.
 1766.
 — antatrophicus Hufelandi.
 1660.
 — antemeticus Vogleri.
 2178.
 — antepilepticus Hufelandi.
 3628.
 — — Marchionis re-
 rormatus. 2503.
 — antihectico - scrofulosus
 Kämpfii et Goelisii. 1135.
 — antimonialis Kämpfii. 511.
 — antiphlogisticus Pharm.
 Paup. Berol. 2334.
 — antiscrofulosus Goelisii.
 889.
 — antispasmodicus infantum
 Hufelandi. 886. 3597.
 — arsenicalis Bernhardi.
 639.
 — — Cosmii. 639.
 — — Hellmundi.
 642. a.
 — causticus Vindobonensis.
 2257.
 — Chinae factitiae Hufe-
 landi. 3239.
 — diaphoreticus Gräffii. 951.
 — — Hufelandi. 950.
 — — Pharm. Paup.
 477.
 — digestivus antihypochon-
 driacus Kleinii. 2381.
- Pulvis diureticus Cerutti. 2328.**
 3329.
 — — Pharm. mil. Bor.
 3330.
 — ecephracticus Sellii. 1146.
 — epilepticus niger. 1508.
 — fibrifugus Mortonii. 504.
 — febrifugus pauper. Disp.
 Fuld. 1073.
 — Foeniculi compos. 448.
 — galactopoens Hufelandi.
 447.
 — — Rosensteinii.
 448. 2510.
 — gummosus. 2608.
 — haemostaticus Bonafoux.
 1039.
 — — Graefii. 1497.
 — hydragogus Cerutti. 2328.
 3329.
 — Jacobi antimonialis. 506.
 — — febrifugus. 506.
 — Infantum Pharm. Sax.
 2509.
 — — Rosensteinii. 1069.
 1423.
 — Knoxii. 905.
 — leniens antihypochondria-
 cus Kleinii. 2381.
 — pectoralis demulcens
 Schneideri. 441.
 — — Sellii. 949.
 — — Vogleri. 1058.
 — — Wedelii. 2214.
 3490.
 — Puerorum Hufelandi.
 3116.
 — purgans Hufelandi. 2124.
 — purificans Hufelandi.
 1815.

- Pulvis purificans Kämpfii. 511.
 — resolvens Stahlii. 503.
 — Sacchari Lactis compositus Cod. med. Hamb. 2427.
 Pulvis sedativus Vogleri. 2104.
 — pro Sero Lactis artificiali. 2423.
 — — — — — artificiali gallicus. 2424.
 — contra Strumam Hedeni. 2140. 3452.
 — strumalis Meadii. 3451.
 — stypticus. 2399.
 — ad suffiendum Kleistii. 2379.
 — temperans. 2331.
 — vermifugus Schol. clin. Lips. 1299.
 Purgirkraut. I. S. 634.
 Purgirpillen, Heim's stärkere. 1835.
 Pyrethri radix. II. S. 312.

Q.

- Quassiae lignum. II. S. 315.
 Queckenwurzel. I. S. 628.
 Quecksilber. I. S. 663.
 — auflösliches. I. S. 726.
 — gereinigtes. I. S. 736.
 — versüßtes. I. S. 697.
 Quecksilberammoniak, salzs. I. S. 664.
 Quecksilberchlorid. I. S. 679.
 Quecksilberchlorür. I. S. 697.
 Quecksilberdeutobromür. I. S. 668.
 Quecksilberessigsalz. I. S. 663.

- Quecksilberiodid. I. S. 675.
 Quecksilberiodidul. I. S. 672.
 Quecksilbermohr, mineralischer. I. S. 730.
 Quecksilberniederschlag, weisser. I. S. 664.
 Quecksilberoxyd. I. S. 711.
 — — ätzendes salzsaures. I. S. 679.
 Quecksilberoxyd, blausaures. I. S. 669.
 — — hydrobromsaures. I. S. 663.
 Quecksilberoxydflüssigkeit, salpetersaure. I. S. 708.
 Quecksilberoxydul, essigsaureres. I. S. 663.
 — — graues. I. S. 718.
 — — mildes salzsaures. I. S. 697.
 — — phosphorsaures. I. S. 728.
 — — durch Reiben. I. S. 718.
 — — schwarzes. I. S. 726.
 Quecksilberoxydulflüssigkeit, salpetersaure. I. S. 709.
 Quecksilberpräcipitat, rothes. I. S. 711.
 — — weisses. I. S. 664.
 Quecksilberprotoiodür. I. S. 672.
 Quecksilbersalbe, Cirillo's. 1975.
 — — Cirillo's, von Hufeland verbessert. 1976.

Quecksilbersalbe, gelbe. I.
S. 710.

Quecksilbersublimat. I. S. 679.

Quendel. II. S. 428.

Quendelgeist. II. S. 429.

Quercus cortex junior. II. S.
318.

— glandes tostae. II. S.
321.

Quinin. I. S. 449.

Quitte. I. S. 533.

R.

Radix Arnicae. I. S. 250.

— Artemisiae vulgaris. I.
S. 263.

— Bardanae. I. S. 305.

— Belladonnae. I. S. 315.

— Bryoniae. I. S. 330.

— Caricis arenariae. I. S.
394.

— Caryophyllatae. I. S. 397.

— Cochleariae Armoraciae.
I. S. 479.

— Colchici. I. S. 484.

— Columbo. I. S. 491.

— Contrayervae. I. S. 504.

— Dictamni albi. I. S. 535.

— Fraxinellae. I. S. 535.

— Enulae. I. S. 551.

— Filicis maris. I. S. 599.

— Galangae. I. S. 612.

— Gentianae cruciatae. I.
S. 623.

— — rubrae. I. S. 623.

— Graminis. I. S. 628.

— Helenii. I. S. 551.

— Hellebori albi. I. S. 651.

— — nigri. I. S. 653.

Radix Jalapae. II. S. 1.

— Imperatoriae. II. S. 6.

— Inulae. I. S. 551.

— Ipecacuanhae. II. S. 17.

— Iridis florentinae. II. S.
29.

— Lapathi acuti. II. S. 107.

— Levistici. II. S. 113.

— Liquiritiae. II. S. 121.

— Melampodii. I. S. 653.

— Ononidis. II. S. 222.

— Oxylapathi. II. S. 107.

— Paeoniae. II. S. 226.

— Pimpinellae albae. II. S.
260.

— Polygalae amarae. II. S.
302.

— — Senegae. II. S.
304.

— — Virginianae. II.
S. 304.

— Pyrethri. II. S. 312.

— Ratanhiae. II. S. 322.

— Rhabarbari. II. S. 328.

— Rhei. II. S. 328.

— Salap. II. S. 365.

— Saponariae. II. S. 389.

— Sarsaparillae. II. S. 391.

— Sassaparillae. II. S. 391.

— Scillae. II. S. 399.

— Serpentariae Virginianae.
II. S. 426.

— Taraxaci. II. S. 466.

— Tormentillae. II. S. 470.

— Valerianae officinalis. II.
S. 478.

— Zedoariae. II. S. 496.

— Zingiberis. II. S. 514.

Ragolo's Geheimmittel gegen
Epilepsie. 3563.

- Rainfarnblumen. II. S. 463.
 Rainfarnkraut. II. S. 462.
 Rainfarnsamen. II. S. 464.
 Ratanhiawurzel. II. S. 322.
 Rattengift. I. S. 255.
 Rauschgelb. I. S. 262.
 Raute. II. S. 350.
 — wilde. I. S. 610.
 Reissblei. I. S. 632.
 Resina abietina. II. S. 265.
 — alba. II. S. 265.
 — Copaivae. I. S. 298.
 — Elemi. I. S. 550.
 — flava. II. S. 265.
 — Galbani. S. 614.
 — Guajaci nativa. I. S. 639.
 — Mastiches. II. S. 147.
 — Pini. II. S. 265.
 — — empyreumat. liquida. II. S. 268.
 — — — solida. II. S. 268.
 Rhabarberextrakt, zusammengesetztes. II. S. 340.
 Rhabarberwurzel. II. S. 328.
 Rhei extractum compos. II. S. 340.
 — radix. II. S. 328.
 Rhododendri chrysanthi folia. II. S. 341.
 Rhois radicans folia. II. S. 343.
 — toxicodendri folia. II. S. 343.
 Ricini oleum. II. S. 345.
 Ricinusöl. II. S. 345.
 Rinde, peruvianische. I. S. 431.
 — zusammenziehende brasilianische. I. S. 505.
 Rindsgalle. I. S. 559.
 Ringelblume. I. S. 356.
 Rochellesalz. II. S. 64.
 Rollgerste. I. S. 658.
 Roob antisymphilitique de Lafecteur. 3319.
 — Prunorum. II. S. 309.
 Rorismarini herba. II. S. 348.
 Rosenstein's Kindermilch 417.
 Rosmarinkraut. II. S. 348.
 Rossfenchelsamen. II. S. 253.
 Rothe Backenpillen. 1676.
 Rotulae aperientes Todii. 1603.
 Ruhrrinde. II. S. 429.
 Ruhrwurzel. II. S. 17. S. 470.
 Rüsterrinde. II. S. 474.
 Rusma der Türken. 649.
 Rust's Schmier- und Hungerkur. 2056.
 Rutae herba. II. S. 350.
- S.**
- Sabadillae semina. II. S. 353.
 Sabadillinum. II. S. 354.
 Sabadillsamen. II. S. 353.
 Sabinæ turiones. II. S. 357.
 Saccharum album. II. S. 364.
 — aluminatum. II. S. 364.
 — joviale Boerhaavii. 3462.
 — Lactis. II. S. 101.
 — Saturni. II. S. 282.
 Sadebaumspitzen. II. S. 357.
 Säure, arsenigte. I. S. 255.
 — preussische. I. S. 75.
 — thierische. I. S. 75.

- Safran. I. S. 506.
 SaiduSchützer Salz. II. S. 134.
 Saint-Germain-Thee. 3398.
 Sal absinthii citratum. II. S. 54.
 — alcali fluor. I. S. 154.
 — — minerale. II. S. 186.
 — — volatile. I. S. 140.
 — amarum. II. S. 134.
 — ammoniacum. I. S. 162.
 — — fixum. I. S. 348.
 — Anglicum. II. S. 134.
 — Carabe. I. S. 88.
 — catharticum. II. S. 134.
 — commune. II. S. 196.
 — culinare. II. S. 196.
 — Epsomense. II. S. 134.
 — essentielle Tartari. I. S. 95.
 — marinum. II. S. 365.
 — Martis. I. S. 592.
 — mirabile Glauberi. II. S. 202.
 — — perlatum. II. S. 200.
 — polychrestum de Seignette. II. S. 64.
 — Rochellense. II. S. 64.
 — Rupellense. II. S. 64.
 — SaiduSchützense. II. S. 134.
 — Sedlitzense. II. S. 134.
 — Succini depuratum. I. S. 88.
 — — volatile. I. S. 88.
 — Tartari. II. S. 40.
 — — crystallisatum. II. S. 44.
 — vegetabilis. II. S. 86.
 — volatile Cornu Cervi. I. S. 149.
 Salbe, Pott's beruhigende. 1413,
 Salbeiblätter. II. S. 375.
 Salep. I. S. 365.
 — indischer. I. S. 196.
 Salicinum. II. S. 373.
 Salicis cortex. II. S. 368.
 Salmiak. I. S. 162.
 — eisenhaltiger. I. S. 565.
 — fixer. I. S. 348.
 Salmiakgeist, ätzender. I. S. 154.
 — — anishaltiger. I. S. 160.
 — — wässeriger. I. S. 148.
 — — weiniger. I. S. 162.
 Salpeter, gereinigter. II. S. 70.
 — kubischer. II. S. 199.
 Salpeteräther. I. S. 102.
 Salpeteräthergeist. II. S. 435.
 Salpetergeist, versüsster. II. S. 435.
 Salpetersäure. I. S. 80.
 — — concentrirte. I. S. 82.
 — — rauchende. I. S. 82.
 — — verdünnte. I. S. 80.
 Salpeterspiritus, ätherischer. II. S. 435.
 Salviae folia. II. S. 375.
 Salz, englisches. II. S. 134.
 — epsomer. II. S. 134.
 — gemeines. II. S. 196.
 — saiduSchützer. II. S. 134.
 — seidlitzer. II. S. 134.
 Salzäther. I. S. 101.
 Salzäthergeist. II. S. 433.
 Salzgeist. I. S. 77.

- Salzgeist, versüsster. II. S. 433.
 Salznaphtha. I. S. 101.
 Salzölgeist. II. S. 433.
 Salzsäure. I. S. 77.
 Sambuci flores. II. S. 379.
 Sandriedgraswurzel. I. S. 394.
 Sandsegge. I. S. 394.
 Sapo albus. II. S. 381.
 — Alicantinus. II. S. 381.
 — antimonialis. I. S. 212.
 — chemicus. II. S. 385.
 — domesticus. II. S. 381.
 — Hispanus. II. S. 381.
 — medicatus. II. S. 385.
 — mollis. II. S. 388.
 — natronatus. II. S. 385.
 — niger. II. S. 388.
 — olei Crotonis. 1439.
 — stibiatus. I. S. 212.
 — Sulphuris. II. S. 77.
 — terebinthinatus. II. S. 275.
 — Venetus. I. S. 381.
 — viridis. II. S. 388.
 Saponariae radix. I. S. 389.
 Saponis stibiati Liquor I. S. 213.
 Sarsaparillae radix. II. S. 391.
 Sarsaparille, deutsche. I. S. 394.
 Sarsaparillenwurzel. II. S. 391.
 Sassafras cortex et lignum. II. S. 397.
 Sassafrasrinde und Holz. II. S. 397.
 Sassaparillae radix. II. S. 391.
 Saturnus. II. S. 282.
 Satzmehl. I. S. 194.
 Sauerhonig, einfacher. II. S. 150.
 Scammonium. II. S. 398.
 Schaben. II. S. 161.
 Schafgarbenkraut und Spitzen. II. S. 158.
 Schafthalm. I. S. 554.
 Schakarille. I. S. 401.
 Scharbockskraut. I. S. 481.
 Scheuerkraut. I. S. 554.
 Schierlingskraut. I. S. 495.
 Schiffpech. II. S. 268.
 Schlangenwurzel, virginische. II. S. 426.
 Schmier- und Hungerkur, Rust's. 2056.
 Schmierseife. II. S. 388.
 Schminkweiss. I. S. 322.
 Schneerosenblätter. II. S. 341.
 Schöllkraut. I. S. 426.
 Schotten. II. S. 99.
 Schwalbenwurzel. I. S. 426.
 Schwamm, gebrannter. II. S. 438.
 Schwefel, gereinigter. II. S. 449.
 — niedergeschlagener. II. S. 456.
 Schwefeläther. I. S. 103.
 Schwefeläthergeist. II. S. 437.
 Schwefelätherweingeist, eisenhaltiger. I. S. 572.
 Schwefelalkohol. I. S. 390.
 Schwefelanthrakokali. I. S. 207.
 Schwefelantimon. I. S. 218.
 Schwefelarsenik, gelber. I. S. 262.
 Schwefelblumen. II. S. 449.
 Schwefeljodüre. II. S. 456.

- Schwefelkali. II. S. 77.
 Schwefelkalk. I. S. 350.
 Schwefelkohlenstoff. I. S. 390.
 Schwefelleber, flüchtige. I. S. 177.
 Schwefelmagnesia. II. S. 133.
 Schwefelmilch. II. S. 456.
 Schwefelquecksilber, rothes. I. S. 732.
 — — schwarzes. I. S. 730.
 Schwefelsäure, gereinigte. I. S. 89.
 — verdünnte. I. S. 91.
 — versüsste. II. S. 437.
 Schwefelseife. II. S. 77.
 Schwefelspiessglanz, braunrothes. I. S. 214.
 Schwefelspiessglanz, pome-
 ranzenfarbenes. I. S. 209.
 Schwefelspiritus, ätherischer. II. S. 437.
 Schweitzer Wundkräuter. 3585.
 Schwererde. I. S. 306.
 — salzsaure. I. S. 306.
 Scillae radix. II. S. 399.
 Sclerotium Clavus. II. S. 414.
 Scordii herba. II. S. 413.
 Secale cornutum. II. S. 414.
 Sedum acre. II. S. 418.
 Seemoos, geperltes. I. S. 604.
 Seidelbastrinde. II. S. 156.
 Seidlitzer Salz. II. S. 134.
 Seife, gemeine. II. S. 381.
 — grüne. II. S. 388.
 — medicinische. II. S. 385.
 — spanische. II. S. 381.
 — venedische. II. S. 381.
 — weisse. II. S. 381.
 Seifenkrautwurzel. II. S. 389.
 Seifenspiritus. II. S. 385.
 Seignettesalz. II. S. 64.
 Selle's Brustpulver. 949.
 Semina Cannabis. I. S. 373.
 — Carvi. I. S. 396.
 — Cinae. I. S. 466.
 — Colchici. I. S. 486.
 — Foeniculi aquatici. II. S. 253.
 — Hyoscyami. I. S. 743.
 — Lini. II. S. 118.
 — Lycopodii. II. S. 124.
 — Phellandrii. II. S. 253.
 — Sabadillae. II. S. 353.
 — Santonici. I. S. 466.
 — Sinapis. II. S. 430.
 — Stramonii. II. S. 445.
 — Tanaceti. II. S. 464.
 Senegalgummi. II. S. 162.
 Senegawurzel. II. S. 304.
 Sensamen. II. S. 430.
 Sennaaufguss, gewürzhafter. II. S. 425.
 — zusammengesetzter. II. S. 425.
 Sennae electuarium. II. S. 424.
 — folia. II. S. 419.
 — infusum aromaticum. II. S. 425.
 — — compositum. II. S. 425.
 Sennalattwerge. II. S. 424.
 Sennesblätter. II. S. 419.
 Serpentariae Virginianae radix. II. S. 426.
 Serpylli herba. II. S. 428.
 Serum Lactis vaccini. II. S. 99.
 Sesquichloretum Ferri. I. S. 571.
 Sicherungsessig. I. S. 73.

- Silber. I. S. 233.
 — blausaures. I. S. 235.
 — reines. I. S. 244.
 — salpetersaures, krystal-
 lisirtes. I. S. 236.
 — salzsaures. I. S. 234.
 Silberglätte. II. S. 299.
 Silberoxyd. I. S. 244.
 Silbersalmiak. I. S. 233.
 Simarubae cortex. II. S. 429.
 Simarubarinde. II. S. 429.
 Sinapis semina. II. S. 430.
 Soda. II. S. 180.
 — depurata. II. S. 186.
 — gereinigte. II. S. 186.
 — vitriolata. I. S. 202.
 Solamen hypochondriacorum
 Kleinii. 702. 2380.
 Solutio arsenicalis Brerae. 631.
 — — Fowleri. 629.
 — — Harlessii. 632.
 — — Heimii. 630.
 — Calcis. I. S. 354.
 — Iodii ad usum exter-
 num Lugolii. 2159.
 — Iodii caustica Lugolii.
 2161.
 — — concentrata Lu-
 golii. 2154.
 — — rubefaciens Lu-
 golii. 2160.
 — iodurata Lugolii. 2153.
 — lithontriptica della Le-
 na. 2235.
 — spiritiosa olei Sinapis
 aetherei. 3432.
 — Veratrii Magendii. 3199.
 Sonnenkäfer. I. S. 478.
 Spanisch Weiss. I. S. 322.
 Spanische Fliegen. I. S. 375.
 Spanische Seife. II. S. 381.
 Spanischer Pfeffer. I. S. 380.
 Spargelsprossen. I. S. 275.
 Species amarae Pharm. paup.
 Berol. 3548.
 — diaphoreticae. 3276.
 — — Hufelandi.
 2464.
 — — Schol. clin.
 Lips. 3275.
 — diureticae. 2786.
 — hydragogae. 2786.
 — nervinae Hufelandi.
 3565.
 — pectorales. I. S. 119.
 — — Hufelandi.
 3584.
 — — Russicae. 3263.
 — pro balneis aromat.
 Schol. clin. Lips. 3422.
 — pro clysmate viscerali
 Kämpfii. 3537.
 — pro infuso pectorali.
 I. S. 119.
 Speichelwurzel. II. S. 312.
 Sperma Ceti. I. S. 419.
 Spiessglanz. I. S. 207.
 — schwarzer. I. S. 218.
 Spiessglanzbutter. I. S. 207.
 Spiessglanzmohr. I. S. 734.
 Spiessglanzmorsellen, Kun-
 kel's. 517.
 Spiessglanzoxyd, weisses. I.
 S. 216.
 Spiessglanzquecksilber, schwe-
 felichtes. I. S. 734.
 Spiessglanzschwefel, braun-
 rother. I. S. 214.
 Spiessglanzschwefel, pomeran-
 zenfarbener. I. S. 209.

- Spiessglanzschwefelkalk. I. S. 351.
 Spiessglanzseife. I. S. 212.
 Spiessglanzseifenlösung. I. S. 213.
 Spiessglanztinktur, scharfe. II. S. 51.
 Spiessglanzwein. I. S. 232.
 Spiessglanzweinstein. I. S. 221.
 Spiritus Angelicae compos. I. S. 202.
 — contra Scabiem Tru-
 seni. 2236.
 — Cornu Cervi rectifica-
 tus. I. S. 153.
 — Cornu Cervi succina-
 tus. I. S. 173.
 — Mindereri. I. S. 140.
 — muriatico - aethereus.
 II. S. 433.
 — Nitri acidus. I. S. 80.
 — — dulcis. II. S. 435.
 — — fumans. I. S. 82.
 — nitrico - aethereus. II.
 S. 435.
 — ophthalmicus Himlyi.
 1084.
 — Salis acidus. I. S. 77.
 — — ammoniaci anisa-
 tus. I. S. 160.
 — — ammoniaci aquo-
 sus. I. S. 148.
 — — ammoniaci causti-
 cus. I. S. 148.
 — — ammoniaci vino-
 sus. I. S. 162.
 — — dulcis. II. S. 433.
 — saponatus. II. S. 385.
 Spiritus saponatus composi-
 tus. 3291.
 — Serpylli. II. S. 429.
 — sulphurico - aethereus.
 II. S. 437.
 — sulphurico - aethereus
 ferruginos. I. S. 572.
 — Sulphuris. I. S. 91.
 — Terebinthinae. II. S.
 275.
 — theriacalis. I. S. 202.
 — Vini camphoratus. I.
 S. 372.
 — Vitrioli. I. S. 91.
 — — dulcis. II. S.
 437.
 Spongia calcinata. II. S. 438.
 — marina tosta. II. S.
 438.
 — usta. II. S. 438.
 Stabwurz. I. S. 67.
 Stärke. I. S. 194.
 Stärkemehl. I. S. 194.
 Stahlkugeln. I. S. 598.
 Stannum. II. S. 441.
 — granulatum. II. S. 441.
 — limatum. II. S. 441.
 — raspatum. II. S. 441.
 — muriaticum. II. S. 443.
 — — oxydulatum. II.
 S. 443.
 Stechapfelkraut. II. S. 444.
 Stechapfelsamen. II. S. 445.
 Stein, göttlicher. I. S. 520.
 — — St. Yves's. I. S.
 532.
 Steinkleekraut u. Spitzen. II.
 S. 150.
 Steinöl, rohes und gereinigtes.
 II. S. 250.

Sternanis. I. S. 204.

Stibium. I. S. 207.

— diaphoreticum ablut. I.
S. 216.

— sulphuratum nigrum
laevigat. I. S. 218.

Sticktoffsäure. I. S. 80.

Stiefmütterchen. II. S. 487.

Stinkasand. I. S. 265.

Stipites Dulcamarae. I. S. 545.

Storax, flüssiger. II. S. 447.

Stramonii herba. II. S. 444.

— semina. II. S. 445.

Streupulver. II. S. 124.

Strobili Humuli Lupuli. I.
S. 660.

Strychnia. II. S. 215.

Stychnin. II. S. 215.

— essigsäures. II. S. 217.

— salpeters. II. S. 218.

Strychninum. II. S. 215.

Strychnium. II. S. 215.

— aceticum. II. S. 217.

— nitricum. II. S. 218.

Sturmhut. I. S. 97.

Styrax liquida. II. S. 447.

Sublimat. I. S. 679.

— milder. I. S. 697.

Sublimatpillen, Dzondi's. 1923.

— — v. Gräfe's. 1926.

— — Hufeland's. 1922.

— — Krause's. 1927.

Subnitras bismuthicus. I. S.
322.

Succinum. II. S. 448.

Succus Catechu. I. S. 409.

— inspissatus Elaterii. I.
S. 548.

Süssholzwurzel. II. S. 121.

Suffimentum Smythii. 2351.

Sulphas aluminico-kalicus. I.
S. 128.

— Cadmii. I. S. 333.

— cinchonicus. I. S. 462.

— cupricus cum aqua. I.
S. 528.

— Ferri. I. S. 592.

— kalico-aluminicus. I.
S. 119.

— Magnesiae. II. S. 134.

— morphicus. II. S. 246.

— quinius. I. S. 451.

Sulphur Antimonii auratum.

— — I. S. 209.

— — auratum sa-
ponatum. I. S. 212.

— auratum liquidum. I.
S. 213.

— depurat. II. S. 449.

— iodatum. II. S. 456.

— praecipitatum. II. S.
456.

— stibiatum aurantiacum.
I. S. 209.

— — rubrum. I. S.
214.

Sulphuretum Antimonii luteum.
I. S. 209.

— Arsenici flavum. I.
S. 262.

— Calcii. I. S. 350.

— Calcis stibiatum. I.
S. 351.

— Hydrargyri nigrum.
I. S. 730.

— Hydrargyri rubrum.
I. S. 732.

— — simplex. I.
S. 730.

Sulphuretum Hydrargyri et Stibii. I. S. 734.

— Stibii nigrum. I. S. 218.

— — rubeum. I. S. 214.

Syrupus Amygdalarum. I. S. 188.

— Emetini Magendii. 2211.

— emulsivus. I. S. 188.

— pectoral. resolvens
Sellii. 556.

T.

Tabak, indischer. II. S. 123.

Tabaksblätter. II. S. 205.

Tabulae Sabinae Gardesii.
3217.

Talkerde. II. S. 127.

— edinburgher. II. S. 129.

— kohlsaure. II. S. 129.

— leichte. II. S. 129.

— lockere. II. S. 129.

— schwefels. II. S. 134.

Tamarindenmark, rohes und
gereinigtes. II. S. 460.

Tamarindenmuss, Hufeland's
künstliches. 3058.

Tamarindorum fructus. II. S.
460.

— — pulpa cruda et
depurata. II. S. 460.

Tanacetii flores. II. S. 463.

— herba. II. S. 462.

— semina. II. S. 464.

Tang, krauser. I. S. 604.

Tannas Chinii. I. S. 450.

— quinicus. I. S. 450.

Tanne. II. S. 263.

Tanninum. II. S. 465.

Taraxaci herba et radix. II.
S. 466.

Tartarus antimoniatum. I. S.
221.

— boraxatus. II. S. 67.

— chalybeatus. I. S. 596.

— depuratus. I. S. 88.

— emeticus. I. S. 221.

— ferruginosus. I. S. 596.

— martiatus. I. S. 596.

— natronatus. II. S. 64.

— solubilis. II. S. 86.

— stibiatus. I. S. 221.

— tartarisatus. II. S. 86.

— vitriolatus. II. S. 82.

— — acidus. II. S.
85.

Tartras Ferri et Potassae. I.
S. 596.

Taubenkropf. I. S. 610.

Tausendgüldenkraut. I. S. 413.

Taxi baccatae folia. II. S. 469.

Terebinthina communis. II.
S. 270.

— laricina. II. S. 270.

— Veneta. II. S. 270.

Terpenthin, gemeiner. II. S.
270.

— venedischer. II. S.
270.

Terpenthinöl. II. S. 275.

Terpenthinseife. II. S. 275.

Terpenthinspiritus. II. S. 275.

Terra Aluminis. I. S. 131.

— argillacea. I. S. 131.

— calcarea. I. S. 340.

— foliata mercurialis. I. S.
663.

— — Tartari. II. S. 36.

Terra foliata Tartari crystal-
 lisata. II. S. 180.
 — japonica. I. S. 409.
 — ponderosa salita. I. S.
 306.
 — Salis amari. II. S. 127.
 Teufelsdreck. I. S. 265.
 Theden's Schuss- oder Wund-
 wasser. I. S. 95.
 Thee, blankenheimer. I. S.
 619.
 — eröffnender. 2397.
 — mexikanischer. I. S.
 428.
 Theer. II. S. 268.
 Thierleim. I. S. 626.
 Thieröl, ätherisches. II. S.
 220.
 — stinkendes. II. S. 219.
 Thieröläther. II. S. 220.
 Thonerde. I. S. 131.
 Thranseife. II. S. 388.
 Thridax. II. S. 103.
 Thymian, wilder. II. S. 428.
 Tinctura Agarici muscarii
 Schneideri. 146.
 — Ambrae moschata. I.
 S. 133.
 — antarthritica Graefii.
 2274.
 — Antimonii acris. II.
 S. 51.
 — — Jacobi. I. S.
 213.
 — — tartarisata. II.
 S. 51.
 — antisyphilitica Besnar-
 di. 2250.
 — Arnicae. I. S. 253.
 — aromatica. I. S. 613.

Tinctura aromatico - acida. I.
 S. 94.
 — aurea nervino - tonica
 Lamottii I. S. 572.
 — Chinioïdini Pharm.
 Hamb. 1273.
 — contra Chlorosin. 3583.
 — diuretica Hufelandi.
 2223.
 — Ferri acetici aetherea.
 I. S. 564.
 — — hydriodati Pier-
 quini. 1626.
 — Fuliginis antihysterica.
 1723.
 — — Clauderi. 1722.
 — Gentianini alcalina.
 1774.
 — Guajaci ammoniata. I.
 S. 642.
 — — cum Taffia pa-
 rata. 1820.
 — — volatilis. I. S.
 642.
 — Hellebori albi. I. S.
 651.
 — herbae Chenopodii am-
 brosioidis. I. S. 429.
 — kalina. II. S. 51.
 — nervina Bestucheffii. I.
 S. 572.
 — odontalgica Güntheri.
 2645.
 — Opii crocata. II. S.
 239.
 — — simplex. II. S.
 237.
 — pectoralis Pharm. Suec.
 419.

- Tinctura prophylactica ad Cholera. 457.
- Salis Tartari. II. S. 51.
 - thebaica. II. S. 237.
 - Veneris volatilis. 1474.
 - Veratrii Magendii. 3198.
- Tischlerleim. I. S. 626.
- Tode's eröffnende Zeltchen. 1603.
- Fieberlattwerge. 1190.
 - wurmtreibende Morsellen. 1309.
- Todtenblume. I. S. 356.
- Tollkraut. II. S. 444.
- Tormentillae radix. II. S. 470.
- Tormentillwurzel. II. S. 470.
- Tränkchen, Wiener. II. S. 425.
- Traubenkraut, mexikanisches. I. S. 428.
- Trifolium fibrinum s. aquaticum. II. S. 472.
- Trochisci antacidi Todii. 2513.
- bechici albi Pharm. Hann. 437.
 - cum Emetino Magendii. 2212.
 - cum Hydriodate Ferri Pierquini. 1628.
- Tropfen, Hoffmann'sche. II. S. 437.
- Trousseau's Ammoniaksalbe. 323.
- Turiones Lupuli. I. S. 660.
- Sabinae. II. S. 357.
- Turpethum nigrum. I. S. 726.
- Tussilago Farfara. I. S. 559.
- U.**
- Ulmenrinde. II. S. 474.
- Ulmi cortex interior. II. S. 474.
- Unguentum Aegyptiacum. I. S. 518.
- ad ambusta Mynsichti. 2791.
 - Ammoniaci Trousseau. 323.
 - anthelminthicum. 3527.
 - antipsoricum Werlhofii. 1882.
 - antisypiliticum Cirillo. 1975.
 - — Cirillo a Hufelando correctum. 1976.
- Unguentum Calcis Hufelandi. 935.
- cereum. 1127.
 - corrosivum Graefii. 1978.
 - Elemi composit. 1552.
 - Enulae Hufelandi. 1563.
 - epispasticum Hufelandi. 1006.
 - Fuliginis Blandii. 1725.
 - graphiticum Brerae. 1799.
 - Hellebori albi Bietti. 1847.
 - Hydrargyri cinereum Wendtii pro Infantibus. 2053.
- Unguentum Hydrargyri citrinum. I. S. 710.
- Hydrargyri nitrati. I. S. 710.

Unguentum Hydrīodatis Ferri
Pierquini. 1632.

— narcotico - balsamicum
Hellmundi. 642. b.

— nervinum Pharm. Paup.
Berol. 322.

— nigrum Frickii. 593.

— ophthalmicum magicum
Guthriei. 594.

— — Janini. 1887.

— — Richteri.

2042.

— — St. Yvesii.
2041.

— contra Pediculos. 449.

— ad Perniones Bertoni.
3015.

— purgans. 1369.

— resolvens. 2012.

— ad Scabiem Aliberti.
3495.

— — — Jasseri.
3493.

— — — Neumanni.
3498.

— — — Pringlii.
3496.

— de Styrace. 3478.

— Sulphuris helleboratum
Pringlii. 1848.

— Sultanae. 434.

— Tartari stibiat. Auten-
riethii. 542.

Unzer's säuretilgendes kühl-
lendes Pulver. 888.

Urtica. II. S. 475.

Uvae Ursi folia. II. S. 475.

V.

Valerianae minoris radix. II.
S. 478.

— officinalis radix. II. S.
478.

— sylvestris radix. II. S.
478.

Vallet's Eisenoxydulpillen.
1646.

Vanilla. II. S. 484.

Veilchenwurzel, florentinische.
II. S. 29.

Venedische Seife. II. S. 381.

Veratrinum. II. S. 354.

Veratrium. II. S. 354.

Verbasci flores. II. S. 486.

Vermillon. I. S. 732.

Veronicae herba. II. S. 487.

Vina martiata composita Her-
bergeri. 1693. 1694. 1695.

Vinaigre de quatre voleurs.
I. S. 73.

Vinum. II. S. 494.

— amarum chalybeatum
Brerae. 1672.

— antimoniatum Huxhami.
I. S. 232.

— Antimonii. I. S. 232.

— aromaticum Pharm.
Gall. 3606.

— — cum Tannino.
3529.

— emeticum. I. S. 232.

— Ferri hydrīodati Pier-
quini. 1625.

— millepedatum Pharm.
Edinb. 2601.

- Vinum paregoricum. II. S. 239.
 — stibiatum. I. S. 232.
 Viola tricolor. II. S. 487.
 Virgaureae herba. II. S. 490.
 Virginische Schlangenzurzel.
 II. S. 426.
 Viride Aeris. I. S. 515.
 Viscum quernum. II. S. 491.
 Vitellus Ovi. II. S. 224.
 Vitis baccae recentes. II. S. 492.
 — pampini. II. S. 493.
 Vitriol, blauer. I. S. 528.
 — cyprischer. I. S. 528.
 — grüner. I. S. 592.
 — spanischer. I. S. 528.
 — weisser. II. S. 507.
 Vitriolgeist. I. S. 91.
 Vitriolnaphtha. I. S. 103.
 Vitriolöl, gereinigtes. I. S. 89.
 Vitriolum album. II. S. 507.
 — coeruleum. I. S. 528.
 — de Cypro. I. S. 528.
 — Martis (factitium). I. S. 592.
 — Veneris. I. S. 528.
 — Zinci. II. S. 507.
- W.**
- Wachholder, gemeiner. II. S. 33.
 Wachs, weisses u. gelbes. I. S. 414.
 Wadecke. II. S. 99.
 Waitz's Geheimmittel gegen Epilepsie. 3593.
- Wallnüsse. II. S. 30.
 Wallnussbaumblätter. II. S. 30.
 Wallrath. I. S. 419.
 Waschkrautwurzel. II. S. 389.
 Wasser, Goulardisches. II. S. 296.
 Wasserfenchelsamen. II. S. 253.
 Wasserklee. II. S. 472.
 Wassersilber. I. S. 663.
 Wasserstoffblausäure. I. S. 75.
 Wegschnecke, rothe. II. S. 117.
 Weidenrinde. II. S. 368.
 Weidenstoff. II. S. 373.
 Wein. II. S. 494.
 Weinbeeren, frische. II. S. 492.
 Weinbergschnecke. I. S. 650.
 Weinessig. I. S. 71.
 Weinranken, junge. II. S. 493.
 Weinraute. II. S. 350.
 Weinstein, auflöslicher. II. S. 86.
 — gereinigter. II. S. 88.
 — vitriolisirter. II. S. 82.
 Weinsteinerde, geblätterte. II. S. 36.
 Weinsteinkrystalle. II. S. 88.
 Weinsteinrahm, auflöslicher. II. S. 67.
 Weinsteinsäure. I. S. 95.
 Weinsteinsalz. II. S. 40.
 — wesentliches. I. S. 95.
 Weinstock. II. S. 492.
 Wermuth. I. S. 68.
 Wetzler's Kampherseife. 983.

Whytt'sches Magen- oder stärkendes Elixir. I. S. 449.

Wiegenkraut. I. S. 68.

Wiener Tränkchen. II. S. 425.

Wintergrün, doldentragendes. I. S. 430.

Wismuthkalk. I. S. 322.

Wismuthniederschlag. I. S. 322.

Wismuthoxyd, basisch - salpetersaures. I. S. 322.

Wohlverlei-Blumen und Wurzel. I. S. 245.

Wollkraut. II. S. 486.

Würznelken. I. S. 399.

Wunderbaumöl. II. S. 345.

Wundersalz. II. S. 202.

Wundkräuter, Schweitzer. 3585.

Wundstein. I. S. 520.

Wurmfarn. II. S. 462.

Wurmmoos. I. S. 655.

Wurmsamen. I. S. 466.

Wurmtang. I. S. 655.

Wurmtod. I. S. 68.

Wurzelsumachblätter. II. S. 343.

Z.

Zahnwurzel. II. S. 312.

Zaunrübe. I. S. 330.

Zedoariae radix. II. S. 496.

Zehrwurzel. I. S. 337.

Zeltchen, Tode's eröffnende. 1603.

Zimmt. I. S. 474.

— chinesischer. I. S. 404.

Zimmt. englischer. I. S. 404.

— französischer. I. S. 404.

Zimmtkassie. I. S. 404.

Zincum. II. S. 497.

— aceticum. II. S. 497.

— chloratum. II. S. 498.

— cyanogenatum. II. S. 500.

— ferroso - hydrocyanicum. II. S. 501.

— hydrocyanicum sine Ferro. II. S. 500.

— hydriodicum. II. S. 502.

— iodatum. II. S. 502.

— oxydatum aceticum. II. S. 497.

— — album. II. S. 503.

— — muriaticum. II. S. 498.

— sulphuricum. II. S. 507.

Zingiberis radix. II. S. 514.

Zink. II. S. 497.

— blausaures. II. S. 500.

— eisenblausaures. II. S. 501.

— essigsaures. II. S. 497.

— schwefelsaures. II. S. 507.

Zinkblumen. II. S. 503.

Zinkbutter. II. S. 498.

Zinkeisencyanür. II. S. 501.

Zinkjodüre. II. S. 502.

Zinkoxyd, essigsaures. II. S. 497.

- Zinkoxyd, salzsaures. II. S. 498.
 — weisses. II. S. 503.
 Zinkvitriol. II. S. 507.
 Zinn. II. S. 441.
 — gekörntes. II. S. 441.
 — geraspелtes. II. S. 441.
 — salzsaures. II. S. 443.
 Zinnfeile. II. S. 441.
- Zinnober, künstlicher. I. S. 732.
 Zittmann'sches Dekokt. 3316.
 Zittwersamen. I. S. 466.
 Zittwerwurzel. II. S. 496.
 Zucker, weisser. II. S. 364.
 Zwetschenmuss. II. S. 309.
 Zwiebel, gemeine. I. S. 107.

III. Register über die Krankheiten.

A.

- | | |
|--|--|
| Abdominalamaurose. 537. 538. | Adiposis. 730. 1363. |
| Abdominalstockungen, s. Unterleibsstockungen. | Afterorganisationen. 721. 1970. |
| Abdominaltyphus, s. Typhus abdominalis. | Aftervorfall, s. Prolapsus Intestini recti. |
| Ableitung nach den allgemeinen Bedeckungen. 927. 2927. 3434. | Agrypnia. 2122. 2428. 2429. 2617. 2833. 2852. 2853. 2864. |
| Ableitung nach den Füßen. 3430. | Agrypnia Infantum. 3116. 3117. |
| Abortus. 2983. | Alkaloïdvergiftung. 1756. 3245. |
| Abscessus. 1406. 3287. | Alpdrücken. 276. 287. 3157. |
| — frigidus. 1212. 2160. 2304. 3603. | Amaurosis. 121. 140. 311. 324. 526. 535. 536. 537. 538. 601. 621. 712. 872. 1010. 1103. 1845. 1938. 1939. 2584. 2601. 2773. 2775. 2892. 2894. 2896. 2901. 3060. 3063—3065. 3200. 3201. |
| — inflammatorius. 2115. 3288. | Amaurosis abdominalis. 537. 538. |
| Absonderungen, zur Bethätigung derselben. 1999. | Amaurosis ex Scabie suppressa. 622. |
| Abzehrung, s. Febris hectica und Tabes. | |
| Acne. 1294. 3501. 3502. | |

- Amblyopia. 140. 311. 1011.
 1084. 2584. 2901. (Vergl.
 „Augenschwäche.“)
 Amenorrhoea. 159. 169. 1159.
 1425. 1603. 1625—1629.
 1650. 1676. 1684. 1689.
 1853. 1854. 2147. 2302.
 2303. 2639. 2937. 3218.
 3382. 3540. 3582. (Vergl.
 „Menstruatio retenta“ und
 „Menstruatio suppressa.“)
 Amenorrhoea cum Chlorosi
 complicata. 2541. 3218.
 Anchylosis spuria. 3432. 3433.
 Aneurysma Art. coeliacae. 21.
 Angiectasis. 3222.
 Angina. 20. 315. 378. 726.
 1473. 2568. 2800. 2911.
 3269.
 Angina asthenica Infantum.
 1290.
 — atonica. 213. 281.
 1022. 2908. 2914. 2915.
 3272. 3666.
 Angina catarrhalis. 3270. 3280.
 3281.
 — chronica. 1023. 1489.
 3219. 3271. 3272. 3282.
 3371.
 Angina gangraenosa. 93. 353.
 977. 1417.
 Angina gangraenosa Infantum.
 1213. 1219. 1220. 3086.
 3437.
 Angina incipiens. 3230.
 — inflammatoria. 182.
 — membranacea. 584.
 1490. 1491. 1986. 2017.
 2280. 2353. 2357—2360.
 3050.
 Angina Pectoris. 576. 1533.
 2439. 2446.
 Angina rheumatica. 343.
 — scarlatinosa. 268. 269.
 2346.
 — scarlatinosa gangrae-
 nosa. 45. 79. 3375.
 Angina spasmodica Infantum.
 2620.
 — suppuratoria. 1066.
 1067. 2598.
 — syphilitica. 1957.
 — tonsillaris habitualis.
 193. 240.
 Anorexia. 1253. 1575. 1869.
 2974. 3426. 3608. (Vergl.
 „Magenschwäche“ u. „Ver-
 dauungsbeschwerden.“)
 Anorexia Hypochondriacorum.
 3139.
 Anschwellungen, einfache.
 2953. 2970.
 Anschwellungen, gichtische.
 682. 688. 689. (Vergl. „Ar-
 thritis.“)
 Anschwellungen, schmerzhaft.
 272.
 — — skrofulöse, s.
 Drüsenverhärtungen
 Apepsia, s. Dyspepsia.
 Aphonia hysterica. 670.
 Aphthae. 43. 932. 1289. 1290.
 2664. 2667—2670. 3266.
 3269.
 Aphthae gangraenosae. 1206.
 — Phthisicorum. 1035.
 1503.
 Aphthen, mit Mandelbräune
 verbunden, in Katarrhalie-
 bern. 2244.

- Aponeurosen, subinflammato-
rische Leiden derselben.
3432. 3433.
- Apoplexia. 23. 24. 81. 1099.
1845. 2387.
- Apoplexia serosa. 1370.
- Appetitlosigkeit, s. Anorexia.
- Arsenikvergiftung. 1647. 1.
S. 583. 2249.
- Arthritis. 9. 70. 120. 121.
170. 381. 405. 477. 500.
507. 508. 514. 515. 804.
919. 922. 950. 951. 1054.
1164. 1172. 1174. 1349.
1350. 1353. 1357. 1358.
1546. 1722. 1766. 1768.
1777. 1810. 1813. 1814.
1818—1820. 1824. 1825.
1969. 1975. 1976. 1994.
1997. 2099. 2274. 2374.
2375. 2601. 2684. 2865.
2904. 3014. 3158—3160.
3198. 3199. 3200. 3201.
3321. 3323. 3443. 3479.
- Arthritis acuta. 1937.
— anomala. 620.
— atonica. 117. 623. 2098.
2411. 2784. 3076. 3163.
3215. 3446.
- Arthritis chronica. 108. 481.
492. 688. 1539. 1570.
1708. 1881. 2087. 2354.
2900. 3161. 3164. 3314.
- Arthritis nervosa. 111. 119.
— nodosa. 380. 682. 688.
— retrograda. 370. 377.
2784.
— cum Syphilide compli-
cata. 112. 1937.
- Arthrocare. 3602. (Vergleiche
„Paedarthrocace“ u. „Spina
ventosa.“)
- Ascarides. 3. 11. 152. 176.
177. 673. 1317 — 1319.
1590. 1809. 1860. 1966.
2009. 2013. 2752. 2961.
3178. 3195. 3520. 3524.
3571. (Vergl. „Helminthia-
sis.“)
- Asthenia nervosa. 1614.
- Asthma. 251. 328. 329. 556.
926. 1555. 1562. 1743.
2225. 2439. 2488. 2738.
3338. 3488. (Vergl. „Eng-
brüstigkeit.“)
- Asthma arthriticum periodicum.
2193.
— convulsivum. 138. 274.
280. 811. 1107. 1108.
2190. 3645.
- Asthma Millari. 669. 672.
674. 675. 2618.
- Asthma pituitosum. 296. 454.
668. 1337. 1556. 1740.
1748. 2556. 2636. 3181.
3278. 3664.
- Athem, übelriechender, siehe
Foetor Oris.
- Athmungswerkzeuge, Reizung
derselben. 422.
- Atrabilarzustand. 811. 818.
- Atrophia. 1134. 1863.
— mesenterica Infantum.
299. 300. 685. 689. 1475.
1477. 1478. 1583. 1660.
2231. 2232. 2316. 2448.
2792. 3092. 3093. 3116.
3117.
- Atrophia scrofulosa. 1400.
(Vergl. „Scrofulosis.“)

- Auflockerungen, chron. 256.
 Aufsaugung, zur Bethätigung derselben. 805. 1999. 2169. 3180.
 Aufstossen, fauliges. 1033.
 — saures. 305. 887. 888. 2396. 3074.
 Augapfelwassersucht, s. Hydrophthalmus.
 Augen, Blattern in denselben. 971.
 — zum Schutz derselben bei den Blattern vor Entzündung. 2987.
 Augen, erhöhte Empfindlichkeit derselben in Folge von Ophthalmie. 3651.
 Augen, Gereiztheit derselben. 819.
 Augen, Quetschungen und Blutaustretungen in denselben. 606.
 Augen, Trockenheit derselben. 3003.
 Augenblennorrhoe, s. Ophthalmoblennorrhoea.
 Augenentzündung, s. Ophthalmia.
 Augenfell, s. Pannus u. Pterygium.
 Augengebilde, Wucherungen derselben. 88. 581.
 Augenhäute, Auflockerung derselben. 205.
 Augenkatarh, s. Ophthalmoblennorrhoea.
 Augenlider, eiterige Absonderungen derselben. 1463.
 (Vergl. „Ophthalmoblennorrhoea.“)
 Augenlider, Brand derselben. 901.
 — Erschlaffung u. Brennen derselben. 357.
 — Quetschungen derselben. 3271.
 — Schlaffheit derselben u. der Bindehaut. 1452.
 Augenlider, hysterische Verschiessung derselben. 605. 3474.
 Augenliderdrüsen, Auftreibung derselben. 1414. (Vergl. „Blepharophthalmia.“)
 Augenliderentzündung, s. Blepharophthalmia.
 Augenliderflechten. 3491. 3510. (Vergl. „Psorophthalmia.“)
 Augenlidergeschwüre. 2038.
 Augenliderjucken. 1941. 3649. (Vergl. „Psorophthalmia.“)
 Augenliderkrätze, s. Psorophthalmia.
 Augenliderkrampf, s. Blepharospasmus.
 Augenliderkupfer. 3491. 3500. 3510.
 Augenliderlähmung, s. Blepharoplegia.
 Augenliderränder, chron. Entzündung derselben. 72. (Vergl. „Blepharophthalmia.“)
 Augenliderräude. 3500. (Vergl. „Psorophthalmia.“)
 Augenliderschwiele, s. Tylosis.
 Augenlidervorfall, s. Blepharoptosis.
 Augenschmerzen, syphilitische u. arthritische. 2004.

Augenschwäche. 283. 1749. 3273. (Vergl. „Amblyopia.“)
 Ausdünstung, zur Beförderung derselben. 131. 135. 534. 954. 2198. 3279. 3438.
 Ausdünstung, zur Beförderung derselben in Fiebern. 16. 261. 335. 2712.
 Ausschlagsfieber, s. Febris exanthematica.
 Ausschwitzungen, s. Exsudate.
 Auswüchse, schwammige, der Augenlider. 41. (Vergl. „Exkrescenzen.“)
 Auswurf, zur Beförderung derselben. 242. 243. 248. 251. 254. 255. 348. 349. 424. 476. 482. 494. 827. 828. 1143. 1144. 1920. 1921. 2204. 2489. 2556. 2636. 2842. 3042. 3049. 3052. 3056. 3057. 3278. 3308. 3367.
 Auswurf, stinkender, in der Lungenschwindsucht. 1037.

B.

Bänder, Ausdehnung u. Quetschung derselben. 319.
 Balggeschwulst, s. Tumor cysticus.
 Bandwurm, s. Taenia.
 Bauch, dicker. 1363.
 Bauchfluss, s. Diarrhoea.
 Bauchwassersucht, s. Hydrops Ascites.

Beängstigungen, von Plethora abdominalis abhängig. 2233.
 Beinfrass, s. Caries.
 Bindehaut, Anschwellung und abnorme Absonderung derselben. 2035.
 Bindehaut, Auflockerung derselben. 865. 1452. 1464.
 Bindehaut der Augenlider, Wucherung derselben. 88. 581.
 Bindehautentzündung, s. Conjunctivitis.
 Bindehautgeschwür. 2038.
 Bisswunden toller Thiere. 1007. 2261. 2262.
 Blähsucht, s. Flatulentia.
 Blasenausschlag, s. Pemphigus.
 Blasenhämmorrhoiden, schleimige. 2508.
 Blasenkatarrh, s. Catarrhus Vesicae urinariae.
 Blasenkrankheiten. 342.
 Blasenlähmung, s. Cystoplegia.
 Blattern, s. Variolae.
 — in den Augen. 971.
 — zur Erzeugung solcher auf der Haut. 542. 543. 548. 551. 1881.
 Bleichsucht, s. Chlorosis.
 Bleikolik, s. Colica saturnina.
 Bleilähmung. 2772.
 Bleivergiftung. 2357.
 Blennorrhoea. 347. 432. 619. 734. 747. 748. 750. 751. 758. 759. 945. 996. 1091. 1114. 1445. 1545. 1610. 1612. 1645. 1760. 1790. 2400. 2468. 2469. 2634.

2635. 2637. 2938. 3055. 3098. 3424. 3528. 3557.
 Blennorrhoea dyscrasica. 2586.
 2587.
 — — ex Genitalibus Infantum. 1657. 1661.
 Blennorrhoea Intestini recti. 591. 2557.
 — — Pulmonum. 2466. 2489. 2554. 2593. 2890. 2975. 2981. 3557. (Vergl. „Catarrhus Pulmonum“ u. „Phthisis pulmonalis pituitosa.“)
 Blennorrhoea Urethrae, siehe Gonorrhoea.
 — — Vaginae, s. Fluor albus.
 — — Vesicae urinae, s. Catarrhus Vesicae urinae.
 Blepharitis impetiginosa. 2997.
 — scrofulosa. 711. 2997.
 Blepharoblennorrhoea. 2034. 2038. 3662. (Vergl. „Ophthalmoblennorrhoea.“)
 Blepharoblennorrhoea Neonatorum, s. Ophthalmia Neonatorum.
 Blepharophthalmia. 72. 594. 1414. 1918. 1942. 1974. 2036. 2037. 2038.
 Blepharoplegia. 311. 2456. 2584. 2901.
 Blepharoptosis. 1010. 1011.
 — — paralytica. 649.
 Blepharospasmus. 605. 798. 1109. 1427. 1749. 2823. 2861.
 Blutaderknoten, s. Varices.
 Blutaustretung. 358. 361.
 — — im Auge. 606. 3193.
 Blutbrechen, s. Haematemesis.
 Blutegelstiche. 2404. 2609.
 Blutenergie, Mangel an solcher. 1091. 1608. 1610. 1612.
 Blutfleckenkrankheit, s. Morbus maculosus.
 Blutflüsse, s. Haemorrhagiae.
 Blutgefäßsystem, Erregung desselben. 2333.
 Blutharnen, s. Haematuria.
 Blutspucken, s. Haemoptysis.
 Blutthätigkeit, zur Herabstimmung derselben. 1521.
 Blutunterlaufungen, s. Sugillationes.
 Bräune, s. Angina.
 — häutige, s. Angina membranacea.
 Brand, s. Decubitus, Gangraena u. Sphacelus.
 Brechdurchfall, s. Cholera.
 Brechweinstein - Vergiftung. 1756. 3245.
 Bronchien, chronische Leiden derselben. 3039.
 Bronchien, Schleimansammlung in denselben. 558. 1560. 1561. 1597. 2466. 2906.
 Bronchitis. 328. 329. 343. 2288.
 Bruch, eingeklemmter, s. Hernia incarcerata.
 Brüste, schmerzhaftes Anschwellen derselben bei Wöchnerinnen. 804.

- Brust, Zusammenschnürung derselben bei Hysterischen und Hypochondrischen. 421.
 Brustaffektionen. 926. 2295. 3294.
 — — chronische, ohne Entzündung. 2205. 3490. 3586.
 Brustaffektionen, chronische, von Hämorrhoiden abhängig. 3505.
 Brustaffektionen, entzündlich-katarrhalische. 2475.
 Brustaffektionen, katarrhalische. 338. 339. 345. 346.
 Brustaffektionen, katarrhalische, der Kinder. 1504. 2487.
 Brustaffektionen kleiner Kinder. 555. 3486. 3487.
 Brustbräune, s. Angina Pectoris.
 Brustentzündung, s. Pneumonia.
 Brustknoten. 284. 366.
 Brustkrankheiten. 184. 604. 1559.
 Brustkrebs. 3395.
 Brustmuskeln, Rheumatismus derselben. 3294.
 Brustverschleimung. 327. 340. 2276.
 Brustwarzen, wunde. 203. 579. 762 — 766. 2498. 2652. 3266. 3638. 3663.
 Brustwarzen, zur Verhütung ihres Wundwerdens. 1761.
 Brustwassersucht, s. Hydrothorax.
 Bubones. 149. 550. 1962. 1968. 2018. 2063. 2166. 3026. 3027. 3431. 3624.
 Bubones suppurantes. 1721. 2835. (Vergl. „Syphilis.“)
- C.**
- Cachexia. 1197. 1671. 1870.
 — arthritica. 1722. 2098. (Vergl. „Arthritis.“)
 Cachexia inveterata. 1475.
 Calculi biliarii. 136. 2941.
 — renales. 427. 428. 2787. 2788. 3594.
 — urinarii. 400. 2681. 2682.
 — vesicales. 427. 428. 2686. 3304.
 Calvities. 153. 1015. 1232. 1233.
 Carbunculus. 150.
 Carcinoma. 35. 405. 634. 637. 638. 640. 641. 642. 647. 717. 936—941. 1155. 1405. 1411. 1618. 1619. 1641. 1725. 1875. 1978. 2330. 2659. 2858. 3249. 3394. 2478. 3616. 3617.
 Carcinoma Colli Uteri. 201.
 — Cutis. 639. 938. 939.
 — Faciei. 642. 2141.
 — Intestini recti. 2828.
 — Labiorum. 3395.
 — Mammae. 3395.
 — Uteri. 35. 247. 1419. 1636. 2862.
 Cardialgia. 127. 286. 573. 574. 575. 663. 793. 796. 831. 832. 833. 835—840.

1085. 1106. 1166. 1475.
 1643. 1750. 1822. 1881.
 2109. 2189. 2437. 2616.
 2753. 2754. 2802. 2803.
 2818. 2952. 3074. 3082.
 3432. 3433. 3618. 3620.
 3626.
Cardialgia chlorotica. 1624.
 1640.
 — *pyrotica.* 411. 816.
 2179. 2499. 2504. 2694.
Caries. 64. 66. 68. 69. 2648.
 — *Dentium.* 904. 1095.
 1127. 1348. 2414. 2415.
 2560. 2562—2564. 2841.
Caries Ossiculorum Auditus.
 586.
 — *scrofulosa.* 689. 2417.
 — *syphilitica.* 1476. 2025.
 (Vergl. „Knochengeschwülste“ u. „Knochenleiden, syphilitische.“)
Caro luxurians. 2033.
Catalepsia. 2781.
Cataracta. 324. 3060. 3063.
 3066.
 — *incipiens.* 1946.
Catarrhus. 429. 441. 477.
 484. 949. 950. 951. 1139.
 1573. 2103. 2473—2475.
 2484. 2817. 3275. 3276.
 3279. 3438. (Vergl. „Tussis.“)
Catarrhus chronicus. 463.
 501. 603. 1060. 1061.
 1062. 1171. 1541. 1545.
 1562. 1811. 2516. 2517.
 (Vergl. „Tussis.“)
Catarrhus Infantum. 2546.
 2547. (Vergl. „Tussis Infantum.“)
Catarrhus Pulmonum. 1573.
 1574. 2201. 2465. 2931.
 3043. 3263. 3488. 3489.
 (Vergl. „Tussis.“)
Catarrhus Pulmonum chronicus. 241. 242. 249. 250.
 252—255. 290. 328—330.
 372. 482. 745. 926. 1754.
 1755. 1881. 2552. 2553.
 2557. 2888. 3045—3048.
 3259. 3260. 3265. 3337.
 3366. (Vergl. „Tussis.“)
Catarrhus Pulmonum inflammatorius. 334. 343.
 — *suffocativus.* 138. 251.
 328. 329. 485. 495. 829.
 2186. 3047. 3048.
Catarrhus Vesicae urinae.
 999. 1537. 1538. 1719.
 1727. 2557. 2788. 2931.
 3425. 3555—3557.
Cephaloematoma. 360. 989.
Cephalalgia. 103. 104. 2374.
 2375.
 — *arthritica.* 365. 2764.
 — *catarrhalis.* 2532.
 — *chronica.* 926.
 — *habitualis.* 1250.
 — *haemorrhoidalis.* 2762.
 — *hysterica.* 1613. 1892.
 2108. 2296. 2822. 3466.
Cephalalgia rheumatica. 365.
 1892.
 — *syphilitica.* 2818.
 — *vomitoria hysterica.*
 707.
Chankergeschwüre, s. Ulcera syphilitica.

- Chlorosis. 159. 168. 880.
 1592. 1595. 1608. 1610.
 1612. 1619. 1624. 1637.
 1643. 1644. 1650. 1667.
 1671. 1672. 1676. 1684.
 1696. 1744. 1746. 2540.
 3208. 3539. 3583.
 Chlorosis cum Amenorrhoea
 complicata. 2541. 3218.
 Chlorosis cum Hydrope com-
 plicata. 2539.
 Chlorosis cum Scrofulosi com-
 plicata. 1622.
 Cholera. 60. 370. 377. 397.
 — aestiva cum Spasmis.
 3446.
 — Infantum. 233. 985.
 — orientalis. 457. 964.
 1738.
 Chorda gonorrhoeica. 2431.
 Chorea Sti. Viti. 531. 654.
 698. 1083. 1167. 1488.
 1634. 2616. 2659. 2781.
 3614. 3621—3623. 3630.
 3646.
 Chorioiditis. 2055.
 Circulationskrankheiten ohne
 organische Fehler. 3200.
 3201.
 Clavi Pedum. 1455. 1753.
 Colica. 127. 133. 418. 574.
 575. 873. 1750. 2116.
 2118. 2624. 2694. 2802.
 2803. 2849.
 Colica arthritica. 133.
 — biliosa. 2506.
 — a Calculis biliariis.
 136.
 — — — renalibus. 808.
 flatulenta. 1183. 2577.
 2579. 2625. 2628. (Vergl.
 „Flatulentia.“)
 Colica flatulenta Infantum.
 2583. 3116. 3117. (Vergl.
 „Flatulentia Infantum.“)
 Colica haemorrhoidalis cum
 Diarrhoea. 431.
 — hysterica. 3432. 3433.
 — Infantum. 331. 417.
 1069. 1982. 2509. 3298.
 Colica menstrualis. 401. 2663.
 3618.
 — nervosa. 1106.
 — saturnina. 14. 85. 86.
 196. 197. 2352. 2480.
 2754. 2808. 2809.
 Colica verminosa. 175.
 Colliquationes. 1134.
 Coma. 1370.
 Combustio. 899. 934. 935.
 1129. 2483. 2791. 2797.
 3013. 3016. 3017. 3037.
 Comedones. 310.
 Commotio Cerebri. 2348.
 Condylomata. 230. 231. 472.
 473. 1455. 1457. 1971 —
 1973. (Vergl. „Syphilis.“)
 Congelatio. 899. 2677. (Vergl.
 „Perniones.“)
 Congestiones ad Cerebrum.
 2322. 2348. 2371. 2372.
 2387.
 Congestiones ad Pulmones.
 2371. 2372.
 Conjunctiva Palpebrarum, Wu-
 cherung derselben. 88. 581.
 (Vergl. „Bindehaut.“)
 Conjunctivitis. 1466.
 — — chronica. 865.
 1944.

- Contracturae arthriticae. 380.
1881. 2902. 2965. (Vergl.
„Paralysis arthritica.“)
- Contusiones. 2. 10. 22. 319.
358. 361. 362. 610. 626.
627. 1872. 2713. 3180.
3184. 3192. 3271. 3274.
3305. 3377.
- Contusiones in regione Oculi.
3193.
- Convulsiones. 564. 565.
(Vergl. „Krämpfe“ und
„Krankheiten, krampfhaft-
te.“)
- Convulsiones Infantum. 2241.
(Vergl. „Krämpfe der Kin-
der.“)
- Coryza chronica. 2006.
— sicca. 1447. 2532.
3488. 3489.
- Coxalgia. 107. 3203. (Vergl.
„Ischias.“)
- Coxalgia scrofulosa. 2083.
- Croup, s. Angina membra-
nea.
- Crusta lactea. 921. 1717.
2084. 3507. 3587—3590.
3592.
- Crusta lactea Adultorum. 1879.
- Cystoplegia. 1009. 1017.
1638.
— ex Partu difficili.
3216.
- Darmbeschwerden, krampf-
hafte. 467. 793. 1085.
1097. 1106. 2189. 2952.
3309—3311.
- Darmgeschwüre im Abdomi-
naltypus. 974.
- Darmgicht, s. Ileus.
- Darmkanal, Atonie desselben.
462. 613. 616. 1197.
1365. 1672. 1737. 2195.
2626.
- Darmkanal, krampfhafte Be-
wegungen desselben. 2849.
- Darmkanal, übermässige Reiz-
barkeit desselben mit Aus-
sonderung scharfer u. häu-
tiger Stoffe. 1126.
- Darmkanal, entzündliche Rei-
zung desselben. 2529. 2545.
- Darmkanal, zur Stärkung des-
selben nach Durchfall. 3152.
- Darmkanal, Verschleimung
desselben. 2734. 3120.
3121. 3550.
- Darmkanal, Verschleimung u.
Schwäche desselben bei
Kindern. 1657. 1661.
- Darmlähmung, typhöse. 3581.
- Darmschleimhaut, Reizung der-
selben. 2332.
- Decubitus. 224. 683. 1042.
1458. 3000. 3012. 3036.
- Decubitus, zur Verhütung des-
selben. 1130.
- Delirium tremens. 2183. 2286.
2385. 2804. 2806.
- Delirium tremens, zur Stär-
kung nach überstandenen.
134.

D.

- Dacryocystitis. 2830.
- Darmabsonderung, zur Beför-
derung derselben. 2520.

Dentitio difficilis. 680. (Vergl. „Zahnfieber“ und „Zahnkrämpfe.“)

Diabetes mellitus. 49. 380. 381. 1485. 1486. 1653. 2860.

Diarrhoea. 60. 127. 306. 435. 439. 440. 552. 1088. 1092. 1131. 1132. 1150. 1372. 1381. 1382. 1384. 1492. I. S. 578. 1763. 1778. 1779. 2400. 2626. 2630. 2795. 3094. 3232.

Diarrhoea atonica. 614. 616. 1089. 1320. 1373. 1377. 1380. 2401. 2820. 3098. 3149. 3424.

Diarrhoea atonica habitualis. 2195.

— chronica. 200. 275. 777. 942. 945. 1110 — 1112. 1115. 1116. 1330. 1448. 1881. 1965. 2182. 3256.

Diarrhoea colliquativa. 1086. 2399. 2407. 2850. 2964. 2978.

Diarrhoea dysenterica. 2815. 3553.

— ex ulceratione Intestini recti. 2641.

— gastrica. 1837.

— Infantum. 331. 336. 446. 450. 777. 841. 877. 886. 890. 944. 1071. 1083. 1378. 1379. 1383. 1657. 1661. 1735. 1982. 2507. 2512. 2607. 2629. 2761. 3116. 3117. 3144. 3233. 3597.

Diarrhoea Infantum febrilis. 2604.

— rheumatica. 961.

— typhosa. 2870.

Diarrhoe ohna Leibschnelden nach Typhus. 943.

Digestionsschwäche, s. Magenschwäche.

Dispositio apoplectica. 2387.

— phthisica. 2724.

Distensiones. 2953.

Distorsiones. 3305.

Dolores osteocopi syphilitici.

61. 62. 114. 1929. 2021. 2585. 2777. 3200. 3201.

Dolores osteocopi syphilitici cum complicatione arthritica. 1937.

Drüsengeschwülste, entzündliche. 2570.

— — kalte. 807.

— — syphilitische, s. Bubones.

Drüsenverhärtungen. 116. 257.

258. 259. 285. 366. 682.

722—724. 860. 892. 917.

924. 925. 984. 1031. 1368.

1385. 1394. 1415. 1536.

1586. 1881. 1908. 2059.

2060. 2069. 2083. 2119.

2147. 2291. 2302. 2307.

2312. 2313. 2355. 2356.

2416. 2571. 2680. 2683.

2699. 2951. 3179. 3293.

3374. 3455.

Drüsenverschwärungen. 1031.

Durchfall, s. Diarrhoea.

Dyscrasia rheumatica. 2098. (Vergl. „Rheumatismus.“)

- Dyscrasiae inveteratae. 924. 1976. 2218. 2304. 3314. 3316.
 Dysenteria. 60. 234. 306. 615. 1088. 1125. 1131. 1132. 1150. 1615. 1965. 2181. 2209. 2718. 2755. 2760. 2870. 3094. 3138. 3545. 3553.
 Dysenteria chronica. 1113.
 — inflammatoria. 343. 418. 3176.
 — inflammatoria biliosa. 2685.
 — putrida. 460. 943. 945.
 — rheumatica. 418. 553. 2814. 3176.
 — ex ulceratione Intestini recti. 2641.
 Dysmenorrhoea hysterica 678.
 Dyspepsia. 6. 170. 703. 880. 1594. 1667. 2187. 2974. 3136. 3665.
 Dyspepsia ex abusu Spirituorum. 2700.
 Dyspepsia ex Menstruatione imminuta. 3618.
 Dysphagia. 793. 1881.
 Dysuria. 180. 2493 — 2295. 2738.
 — Infantum. 2492.
- E.**
- Ecchymosis. 289.
 Eclampsia Infantum. 657.
 Eczema chronicum. 273. 2062. 2290. 2659. 2701.
 — während der Menstruation. 2675.
 Eichelgeschwüre. 2064.
 Eierstock, Hypertrophie desselben. 1030.
 Eierstockwassersucht, s. Hydrops Ovarii.
 Eisensplitter im Auge, zur Auflösung solcher. 42.
 Eitergeschwülste. 3287. (Vergl. „Abscessus.“)
 Eiterung, übermässige, nach Verbrennung. 3552.
 — zur Verbesserung desselben. 767. 2646. 3221.
 Elephantiasis. 635. 713. 715. (Vergl. „Lepra.“)
 Elytritis. 343.
 Encanthis chronica. 3653.
 Encephalitis. 2348. 2523. 2525.
 Engbrüstigkeit. 1555. (Vergl. „Asthma.“)
 — — krampfhaftes, schleimiger Körper u. starker Biertrinker. 3634. (Vergl. „Asthma.“)
 Engbrüstigkeit, krampfhaftes, kleiner Kinder. 2615. (Vergl. „Asthma Millari.“)
 Enteritis. 2803.
 — Infantum. 2343.
 — stercoraria. 676.
 Entropium. 88.
 Entzündung, s. Inflammatio.
 Entzündungsfieber, s. Febris inflammatoria.
 Entzündungsgeschwülste. 3288.
 Entzündungsresiduen. 2970.
 Enuresis. 712. 2762.
 — paralytica Puerperarum. 1003. 1004.

- Ephelis. 310. 823. 1341.
 2239. 3429. 3510.
- Epilepsia. 148. 309. 564. 565.
 567—573. 576. 652. 653.
 655. 697. 698. 699. 790.
 813. 869. 1480. 1481.
 1483. 1484. 1487. 1488.
 1493. 1507—1509. 1615.
 1616. 2137. 2138. 2142
 —2144. 2503. 2616. 2659.
 2743. 2757. 2782. 2799.
 2856. 2892. 2894. 2898.
 3392. 3393. 3464. 3467.
 3561. 3563. 3564. 3573.
 3574. 3596. 3598. 3601.
 3614. 3628. 3629. 3633.
 3643. 3646.
- Epilepsia cerebialis. 2088.
 — Infantum. 561.
- Epistaxis. 206. 854. 1648.
 1685. 3383. 3547.
- Erbgrind, s. Tinea Capitis.
- Erbrechen, chronisches, s.
 Vomitus chronicus.
 — zur Erregung von sol-
 chem. 436. 518—522. 1844.
 2173—2177. 2199—2002.
 2210. 2282. 3641. 3642.
 3644.
- Erbrechen, zur Erregung von
 solchem bei Kindern. 554.
- Erectiones. 956. 979.
- Erethismus Nervorum. 387.
- Erfrierung, s. Congelatio und
 Perniones.
- Erhitzung im Sommer. 101.
 106. 1331. 2520. 3668.
- Ernährung, zur Beförderung
 derselben. 861. 1133. 1715.
 1716. 1775. 1842. 1863.
 1864. 2795. 2796. 3231.
 3238.
- Ernährung der Kinder, zur
 Beförderung derselben. 412.
- Erregung, zur Hebung dersel-
 ben. 131. 132. 288. 1093.
 1152. 2613. 2844. 2973.
- Erschlaffung, allgemeine. 1091.
- Erysipelacea. 2344.
- Erysipelas. 965. 966. 967.
 1515. 2526. 2528.
 — Faciei. 3610.
- Exanthem, zur Erzeugung ei-
 nes künstlichen. 90. 1444.
- Exanthemata acuta, s. Febris
 exanthematica.
 — acuta retrograda.
 291. 2812.
 — chronica. 50. 273.
 383. 392. 465. 490. 511.
 515. 539. 647. 778. 922.
 1064. 1388. 1546. 1547.
 1720. 1793. 1815. 1818.
 1819. 1846. 1917. 1949.
 1997. 2048. 2080. 2094.
 2098. 2139. 2225. 2366.
 2441. 2442. 2516. 2517.
 2542. 2586. 2587. 2589.
 2659. 2931. II. S. 388.
 3313. 3322. 3551. 3593.
 3639.
- Exanthemata chronica Infan-
 tum. 3588—3590. 3592.
- Exanthemata dyscrasica. 2586.
 2587.
 — Faciei. 1950. 3167.
 3501.
 — scrofulosa. 1137.
 3502.

Exanthemata scrofulosa Infantum. 2073. 2092. 3116. 3117.

Exanthemata syphilitica. 470. 1720. 1878. 1900. 1952. 1963. 2028.

Exanthemata tuberculosa. 3502.

Exantheme mit überwiegender Vegetation. 1799.

Exkorationen. 3037. 3090. 3638.

— — schmerzhaft. 3017.

— — von langem Liegen. 224.

— — der Wangen in Folge scharfer Thränen. 3033.

Exkrescenzen, fleischige, schwammige. 1978.

Exkrescenzen, syphilitische u. gonorrhoeische. 76.

Exostosis. 719.

Exsudate, chronische. 259. 270. 360. 361. 362.

Exsudate, entzündliche lymphatische, in äusseren Theilen. 3020.

Extravasatio Sanguinis. 358. 361.

— — — in Oculo. 606. 3193.

F.

Faulfieber, s. Febris putrida.

Favus, s. Tinea Capitis.

Febris adynamica. 40.

Febris asthenica. 962. 990. 3418. 3567. 3568.

— biliosa. 1785. 2284. 3513.

— catarrhalis. 335. 337. 505.

— catarrhalis nervosa. 959. 2206.

— cephalica. 3609.

— Dentitionis. 398. 1286.

— Dentitionis cum Spasmodis. 2548.

— exanthematica. 38.

265. 279. 335. 369. 1416. 2528. 2545. 2812.

Febris exanthematica nervosa. 291. 2812.

— gastrica. 528. 1211. 1784. 2283.

— hectica. 1133. 1134. 2288.

— hypersthenica. 725. 1862.

— hyposthenica. 1211.

— inflammatoria. 279. 502. 1328.

— intermittens. 99. 350.

384. 385. 404. 479. 504.

506. 532. 533. 629—632.

636. 1019. 1020. 1072—

1075. 1079. 1124. 1147.

1175—1182. 1184—1188.

1190—1192. 1194. 1195.

1202. 1203. 1210. 1211.

1239. 1241. 1243—1249.

1251. 1256. 1257. 1261

—1264. 1267. 1269. 1271

—1283. 1321. 1482. 1596.

1615. 1775. 2471. 2659.

2706. 2893. 2974. 3068.

3239. 3240. 3243. 3244.
 3247. 3255. 3257. 3258.
 Febris intermittens ex causa
 gastrica. 1182.
 — intermittens Infantum.
 633. 1222. 1240. 1260.
 — intermittens maligna.
 1194. 1209. 1211. 1247.
 Febris intermittens quartana.
 812. 1177. 1178. 1184.
 1666. 1852.
 Febris intermittens, in der Re-
 konvalescenz nach solcher.
 1594.
 Febris nervosa. 452. 878.
 978. 1284. 3415. 3417.
 Febris nervosa gastrica. 451.
 — — lenta. 1193.
 2421.
 — — stupida. 290.
 453. 458. 597. 598. 3420.
 3580.
 Febris nervosa versatilis. 27.
 263. 264.
 — nervosa versatilis cum
 Spasmis et deglutitione
 impedita. 2622.
 — nervosa cum affectione
 Pulmonum. 328. 329.
 — pituitosa. 2276.
 — putrida. 15. 84. 96.
 195. 263. 264. 451. 943.
 958. 990. 1199. 1329.
 2378. 3415.
 Febris rheumatica. 279. 335.
 505.
 — rheumatica catarrhalis.
 262. 3277.
 — rheumatica Infantum.
 266.
 Febris rheumat. nervosa. 959.
 — simplex. 279. 369. 1286.
 — simplex Infantum.
 2285.
 — typhosa, s. Typhus.
 — verminosa Infantum.
 398.
 Feigwarzen, s. Condylomata
 u. Verrucae syphiliticae.
 Fettsucht. 730.
 Fieber, s. Febris u. Krank-
 heiten, fieberhafte.
 Fieberbewegungen, kleine,
 bei Kindern im ersten Le-
 bensjahre. 3116. 3117.
 Filzläuse. 1953.
 Finnen. 388. 825. 826.
 Fissura Ani. 2828. 2998.
 Fistula Intestini recti. 2828.
 2998.
 — lacrymalis. 580. 1943.
 — scrofulosa. 690. 2159.
 2165.
 Fistulae. 69. 933. 1012. 1212.
 1978. 3089. 3376.
 Flatulentia 170. 328. 329.
 466. 703. 878. 1070. 1085.
 1374. 2191. 2197. 2533.
 2565. 2594. 2595. 2625.
 2628.
 Flatulentia Infantum. 450.
 464. 1069. 1071. 1657.
 2514. 2578. 2629. 3116.
 3117.
 Flechten, s. Herpes.
 Flechtengeschwüre, s. Ulcera
 herpetica.
 Flecke, skorbutische, s. Macu-
 lae scorbuticae.
 Fleisch, wildes. 2033.

Fluor albus. 592. 743. 747.
 748. 750. 752. 849. 898.
 1114. 1214. 1223. 1349.
 1418. 1625 — 1629. I. S.
 578. 1639. 1645. 1651.
 1669. 1671. 1674. 1684.
 1757. 2258. 2303. 2508.
 2650. 2651. 2869. 2872.
 2936. 2992. 3010. 3055.
 3087. 3097. 3108. 3208.
 3220. 3249. 3388. 3477.
 3530.

Fluor albus mit Neigung zur
 Verstopfung. 1609.

Fluss, weisser, s. Fluor albus.

Fluxus coeliacus. 1330.

Foetor Oris. 237. 894. 895.
 896. 904. 1036.

Foetor Oris ex Dentibus ca-
 riosis. 2560. 2562.

Fracturae. 3030. 3037.

Friesel, s. Miliaria.

Frostbeulen, s. Perniones.

Fruchthälter, s. Gebärmutter.

Furunculus. 774.

Fussgelenk, Schwamm dessel-
 ben. 907.

Fussgeschwüre. 768. 769.
 898. 1130. 1215. 3154.

Fussgeschwüre, kallöse. 2044.

Fussschweisse, unterdrückte.
 257. 351. 682.

G.

Gallenabsonderung, fehlerhafte.
 1376. 3536.

— — träge. 2678.
 3550.

Gallenabsonderung, Unter-

drückung derselben. 155.
 164.

Gallenanhäufung. 2506.

Gallenfieber, s. Febris biliosa.

Gallensteine, s. Calculi bi-
 liarii.

Gallensteinkolik, s. Colica a
 Calculis biliariis.

Gallensystem, bei Erregung
 desselben. 2333.

Gangliennerven, zur Erhebung
 ihrer Thätigkeit. 536.

Gangliennerven, Verstimmung
 derselben. 1617.

Gangraena. 608. 1040. 1041.
 1043. 2350. (Vergl. „Spha-
 celus.“)

Gangraena a Decubitu. 224.
 683. 1042. 1130. 1458.

Gangraena humida. 968. 969.
 — nosocomialis. 899.
 955.

— Praeputii et Penis.
 1041.

— senilis ex erethismo.
 294. 2811.

Gastralgia, s. Cardialgia.

Gastricismus, durch Verstim-
 mung des Gangliennerven-
 systems. 1617. (Vergl. „Sta-
 tus gastricus.“)

Gastritis. 2430.

— chronica. 548.

Gastrodynie, rheumatisch-ner-
 vöse, mit Neigung zu
 abnormen Blutungen. 835.
 (Vergl. „Cardialgia.“)

Gastromalacia. 77. 78. 1611.
 2631.

Gastromalacia Infantum. 1288.

- Gaumensegel, lymphat. Anschwellung desselben. 210.
- Gebärmutter, Atonie desselben. 3204. 3211. 3214. 3220. 3226. 3229.
- Gebärmutter, Auflockerung desselben. 3226.
- Auftreibung desselben. 3220.
- Ausdehnung desselben. 3212. 3217.
- Hypertropbie desselben. 1030. 1606. 1621.
- Gebärmutter, aktive Kongestionen zu desselben. 1096.
- Gebärmutter, Stockungen in desselben. 1998.
- Gebärmutter-Blutfluss, s. Metrorrhagia.
- Gebärmutterkrämpfe, welche Fehlgeburt drohen. 1096.
- Gebärmutterkrebs, s. Carcinoma Uteri.
- Gebärmutter - Skirrhus. 34. 2312.
- Gebärmuttersystem, Stockungen in demselben. 2455.
- Gebärmutterverhärtung. 1998.
- Geburtswehen, s. Wehen.
- Geburtszögerung. 3386. (Vergl. „Wehen, zu schwache.“)
- Gefäßsystem, Aufregung desselben. 2859.
- erhöhte Reizbarkeit desselben. 2883. 2912.
- Gehirnaffektion. 324.
- — in Folge örtlicher Verletzung. 1370.
- Gehirnentzündung, s. Encephalitis.
- Gehirnerschütterung, s. Comotio Cerebri.
- Gehirnfieber. 3609.
- Gehirnhäute, Ansschwitzungen zwischen denselben. 2307.
- Gehirnhautentzündung, s. Meningitis.
- Gehirnkrankheiten. 2532.
- Gehörknöchelchen, Caries desselben. 586.
- Geisteskrankheiten, s. Seelenstörungen.
- Gekrösdrüsen, skrofulöse Auftreibung desselben bei Kindern. 2231. 2232. 2448. (Vergl. „Atrophia mesenterica Infantum.“)
- Gelbsucht, s. Icterus.
- Gelenkaufreibung durch Verdickung des Zellgewebes. 89.
- Gelenkgeschwülste, chronische. 2012. 2881. 3432. 3433.
- Gelenkgeschwülste, rheumatische. 260. 1357.
- — skrofulöse. 2714. (Vergl. „Rhachitis.“)
- Gelenkgeschwülste mit Steifigkeit. 859. 860.
- Gelenkleiden, subinflammatorische. 3432. 3433.
- Gelenk - Rheumatismus, s. Rheumatismus Articulorum.
- Gelenkschmerzen, gichtische. 70. 1813. (Vergl. „Arthritis.“)
- Gelenkschmerzen, rheumatische. 319. 516. 1352. 1817. 1821. 2066. (Vergl. „Rheumatismus.“)
- Gelenkwassersucht. 362.

- Gemüthskrankheiten**, s. Seelenstörungen.
- Gerstenkorn**, s. *Hordeolum*.
- Geschlechtstheile**, erhöhter Erethismus derselben. 2454.
- Geschlechtstheile**, Krämpfe derselben. 1159.
- Geschlechtstheile**, Schleimflüsse aus denselben, bei Kindern. 1657. 1661.
- Geschlechtstheile**, weibliche, Jucken derselben. 382. 2020. 2164. 2237. 2675. 2687. 2704. 3465.
- Geschlechtstrieb**, zur Anregung desselben. 238.
- Geschwülste**. 3286. 3289.
 — asthenische. 2877.
 — entzündliche. 368. 3288.
 — harte. 1587. 2160.
 — kalte. 256. 257. 807. 1570. 1872.
 — skrofulöse. 722. 723. 729. 789. 1872. 2165. 2171. 2714. 2717. (Vergl. „Drüsenverhärtungen.“)
- Geschwülste**, speckige u. faserig-knorplige. 3616.
 — unempfindliche. 3290.
- Geschwulst**, weisse, s. *Tumor albus*.
- Geschwüre**, s. *Ulcera*.
 — zur schnelleren Vernarbung solcher. 3024.
 — künstliche, zur Erzeugung solcher. 475. 1005. 1978.
- Geschwüre**, künstliche, zum Offenerhalten derselben. 2590.
- Geschwüre**, syphilitische, s. *Ulcera syphilitica*.
- Geschwürsflächen**, stinkende, zur Reinigung und Verbesserung derselben. 898.
- Gesichtsausschläge**. 1950.
- Gesichtsausschlag**, herpetischer. 3167. 3501.
- Gesichtsgeschwüre**, s. *Ulcera Faciei*.
- Gesichtskrebs**, s. *Carcinoma Faciei*.
- Gesichtsschmerz**, s. *Prosopalgia*.
- Gicht**, s. *Arthritis*.
- Glaucoma**. 2861.
- Glossoplegia**. 2917. 3073. 3428.
- Gonorrhoea**. 216. 217. 431. 432. 587. 588. 590. 661. 732—735. 742. 746—748. 750. 754. 992. 993. 1446. 1506. 1757. 2258. 2303. 2427. 2825. 2827. 2867. 2945—2947. 2995.
- Gonorrhoea inflammatoria**. 994. 995.
- Gonorrhoea secundaria**. 98. 215. 588. 736—741. 743. 744. 752. 755. 756. 849. 1252. 1398. 1418. 1449. 1450. 1593. 1670. 1678 —1680. 1686. 1897. 2065. 2157. 2365. 2403. 2508. 2651. 2993. 2994. 3101. 3477. 3530. 3558. 3612. 3647. 3648. 3653. 3654.

Granulation, zur Beförderung
derselben. 2646.

Grind, s. Tinea Capitis.

Grippe. 2276.

Gutta rosacea. 1294. 3501.
3502.

H.

Haare, Ausfallen derselben.
153. 1015. 1232. 1233.
(Vergl. „Calvities.“)

Haare, zum Schwarzfärben
derselben. 1762. 3028.

Haare, zum Wegätzen dersel-
ben. 649. 650.

Haarwuchs, zur Beförderung
desselben. 1231. (Vergl.
„Calvities.“)

Haematemesis. 2116. 2378.
2707. 2805. 2983.

Haematuria. 1223. 3383.

— chronica. 3591.

Haemoptysis. 91. 435. 1714.
2105. 2116. 2377. 2410.
2707. 2708. 2725. 2805.
2883. 2979. 2980. 3100.
3383. 3528.

Haemoptysis, haemorrhoidalis.
3488. 3489.

— pro Menstruatione vica-
ria. 2665.

— passiva. 2400. 2839.

— Phthisicorum. 3390.

— spastica. 2110. 2123.
2337. 2810.

Haemorrhagiae. 103. 104.
1114. 1483. 2105. 2377.
2399. 2402. 2733.

Haemorrhagiae internae. 2397.

— parenchymatosae. 1496.
1497. 1758. 2609.

— passivae. 87. 190.
198. 200. 945. 1207.
2982. 2983. 3095 — 3098.
3103. 3541. 3542. 3544.

Haemorrhagiae perniciosae.
2976.

— scorbuticae ex Ore.
3085.

— traumaticae. 1039.
2929.

Hämorrhoidalbeschwerden.

1166. 1580. 2374. 2375.
2380. 2381. 2527. 3125.
3504. 3506. 3508. 3533.

Hämorrhoidalbeschwerden mit
herpetischer oder rheuma-
tischer Complication. 2519.

Hämorrhoidalbeschwerden,
krampfhaft und schmer-
zende im Mastdarme. 2009.

Hämorrhoidalfluss, zur Beför-
derung desselben. 161. 166.
1426. 2678.

Hämorrhoidalfluss, übermässig-
er. 102. 1763. 2400.
2597. 2962.

Hämorrhoidalfluss, unterdrück-
ter. 155. 1854.

— — zurückbleiben-
der. 3481. 3482.

Hämorrhoidalknoten. 2527.

— — eingeklemm-
te. 221.

— — entzündete.
3019.

— — erschlaffte.
1223. 1764.

- Hämorrhoidalknoten, schmerz-
hafte. 220. 1429.
- Hämorrhoidalkongestionen mit
Schwäche. 2722.
- Hämorrhoidalkrankheit. 2382.
2386.
- Hämorrhoidalleiden mit Ge-
fässatonie. 3485.
- Hämorrhoidalstockungen.
2591.
- Hämorrhoiden, schleimige.
1763.
- Hände, aufgesprungene. 434.
- Hals, Trockenheit desselben
bei Schwindsüchtigen. 1503.
- Halsbeschwerden, syphilitische.
585. (Vergl. „Syphilis.“)
- Halsentzündung, s. Angina.
- Halsgeschwüre, syphilitische.
59. 1402. 1896. (Vergl.
„Syphilis.“)
- Harnabsonderung, mangelnde,
mit Reizung der Blase. 3595.
- Harnabsonderung, zur Beför-
derung derselben. 4. 2520.
2909. 2960. 2966. 2967.
3342. 3343. 3346. 3549.
3554.
- Harnabsonderung, zur Beför-
derung derselben bei Kin-
dern. 3435.
- Harnbeschwerden. 1143.
(Vergl. „Dysuria.“)
- Harnbeschwerden, krampfhaf-
te. 1159.
— — krampfhaft,
nach Tripper. 661.
- Harnblase, Schafftheit dersel-
ben. 1009. 1538.
- Harnblase, Schwäche dersel-
ben. 2762.
— krampfhaft Strikturen
des Sphinkters derselben.
2117.
- Harnblasengeschwüre. 1780.
- Harnblasenhals, Reizung des-
selben. 956.
- Harnblasen-Krankheiten. 342.
- Harnblasenlähmung, s. Cysto-
plegia.
- Harnblasenschleimhaut, Ent-
zündung derselben. 992.
993.
- Harnblasen-Skirrhus. 341.
- Harngries. 1537. 2287.
- Harnröhre, Geschwüre in der-
selben. 749. 2826.
— krampfhaft Strikturen
derselben. 2117.
— krampfhaft Zusam-
menziehungen in derselben.
803. 808.
- Harnröhre, Verdickung ihrer
Schleimhaut. 1029.
- Harnruhr, honigartige, s. Dia-
betes mellitus.
- Harnsteine, s. Calculi urinarii.
- Harnverhaltung, s. Ischuria.
- Harnwege, Reizung derselben.
1537.
— Krankheiten derselben.
427. 428.
- Harnwerkzeuge, entzündlich-
katarrhalische Affektionen
derselben. 2475.
- Harnwerkzeuge, Verdickung
ihrer Schleimhäute. 347.

Harnwerkzeuge, Verschleimung derselben. 999. 1337.

Harthörigkeit, asthenisch-nervöse. 1105. (Vergl. „Surditas.“)

Harthörigkeit, torpide. 970.

Hasenauge. 3003.

Haut, Abschuppung derselben. 824.

— Aufspringen derselben. 390. 391. 393. 394. 434.

Haut, krankhaft erhöhte Empfindlichkeit derselben. 983.

Haut, spröde. 393. 394. 824. 826. 1145. 2676.

— dieselbe weich zu erhalten. 390. 391.

— zur Kräftigung und Belebung derselben. 3423.

— zur Reizung derselben. 289. 542. 543. 1567. 2999.

Haut, zur Verfeinerung derselben. 3510.

Hautabsonderung, zur Umstimmung derselben. 1920. 1921.

Hautausschläge, chronische, s. Exanthemata chronica.

Hautausschläge, juckende. 934. 935. (Vergl. „Prurigo.“)

Hautfärbung, durch salpetersaures Silber. 52.

Hautjucken, s. Prurigo.

Hautkrebs, s. Carcinoma Cutis.

Hautleiden, lepröse, s. unter Lepra.

— syphilitische, mit Hypertrophie. 2300. (Vergl. „Syphilis.“)

Heiserkeit, s. Raucedo.

Helminthiasis. 3. 175. 576. 1076. 1302 — 1308. 1310 — 1316. 1367. 1594. 1657. 1672. 1681. 1682. 1701. 1803. 1837. 1856. 1857. 2215. 2779. 3169 — 3171. 3521 — 3523. 3525. 3527. 3560. 3570. (Vergl. „Ascarides“, „Lumbrici“ und „Taenia.“)

Hemicrania. 1334. 2116. (Vergl. „Cephalalgia“ und „Migräne.“)

Hemiplegia. 3166. (Vergl. „Paralysis.“)

Hepatitis. 1990.

Hernia incarcerata. 144. 802. 803. 809. 2349. 2479. 2742. 2751. 2752. 2802. 2803.

Hernia Infantum. 1765.

— inguinalis. 3091.

Herpes. 35. 58. 468. 490. 491. 507. 508. 509. 517. 635. 909. 1028. 1063. 1065. 1292. 1475. 1479. 1547. 1720. 1793 — 1795. 1797. 1800. 1810. 1846. 1879. 1951. 2014. 2085. 2086. 2090. 2153. 2154. 2161. 2292. 2311. 2418. 2498. 2542. 2677. 2750. 2892. 2922. 2991. 3317. 3464. 3668. (Vergl. „Impetigo.“)

Herpes exedens, s. Lupus.

— Faciei. 3167. 3501.

— leprosus. 471.

— lichenoides. 2090.

- Herpes praeputialis. 2659.
 — pustulosus. 1880.
 — scabidus. 2290.
 — scabiosus. 469. 2748.
 — squamosus humidus. 1899.
 — syphiliticus. 470. 1878.
 — cum Syphilide complicatus. 1911.
 — tuberculosus. 651.
 Herz, Hypertrophie desselben. 693. 1605. 2289.
 Herzbeutelwassersucht, s. Hydrops Pericardii.
 Herzklopfen, s. Palpitatio Cordis.
 Herzkrankheiten, organische. 1510. 1519. 3202.
 — mit gichtischer und rheumat. Diathese. 3202.
 Herzkrankheiten ohne organische Fehler. 3200. 3201.
 Herzthätigkeit, stürmische. 1920. 1921.
 Herzventrikel, Hypertrophie derselben. 2289.
 Herzzufälle, von Plethora abdominalis abhängig. 2233.
 Hirnentzündung, s. Encephalitis.
 Hirnerschütterung, s. Commotio Cerebri.
 Hirnhäute, Ausschwitzungen zwischen denselben. 2307.
 Hirnhautentzündung, s. Meningitis.
 Hitzblätterchen, s. Eczema.
 Hodenentzündung, s. Orchitis.
 Hodenverhärtung. 321. 782, 2267. 2308. 2309. 2312. 3027.
 Hodenweh. 1412.
 Hörorgan, rheumatische und katarrhalische Affektionen desselben. 926.
 Hordeolum. 1407. 1414. 1428. 2115.
 Hornhautentzündung, s. Keratodeitis.
 Hornhautflecke, s. Maculae Corneae.
 Hornhautgeschwüre. 583. 594. 853. 1470. 1887. 1975. 2038. 2041. 2163.
 Hornhautverdickung. 847.
 Hornhautverdunkelung. 173. 225. 226. 354. 355. 544. 547. 691. 711. 1401. 1588. 1883. 2001. 2002. 2040. 2041. 2075. 2394. 2711. 3066. 3463.
 Hospitalbrand, s. Gangraena nosocomialis.
 Hüftgelenk, Krankheiten desselben. 1568.
 Hüftweh, s. Coxalgia und Ischias.
 — Cotunnisches. 2279.
 Hühneraugen, s. Clavi Pedum.
 Husten, s. Tussis.
 Hydrarthrus. 362.
 Hydrocele. 21. 270. 271. 361. 3603.
 — Infantum. 360. 1871. 2714.
 Hydrocephalus acutus. 600. 1986. 2145. (Vergl. „Hydrops Ventriculorum Cerebri.“)

- Hydrocephalus chronicus.
 1983. 2145. 2168. 2307.
 Hydrophobia. 997. I. S. 623.
 2573 — 2576. 3001.
 Hydrophthalmus. 1984. 1985.
 Hydrops. 5. 244. 246. 557.
 692. 709. 712. 858. 875.
 876. 1001. 1002. 1165.
 1171 — 1173. 1337. 1340.
 1354. 1360. 1361. 1510.
 1511. 1517. 1519. 1520.
 1522. 1526 — 1528. 1531.
 1532. 1534. 1535. 1548.
 1549. 1564 — 1566. 1663.
 1832. 1833. 1836. 1838.
 1839. 1850. 1853. 2048.
 2131. 2152. 2221 — 2227.
 2271. 2325 — 2329. 2389.
 2440. 2464. 2601. 2745.
 2786. 2873. 2875. 2876.
 2919. 2920. 2942. 2943.
 2960. 2966 — 2968. 2970.
 3051. 3132. 3189. 3198.
 3199. 3200. 3201. 3326
 — 3336. 3338 — 3340. 3342
 — 3346. 3348 — 3365. 3368
 — 3370. 3372. 3373. 3416.
 3425. 3445. 3549.
 Hydrops ex abusu Spirituo-
 sorum. 3350.
 — acutus. 2328. 3329.
 — Anasarca. 2328. 2463.
 3198. 3329. 3332. 3345.
 3352. 3355.
 Hydrops Ascites. 846. 874.
 1359. 1530. 1834. 2058.
 2226. 2328. 2463. 2600.
 2603. 2746. 2940. 3198.
 3199. 3200. 3329. 3355.
 3372.
 Hydrops cum Chlorosi com-
 plicatus. 2539.
 — erethicus. 279. 369.
 2602.
 — ex Febre intermittente.
 1192. 1242. 1598.
 — ex Febre intermitt. cum
 intumescencia Lienis. 3419.
 Hydrops hypersthenicus. 2433.
 — Infantum. 753. 2461.
 2944. 3186. 3435.
 — Ovarii. 2061. 2167.
 2299.
 — Pericardii. 1523. 2739.
 — saccatus. 2307.
 — post Scarlatinam. 267.
 1513. 1558. 1989. 2208.
 2388. 2462. 3439. 3569.
 Hydrops Ventriculorum Cere-
 bri. 1512. (Vergl. „Hydro-
 cephalus acutus.“)
 Hydrothorax. 280. 1355. 1359.
 1516. 1523. 1530. 1532.
 1840. 1977. 1988. 1992.
 2000. 2435. 2438. 2463.
 2600. 2603. 2738. 2739.
 3047. 3048. 3341.
 Hygroma. 362. 2307.
 — Patellae. 2930. 3029.
 Hypertrophia Cordis. 693.
 1605. 2289.
 — Ovarii. 1030.
 — Uteri. 1030. 1606.
 1621.
 — Ventriculi. 1053.
 Hypochondria. 157. 280. 302.
 421. 662. 665. 666. 702.
 1577. 1580. 1741. 1801.
 2380 — 2382. 2454. 2678.
 2770. 3139. 3301.

- Hypochondria cum Agrypnia. 2428.
 Hypopium. 2535.
 Hysteria. 157. 280. 287. 302. 310. 371. 421. 605. 656. 658. 665. 666. 670. 672. 681. 868. 1097. 1098. 1100. 1101. 1104. 1151. 1332. 1613. 1667. 1723. 1741. 1742. 1748. 2429. 2454. 2770. 3181. 3565. 3573.
 Hysteria cum Dysmenorrhoea. 678.
 — — Obstructione Alvi. 1609.
 — — Plethora abdominali. 2233.
- I.**
- Ichthyosis. 2062.
 Icterus. 103. 104. 165. 493. 797. 811. 1668. 1741. 1784. 2048. 2373. 2375. 2802. 2803. 3129. 3303. 3532. 3535.
 Icterus Neonatorum. 2731. 3146.
 — spasmodicus. 2207.
 Ileus. 2116. 2752. 2802. 2803. 2963.
 Impetigo. 2656. (Vergl. „Herpes.“)
 — sparsa. 2290. 2413.
 Incontinentia Urinae, s. Enuresis.
 Incubus. 276. 287. 3157.
 Infarkten. 344. 664. 1741. 2321. 3284. 3309 — 3311.
- (Vergl. „Unterleibsstockungen.“)
 Inflammatio atonica Cutis. 966. 967.
 — externa. 1154.
 — phlegmonosa. 1406.
 Inflammationes acutae. 410. 1990. 2334. 2338 — 2340. 2733. 2809. 2810. (Vergleiche „Krankheiten, entzündliche.“)
 Inflammationes acutae Infantum. 2342. 2343.
 Insektenstiche. 310.
 Intertrigo Infantum. 2496. 2497. 3638.
 Invaginatio Intestinorum. I. S. 736.
 Iris, Ausschwitzungen derselben. 1946.
 Iritis. 121. 2111.
 — arthritica. 312.
 — rheumatica. 1987.
 Ischias. 107. 926. 1570. 1732. 2068. 2272. 2955. 2958. 2959. 2961. 2967. 3203. 3432. 3433. (Vergl. „Coxalgia.“)
 Ischias nervosa Cotunni. 2279.
 — postica. 1936.
 Ischuria. 366. 428. 1337. 2190. 2491. 2493 — 2495.
 Ischuria paralytica. 963.
 — spasmodica Infantum. 304. 2492.
- K.**
- Kahlköpfigkeit, s. Calvities.
 Karbunkel, s. Carbunculus.
 Kardialgie, s. Cardialgia.

Katarrh, s. Catarrhus.

Katarrhalefieber, s. Febris catarrhalis.

Katarrhalisch-nervöse Leiden. 2276.

Kehlkopfkrankheiten. 1444.

Kehlkopfschwindsucht, s. Phthisis laryngea.

Keratodeitis chronica. 33.

— rheumatica. 1928.

Keuchhusten, s. Tussis convulsiva.

Kinder, zur Ernährung derselben. 412.

Kniegelenk, kalte Anschwellungen desselben. 2930.

Kniegeschwulst, weisse, s. Tumor albus Genu.

Knochen, entzündliche Auftreibung derselben und der Knochenhaut. 2070.

Knochenauftreibungen, arthritische. 2150. 2172. (Vergl. „Arthritis“)

Knochenauftreibungen, skrofulöse. 1881. 2150. 2171. (Vergl. „Scrofulosis.“)

Knochenauftreibungen, syphilitische. 2172. 2300. 2313. (Vergl. „Syphilis.“)

Knochenauftreibungen, syphilitisch-merkurielle. 2150. (Vergl. „Quecksilbersiechthum.“)

Knochenfrass, s. Caries.

Knochengeschwülste Rhachitischer. 70. (Vergl. „Rachitis.“)

Knochengeschwülste, syphiliti-

sche. 1895. (Vergl. „Syphilis.“)

Knochengeschwür, s. Caries. Knochenhäute, Wucherung derselben. 3225.

Knochenhautentzündung. 2585.

Knochenkrankheiten, skrofulöse. 689. (Vergl. „Scrofulosis.“)

Knochenleiden, syphilitische. 2019. 2588. 2589. 3313. (Vergl. „Syphilis.“)

Knochenschmerzen, gichtische und syphilitische, in der Augenhöhle und um dieselbe. 2054.

Knochenschmerzen, nächtliche syphilitische, s. Dolores osteocopi syphilitici.

Knotenlungensucht, s. Phthisis pulmonalis tuberculosa.

Körperschwäche, allgemeine. 459. 1202 — 1205. 1633. 1644. 1689. 1770. 1778. 1779. 2468. 2469. 2582. 3239. 3254. 3258. 3436.

Körperschwäche, allgemeine, mit Neigung zu Intermissionen. 1266.

Körperschwäche, allgemeine, bei Kindern. 1655.

Kolik, s. Colica.

Kondylome, s. Condylomata.

Kongestionen, s. Congestiones.

Kontusionen, s. Contusiones.

Kopfblutgeschwulst, s. Cephaloematoma.

Kopfgicht, s. Cephalalgia arthritica.

Kopfgrind, s. Tinea Capitis.

Kopfhaut, Abschilfern derselben. 229.

Kopfrosee. 3609.

Kopfschmerz, s. Cephalalgia, Hemicrania und Migräne.

Kothbrechen. 1442.

Krämpfe. 32. 292. 302. 370.

377. 452. 793. 868. 870.

1152. 1403. 1487. 1723.

2104. 2106. 2116. 2142

—2144. 2243. 2445. 2654.

2751. 2780. 2782. 2864.

3446. 3473. 3565. 3572.

3573. 3575. 3576. 3578.

3585. 3599. (Vergl. „Krank-

heiten, krampfhaft.“)

Krämpfe mit unterdrückter Hautthätigkeit. 3441.

— mit Erregung des Gefäßsystems. 29.

— hysterische. 287. 371.

656. 665. 672. 681. 868.

1097. 1723. 1742. 2655.

2837. 3440. 3444. 3480.

3559. 3632. (Vergl. „Hy-

steria.“)

Krämpfe der Kinder. 680.

1006. 2447. 2614. 2615.

2619. 2798. 3296. 3597.

Krämpfe mit Verzögerung des Kreislaufes. 675.

— durch Magensäure bedingt. 1578.

— von unregelmässiger Menstruation. 2516. 2517.

Krämpfe der Säuglinge. 303.

332. 333. 376.

— der Säuglinge mit Magensäure. 2213.

Krätze, s. Scabies.

Krätzgeschwüre, s. Ulcera scabiosa.

Krankheit, englische, s. Rachitis.

— venerische, s. Syphilis.

Krankheiten, abzehrende, s.

— Tabes.

— chronische. 456. 604. 2881.

— — mit Atonie, irregulärer Wirkung des Nervensystems und der Absonderungsorgane. 2275.

Krankheiten, entzündliche. 408.

2345. 2347. 2567. 2605.

2866. 3516. (Vergl. „Inflammationes acutae.“)

Krankheiten, erschöpfende, 1197.

— erschöpfende, in der Rekonvaleszenz von solchen. 1. 1195. 1196. 1202 — 1205. I. S. 449. 1324. 1594. 1665. 1673. 1674. 1697.

Krankheiten, fieberhafte. 16.

101. 261. 408. 503. 523.

1782. 1783. 1861. 1864.

2247. 2332. 2334. 2425.

2567. 2605. 2793. 2866.

Krankheiten, fieberhafte, der Kinder. 2719.

— fieberhafte, mit Reizung der Darmschleimhaut. 2332.

Krankheiten, contagiöse. 2351. 2379.

— konvulsivische. 564. 565.

- Krankheiten, krampfhaft. 698. 3613. (Vergl. „Krämpfe.“)
 Krankheiten, krampfhaft, der Kinder. 2447. (Vergleiche „Krämpfe der Kinder.“)
 Krankheiten, in denen Herabsetzung der Spannung und des fieberhaften Pulses zu wünschen ist. 2278.
 Krebs, s. Carcinoma.
 Krebsgeschwür, s. unter Carcinoma.
 Kreuzweh. 2068. 2279.
 Kropf, s. Struma.
 Kupferausschlag, s. Gutta rosacea.

L.

- Lähmung, s. Paralysis.
 Läuse. 143. 449. 1953. 2091.
 Lagophthalmus. 3003.
 Laxiren, zur Erregung von solchem. 156. 157. 158. 163. 862. 1430. 1432—1437. 1439—1441. 1551. 1802. 1835. 1980. 1999. 2048. 2124—2127. 2130. 2132. 2133. 2136. 2314. 2315. 2324. 2368. 3369. 2390—2392. 2518. 2521. 2522. 2525. 2527. 2529. 2530. 2545. 2720. 2727—2730. 2732. 2735. 2868. 3058. 3059. 3114. 3119. 3122. 3124. 3134. 3135. 3140. 3172. 3324. 3325. 3396—3398. 3401. 3405—3407. 3409. 3410. 3412. 3512. 3514. 3517. 3518.
 Laxiren, zur Erregung von solchem bei Damen, Hysterischen, Hypochondristen. 2723. 3400. 3404. 3411. 3413.
 Laxiren, zur Erregung von solchem bei Wöchnerinnen. 3403.
 Laxiren, zur Erregung von solchem bei Kindern. 1438. 1443. 2128. 2129. 2134. 2543. 2544. 2549. 2551. 3115. 3173. 3402.
 Laxiren, zur Erregung von solchem bei Neugeborenen. 2319. 2550.
 Leber, Atonie derselben. 1594. — um die Thätigkeit derselben und des Darmes zu heben. 154.
 Leberabsonderung, zur Beförderung derselben. 2520.
 Leberaffektion, chronische, mit hämorrhoidalischen und hypochondrischen Beschwerden. 1580.
 Leberanschwellung. 48. 811. 818. 1163. 2011. 3299. 3535.
 Leberentzündung. 1990.
 Leberflecke, s. Maculae hepaticae.
 Leberkrankheiten, chronische. 54. 1162. 1163. 1730. 1731. 2323. 3130. 3533—3536.
 Leberkrankheiten mit Schwäche u. Verstopfung. 1599.
 Leberverhärtung. 1396. 1411. 1998. 3129. 3535.

- Leibesverstopfung, s. Obstru-
 ctio Alvi.
 Leichname, zur Erhaltung der-
 selben. 2716.
 Leistenbeulen, s. Bubones.
 Lendenweh, s. Lumbago.
 Lepra. 74. 383. 2933. 2935.
 (Vergl. „Elephantiasis.“)
 Lepra alba. 713. 715.
 — syphilitica. 1900.
 — tuberculosa. 713. 715.
 Lethargus. 1845.
 Leucomata. 545. 546.
 Leucorrhoea, s. Fluor albus.
 Lichen. 1917. 2701.
 — leproides. 1796.
 Lichtscheu, s. Photophobia.
 Lienteria. 2400. 2693. 3098.
 Lipothymia. 283. 351. 2228.
 Lippen, rissige. 434. 3638.
 3663.
 Lippengeschwüre, s. Ulcera
 Labiorum.
 Lippenkrebs. 3395.
 Lippitudo. 2038. 2096. 3005.
 3661. (Vergl. „Blepharo-
 blennorrhoea“ u. „Ophthal-
 moblennorrhoea.“)
 Lithiasis urica. 400. 427.
 428. 1537. 1733. 2235.
 2254. 2273. 2287. 2681.
 2682. 2686. 2695. 2787.
 2788. 2938. 3302. 3304.
 3338. 3594.
 Luftröhrenschwindsucht, siehe
 Phthisis trachealis.
 Luftwege, torpider Zustand
 derselben. 827.
 Lumbago. 107. 926. 3200.
 3201. 3292.
 Lumbrici. 1296—1301. 1309.
 1855. 1858. 1859. 3194.
 3524. 3571. (Vergl. „Hel-
 minthiasis.“)
 Lungen, Atonie derselben.
 251 — 253. 327. 1881.
 3041. 3047. 3048.
 Lungenaffektionen, s. Brust-
 affektionen.
 Lungengeschwür mit Bluthu-
 sten u. Unterleibsstockun-
 gen. 2725.
 Lungenkatarrh, s. Catarrhus
 Pulmonum.
 Lungenlähmung, s. Catarrhus
 suffocativus und Paralysis
 Pulmonum.
 Lungenleiden, subinflammato-
 rische. 926.
 Lungenreizung, erethische.
 2724.
 Lungenschwindsucht, eiternde,
 s. Phthisis pulmonalis pu-
 rulenta.
 Lungenschwindsucht, knotige,
 s. Phthisis pulmonalis tu-
 berculosa.
 Lungenschwindsucht, schlei-
 mige, s. Phthisis pulmona-
 lis pituitosa.
 Lungentuberkeln. 684. 2295.
 2739.
 — — erweichte. 1754.
 1755.
 Lungenvereiterung, s. Phthi-
 sis pulmonalis purulenta.
 Lungenverschleimung. 327.
 340. 2276. (Vergl. „Blen-
 norrhoea Pulmonum“, „Ca-

tarrhus Pulmonum,“ und
„Phthisis pulmonalis pitui-
tosa.“

Lupia, s. Tumor cysticus.

Lupus. 646. 712. 1623. 1912
—1914. 2062. 2304. 3503.

Lupus-Ulcerationen. 646.

Lustseuche, s. Syphilis.

Luxationes. 10. 626. 627.
991. 1872. 3305.

Lymphgeschwulst. 362.

Lymphsystem, zur Steigerung
der Absorption in demsel-
ben. 1920. 1921.

III.

Maculae Corneae. 33. 172.
297. 298. 313. 850. 853.
864. 865. 867. 1500. 1581.
1589. 1724. 1887. 2001.
2034. 2041. 2219. 2220.
2256. 2265. 2306. 2393.
2452. 2672. 2674. 2710.
3462. 3635. 3636.

Maculae Corneae Infantum.

866.

— Corneae ex Ophthalmia
Neonator. 3652.

— Corneae torpidae. 1919.

— hepaticae. 1404. 2675.
3429.

— scorbuticae. 46.

Madenwürmer, s. Ascarides.

Magen, perverse Absonderung
desselben. 2276.

— krankhafte Reizbarkeit
desselben. 573. 3577.

Magendrücken. 2191.

Magenerweichung, s. Gastro-
malacia.

Magenhäute, Hypertrophie der-
selben. 1053.

Magenkrampf, s. Cardialgia.

Magenleiden, nervöse. 3618.

Magensäure. 305. 411. 703.

885 — 887. 1033. 1371.

1374. 1578. 2188. 2243.

2246. 2251. 2396. 2499

—2501. 2504. 2623. 2624.

2664. 2682. 2697. 3074.

3080. 3665. (Vergl. „Py-
rosis.“)

Magensäure mit Gefäßaufre-
gung. 2335.

Magensäure der Hypochondri-
sten. 3301.

Magensäure der Kinder. 448.

885. 1657. 1661. 2213.

2507. 2509. 2514. 3118.

3296. 3597.

Magenschwäche. 1. 7. 127.

618. 701—705. 708. 878.

885. 1076. 1077. 1078.

1085. 1087. 1093. 1253.

1266. 1374. 1672. 1734.

1767. 1769. 1869. 1870.

1873. 1874. 2188. 2189.

2196. 2197. 2457. 2594.

2595. 2623. 2624. 2627.

2628. 2697. 2952. 2973.

3075. 3077. 3078. 3080

—3083. 3092. 3093. 3137.

3150. 3548. 3607. 3667.

Magenschwäche nach Miss-
brauch geistiger Getränke.
846.

Magenschwäche mit Neigung
zum Erbrechen. 3627.

- Magenschwäche bei Kindern. 12. 877. 1071. 1735. 2629.
 Magenverhärtung. 793. 796.
 Magenverschleimung. 1076. 1371. 1375. 2276. 3426. 3607.
 Malum Pottii. 1413.
 Mandelbräune, s. Angina tonsillaris.
 Mania. 794. 1853. 2383. 3467. 3473.
 Masern, s. Morbilli.
 Mastdarm, Erschlaffung desselben. 218. 1687. 1698.
 Mastdarm, Lähmung desselben. 1017.
 — entzündliche Reizung desselben. 863.
 — Schleimfluss desselben. 591. 2557.
 — Skirrhus desselben. 341. 1410.
 — Striktur desselben. 1410. 2828.
 — krampfhafte Striktur desselben. 808. 810. 2117. 3285.
 — Verdickung desselben. 2009.
 — Verschwärungen in demselben. 439. 749. 2641.
 Mastdarmfistel. 2828.
 Mastdarmkrebs. 2828.
 Mastdarmvorfall. 1223. 1698. 1763. 2928. 3110.
 Mastdarmvorfall kleiner Kinder. 2756. 2761.
 Medorrhoea, s. Fluor albus u. Gonorrhoea.
 Melaena. 1208.
 Melancholia. 794. 1370. 1804. 1808. 1849. 2383. 3473.
 Meningitis. 524.
 Menostasia, s. Amenorrhoea.
 Menstrualfluss, zur Beförderung desselben. 161. 348. 724. 1159. 1426. 1722. 1744—1746. 1851. 2678.
 Menstrualkolik, s. Colica menstrualis.
 Menstrualstockungen. 3206—3208. (Vergl. „Amenorrhoea.“)
 Menstruatio anomala. 1643. 2516. 2517. 3188.
 Menstruatio devia. 2665.
 — difficilis. 420.
 — retenta. 2596. 2660. 3229. (Vergl. „Amenorrhoea.“)
 Menstruatio suppressa. 155. 316. 1169. 1170. 1424. 1605. 1664. 2289. 3213. 3229. (Vergl. „Amenorrhoea.“)
 Menstruation, schmerzhaft, aus Atonie. 2304. 3214.
 Menstruation, schmerzhaft, mit Magenschmerz. 838.
 Menstruation, übermässige, durch Stockungen im Fruchthaler bedingt. 1998.
 Merkurialgeschwüre, s. Ulcera mercurialia.
 Merkurialkrankheit, s. Quecksilbersiechthum.
 Merkurial-Skorbut. 1337.
 Merkurial-Speichelfluss, siehe Salivatio mercurialis.

- Mesenterialschrofen.** 299. 300.
 818. 1585. (Vergl. „Atrophia mesenterica Infantum“ u. „Scrofulosis.“)
Meteorismus septicus. 3581.
Metritis septica. 3581.
Metrorrhagia. 63. 96. 191. 194. 199. 848. 849. 1094. 1217. 1323. 1325. 1326. 1602. I. S. 578. 1683. 2184. 2377. 2378. 2398. 2657. 2843. 2979. 2980. 3087. 3099. 3102. 3109. 3110. 3211. 3212. 3217. 3220. 3226. 3229. 3246. 3249. 3378. 3383. 3389. 3391. 3528. 3581. 3655.
Metrorrhagia ex Carcinomate Uteri. 1419.
 — chronica in graviditate et post eam. 2736.
Metrorrhagia habitualis. 1327.
Metrorrhagie, zur Verhütung solcher nach der Niederkunft. 3385.
Migräne. 2296. 2659. (Vergl. „Cephalalgia“ und „Hemicrania.“)
Migräne, hysterische, mit Erbrechen verbunden. 707.
Milchabsonderung, zur Beförderung derselben. 443. 444. 445. 447. 448. 2510. 3237.
Milchabsonderung, zur Beschränkung derselben. 2370. 2658.
Milchknoten. 318. 367.
Milchkongestionen. 363.
Milchschorf, s. Crusta lactea.
- Miliaria chronica.** 2238.
Milzanschwellung. 48. 55. 811. 818. 1601. 1677.
Miserere. 1442.
Mitesser, s. Comedones.
Morbi chronici. 456. 604. 2275. 2881.
Morbilli nervosi retrogradi. 373. 2621.
Morbus maculosus. 39. 1259.
Mundfäule, s. Stomacace.
Mundgeruch, übler, s. Foetor Oris.
Mundgeschwüre, merkurielle. 430. 975. 976.
Mundgeschwüre, syphilitische. 56.
Mund- u. Rachengeschwüre, syphilitische. 1955. (Vergl. „Syphilis.“)
Mundhöhle, Brennen [derselben. 931.
Mundhöhle, Entzündung ihrer innern Fläche. 352. 1291. 2477.
Mundhöhle, Ulcerationen in derselben. 94. 1291. 1345. 2702.
Muskeln, Ausdehnung u. Quetschung derselben. 319.
Muskeln, subinflammatorische Leiden derselben. 3432. 3433.
Muskelschwäche. 1608. 1610. 1612. 1739. 3079.
Muskelschwäche bei Kindern. 12.
 — — nach Kontusionen. 3184.
Mutterbeschwerden, krampf-

- hafte. 83. (Vergl. „Hysteria.“)
- Mutterblutfluss, s. Metrorrhagia.
- Mutterkrebs, siehe Carcinoma Uteri.
- Muttermal. 928.
- Muttermund, krampfhaftes Striktur desselben. 808.
- Mutterscheide, Erschlaffung desselben. 218. 1214. 1687.
- Mutterscheide, Geschwüre in desselben. 749.
- Mydriasis. 2747.
- N.**
- Nabelschwamm Neugeborener. 2003.
- Nachtripper, s. Gonorrhoea secundaria.
- Nachtschweisse. 3261. 3262. 3264. (Vergl. „Schweisse, hektische.“)
- Nachtschweisse, kolliquative, mit Neigung zu Durchfall. 844.
- Nachwehen. 1102. 2836.
- Naevus maternus. 928.
- Nahrungskanal, Atonie desselben. 1115. 1116.
- Nase, rothe. 2675.
- skrofulöse Anschwellung desselben. 720.
- Nasenbluten, s. Epistaxis.
- Nasenpolyp. 2559.
- beginnender. 2005.
- zur Verhinderung der Wiedererzeugung. 3660.
- Nasenschleimhaut, Auflockerung desselben. 207. 1472. 3111.
- Nasenschleimhaut, örtliche Leiden desselben. 2532.
- Nervenaufregung. 2617.
- Nervenempfindlichkeit, allgemein krampfhaft erhöhte. 3562.
- Nervenerethismus. 387.
- Nervenfieber, s. Febris nervosa u. Typhus.
- Nervenkrankheiten. 3471. 3613.
- — atonische. 1600.
- — chronische. 695. 696. 699. 1256. 2743. 3565. 3646.
- Nervenkrankheiten mit Erschöpfung. 461. 1191.
- Nervenkrankheiten mit Torpidität des Darmkanals. 1361.
- Nervenkrankheiten, zur Beförderung der Transpiration in solchen. 135.
- Nervenreizungen der Kinder. 886. 3597.
- Nervenschwäche, allgemeine. 81. 236. 700. 1238. 1243. 1645. 1696. 3619.
- Nervenschwäche mit Neigung zu Blutungen. 1255. 1259.
- Nervenverletzungen. 2950.
- Nervenverstimmung. 2331. 3619.
- Nervenzufälle. 458. 574. 575. 694. 1420. 2196.
- Nervus vagus, hysterische Leiden im Gebiete desselben. 670. 832. 1524.

- Netzhautentzündung. 2121.
 Neuralgia. 122. 123. 403.
 405. 407. 596. 804. 978.
 1633. 1936. 2122. 2298.
 2454. 2774. 2858. 2863.
 3197. 3200. 3432. 3433.
 3468. 3619.
 Neuralgia abdominalis Infan-
 tum. 1624.
 — ischiadica et cruralis.
 2958. 2959.
 — pituitosa. 999.
 Neurosen. 1493. 2659.
 — der Brust u. des Un-
 terleibes. 3472.
 Nierenabsonderung, s. Harnab-
 sonderung.
 Nierenkrankheiten. 3338.
 Nierenschmerzen. 3200. 3201.
 Nierensteine, s. Calculi rena-
 les.
 Nierensteinkolik, s. Colica a
 Calculis renalibus.
 Nierentorpor. 1002. 1870.
 1874. 2875. 2876.
 Noma. 73. 2703.
 Nymphomania. 2454.
- ①.
- Oberhaut, zur Beseitigung der-
 selben. 323. 324.
 Oberhaut, Lostrennung der-
 selben. 3037.
 Obstructio Alvi. 23. 24. 103.
 104. 155—158. 160. 162
 —164. 167. 727. 1034.
 1157. 1158. 1189. 1368.
 1369. 1431. 1549. 1550.
1579. 1737. 1809. 1867.
 2187. 2317. 2322. 2331.
 2373—2375. 2380. 2381.
 2479—2482. 2523. 2531.
 2715. 2737. 2802. 2803.
 2948. 2963. 3131. 3133.
 3141. 3145. 3153. 3155
 —3157. 3177. 3179. 3284.
 3285. 3414. 3519. 3576.
 Obstructio Alvi habitual. 1362.
 1364. 3126. 3412.
 Obstructio Alvi habitualis in
 Hystericis. 1151. 3399.
 Obstructio Alvi ex Hepatis af-
 fectione. 3130.
 Obstructio Alvi Infantum. 1367.
 2384. 3116. 3117.
 Odontalgia. 141. 142. 1080—
 1082. 1334. 1823. 2414.
 2415. 2645. 2821. 2840.
 2841. 2846. 2916. 3072.
 3073. 3432. 3433.
 Odontalgia rheumatica. 1826.
 Oedema. 320. 2739. 2953.
 3363.
 — Labiorum pudendi.
 362.
 — Pedum. 2464. [2965.
 3355.
 — Praeputii. 362.
 — rheumatico - arthriti-
 cum. 280.
 — Scroti. 282. 607.
 Ohnmacht, s. Lipothymia.
 Ohrenentzündung, s. Otitis.
 Ohrenfluss, s. Otorrhoea.
 Ohrenschmalz, Mangel dessel-
 ben. 71. 2022.
 — — verhärtetes. 1582.
 Ohrenschmerz, s. Otalgia.

- Ohrspeicheldrüsengeschwulst. 366.
- Omalgia. 3203.
- Onania. 1198.
- Ophthalmia. 205. 433. 1505. 2038. 2523. 2789. 3003. 3018.
- Ophthalmia acuta. 186.
- Aegyptiaca. 1879. 1947.
- angularis. 2038.
- arthritica. 9. 120. 819. 2004. 2829. 2861.
- Ophthalmia asthenica. 2709.
- atonica. 966. 967. 1501.
- cum Blepharospasmo. 1427.
- catarrhalis. 17. 204. 1465. 1467. 1468. 1470. 1940. 2034. 2038. 2434. 2453. 2532. 2988. 2989.
- Ophthalmia chronica. 18. 72. 711. 853. 2041. 2042. 3004. 3635. 3649.
- Ophthalmia contagiosa, s. Ophthalmia Aegyptiaca.
- gonorrhoeica. 1471. 2052. 2076.
- herpetica. 3167.
- Neonatorum. 204. 375. 1945. 2077. 2990. 3006. 3113. 3611.
- Ophthalmia pruriginosa, s. Psorophthalmia.
- Ophthalmia purulenta, s. Blepharoblennorrhoea, Lippitudo u. Ophthalmoblennorrhoea.
- Ophthalmia rheumatica. 871. 1501. 2861.
- scrofulosa. 583. 819. 1028. 1109. 1254. 1749. 1881. 1885—1887. 1940. 2010. 2038—2040. 2095. 2162. 2163. 2165. 2453. 2988. 3167. 3168. 3511. 3625.
- Ophthalmia scrofulosa Infantum. 2073.
- syphilitica. 819. 1968. 2004. 2052. 2054. 2080. 2829. 2831.
- Ophthalmia torpida. 1465. 1470. 1471. 1500. 2159 — 2261. 2266. 3650.
- Ophthalmia traumatica. 3007.
- Ophthalmoblennorrhoea. 356. 357. 582. 583. 799. 851. 853. 865. 902. 1452. 1463—1466. 1470. 1500. 1884. 2038. 2078. 3610. 3650. (Vergl. „Blepharoblennorrhoea“ u. „Lippitudo.“)
- Ophthalmoblennorrhoea, Nachkrankheiten derselben. 1944.
- Orchitis. 1995. 2996.
- Osteosarcosis. 2325.
- Otalgia. 103. 104. 431. 2114. 3432. 3433.
- Otitis chronica. 1153.
- Otorrhoea. 314. 586. 761. 2268. 2599. 2649. 3656.
- Otorrhoea specifica. 1948.
- Ozaena nasalis. 2006.
- scrofulosa. 2159 — 2161.
- syphilitica. 1476.

P.

- Paedarthrocace.** 2089. 2292.
 2951. (Vergl. „Arthrocace“
 u. „Spina ventosa.“)
Palpitatio Cordis. 693. 811.
 1523. 2912. 3202. 3475.
Pannus. 33. 852. 1467.
 1468. 1500. 2032. 3053.
 3054.
Paralysis. 81. 130. 145. 147.
 148. 302. 571. 601. 625.
 628. 855—857. 927. 957.
 986. 1014. 1017. 1021.
 l. S. 429. 1365. 1709.
 1710. 2631. 2743. 2758.
 2759. 2762. 2763. 2766
 —2769. 2771. 2774. 2892.
 2894. 2898—2900. 2902.
 2903. 2970. 3067. 3068.
 3165. 3185. 3187. 3200.
 3201. 3427. 3432. 3433.
 (Vergl. „Hemiplegia“ und
 „Paraplegia.“)
Paralysis arthritica. 3161.
 3227. (Vergl. „Contractu-
 rae arthriticae.“)
**Paralysis, Convulsionibus al-
 ternans.** 2765.
 — **Medullae spinalis.** 982.
 — **Musculorum Oculi.**
 1011.
 — **Pulmonum.** 138. 829.
 (Vergl. „Catarrhus suffoca-
 tivus.“)
Paralysis saturnina. 2772.
Paraphimosis. 611. (Vergl.
 „Phimosis.“)
Paraplegia. 1017. 1366. 2757.
 2759. 2776. (Vergl. „Pa-
 ralysis.“)
Pellagra. 1672.
Pemphigus. 389.
 — **chronicus.** 2659.
Periostitis. 2585.
Peripneumonia, s. Pneumonia.
Peritonitis Infantum. 2343.
Perniones. 222. 223. 232.
 317. 364. 609. 770. 772.
 773. 910. 980. 981. 988.
 1752. 2170. 2834. 2877
 —2880. 2923. 3008. 3015.
 3021. 3023. 3071. (Vergl.
 „Congelatio.“)
Perniones suppurantes. 3031.
 — **torpidi.** 53. 1013.
Petechiae. 39. 95.
Petechialtyphus, s. Typhus
petechialis.
Pfortaderstasen. 3536. (Vergl.
 „Pfortadersystem“ u. „Un-
 terleibsstockungen.“)
Pfortadersystem, chron. Blu-
tungen aus demselben.
 2805.
Pfortadersystem, Ueberfüllung
desselben, verbunden mit
Dyspepsie und Trägheit des
Stuhlganges. 3136. (Vergl.
 „Unterleibsstockungen.“)
Phimosis. 219. 611. 1959.
 2007. 3011. 2248. (Vergl.
 „Paraphimosis.“)
Phlegmasia alba dolens. 2376.
Photophobia. 2054.
 — **rheumatica.** 2673.
 — **scrofulosa.** 785.
 1399. 2095. 2120. 2671.
 3168.

- Phthiriasis. 2971.
 Phthisis laryngea. 2406.
 — pulmonalis. 435. 556.
 760. 923. 930. 1035.
 1036. 1144. 1171. 1392.
 1494. 1518. 1863. 2278.
 2301. 2362. 2451. 2465.
 2467. 2472. 2851. 2855.
 2883. 2885—2887. 2889.
 2932. 2977—2980. 2985.
 3038. 3040. 2231. 3234.
 3235.
 Phthisis pulmonalis incipiens.
 3488. 3489.
 — pulmonalis incipiens
 inflammatoria. 949.
 — pulmonalis pituitosa.
 454. 1529. 1542. 1675.
 1754. 1755. 1881. 2632.
 2633. 2638. 2884. 2890.
 3045. 3046. 3586.
 Phthisis pulmonalis purulenta.
 31. 920. 1200. 2405.
 2407—2410. 2725.
 Phthisis pulmonalis tubercu-
 losa. 245. 722. 723. 916.
 1675. 2169. 2302. 2406.
 2422. 2864. 2978. 2981.
 Phthisis trachealis incipiens.
 1881.
 Plethora abdominalis. 2233.
 3481. 3482. (Vergl. „Pfort-
 adersystem.“)
 Pleuritis. 497. 524. 926.
 2066. 2118. 2340. 2809.
 (Vergl. „Seitenstich.“)
 Pneumonia. 328. 329. 410.
 485. 494. 524. 525. 530.
 1514. 2185. 2186. 2204.
 2288. 2340. 2809. 2810.
 2984. 3236. 3278.
 Pneumonia asthenica. 830.
 — Infantum. 2341.
 — nervosa. 3044. 3052.
 — notha. 293. 949.
 — rheumatica. 343.
 947. 953.
 Pneumophthisis, s. Phthisis
 pulmonalis.
 Pocken, s. Variolae.
 Podagra. 1351. (Vergl. „Ar-
 thritis.“)
 Pollutiones. 748. 2454. 2740.
 Porrigo. 383.
 — larvata. 1950.
 Profluvia chronica. 1114.
 Prolapsus Intestini recti. 1223.
 1698. 1763. 2928. 3110.
 Prolapsus Intestini recti In-
 fantum. 2756. 2761.
 Prosopalgia. 118. 403. 407.
 817. 821. 926. 1018. 1334.
 1481. 1635. 1638. 1642.
 1822. 2016. 2279. 2296.
 2444. 2450. 2454. 2659.
 3200—3202. 3432. 3433.
 3469. 3475. 3614.
 Prosopalgia rheumatica. 1936.
 Prostata, Anschwellung der-
 selben. 341. 1029.
 Prurigo. 383. 390. 391. 929.
 2024. 2255. 2297. 2689.
 2701. 2933. 3502.
 Prurigo Palpebrae. 1941.
 — pedicularis. 2091.
 (Vergl. „Läuse.“)
 — perinaealis. 2164.
 — Vulvae. 382. 2020.

2164. 2237. 2675. 2687.
2704. 3465.

Pseudoerysipelas. 767. 1154.
3221.

Psora, s. Scabies.

Psoriasis. 383. 1797. 1907.
2933. 3503.

Psorophthalmia. 1498. 1883—
1886. 2034. 2038. 2041.
3491. 3500. 3637.

Psydracia. 392.

Pterygium. 2032.

Ptosis Palpebrae. 1010. 1011.

Pupille, zur Erweiterung der-
selben. 800. 820. 2112.

Pupillensperre, zur Verhinde-
rung derselben. 801.

Pusteln, zur Erzeugung von
solchen auf der Haut. 542.
543. 548. 551. 1881.

Putrescentia Uteri. 3191.

Pyrosis. 97. 796. 1032. 1651.
2396. 2504. 2506. 2508.
2511. 2513. 2678. 2696.
3074. (Vergl. „Magensäu-
re.“)

Pyrosis ex abusu Spirituoso-
rum. 2700.

Q.

Quartanfieber. 812. 1177.
1178. 1184. 1666. 1852.

Quecksilbersiechthum. 924.
925. 952. 1475. 2361.
2366. 2586. 2587. 3509.

Quecksilberspeichelfluss, s.
Salivatio mercurialis.

Quetschungen, s. Contusiones.

R.

Raucedo. 214. 423. 429. 441.
670. 1339. 1444. 1881.
2336. 2443. 2906. 2910.
3069. 3070.

Raucedo Phthisicorum. 1503.

Reaktion, körperliche, gegen
Sinken derselben. 124.

Reizfieber. 279. 369. 1286.

— der Kinder. 2285.

Reizhusten. 441. 2100. 2608.
(Vergl. „Tussis.“)

Reizhusten der Kinder. 2102.
2547. (Vergl. „Tussis In-
fantum.“)

Reizhusten, chronischer, in
der zweiten Periode des
kindlichen Lebens. 1389.

Respirationsorgane, erethische
Verstimmungen derselben.
1711.

Retinitis. 2121.

Rhachitis. 61. 62. 70. 685—
689. 771. 776. 1028.
1651. 1652. 1658—1660.
1662. 2168. 2171. 2924.
3092. 3093.

Rheumatalgia. 1936. 3468.

— haemorrhoidalis.
396. 2068.

— venosa hysterica.
399.

Rheumatismus. 110. 121. 240.
477. 500. 804. 822. 950.
951. 1453. 2863. 2865.
3197. 3200. 3201. 3275.
3279. 3292. 3438. 3479.

Rheumatismus acutus. 262.
524. 529. 541.

Rheumatismus Articulorum.
319. 516. 1352. 1817.
1821. 2066. 2412.

Rheumatismus Articulorum
acutus. 113. 115.
— Articulorum chroni-
cus. 2778.
— chronicus. 109. 256.
260. 318. 325. 480. 490.
529. 539. 540. 688. 919.
924. 925. 987. 1014. 1054
— 1057. 1188. 1356. 1357.
1570. 1708. 1710. 1817
— 1819. 1821. 1881. 1961.
1991. 2080. 2087. 2097.
2354. 2881. 2953. 2969.
3071. 3162. 3200. 3323.
3432. 3433. 3446. 3470.
3484.

Rheumatismus Musculorum
pectoralium. 3294.
— nervosus. 290. 1240.
2279.

Röcheln der Säuglinge. 336.

Rose, s. Erysipelas.

Rückenmark, Lähmung dessel-
ben. 982. 2768.

Rückenschmerzen. 3200. 3201.

Ruhr, s. Dysenteria.

S.

Säuferwahnsinn, s. Delirium
tremens.

Säureerzeugung, s. Magensäure.

Salivatio. 212. 1495. 2146.
3084.

— mercurialis. 44. 51.

1759. 2148. 2149. 2515.
2790. 3106. 3483.

Samenverschwendung, Schwä-
che durch solche. 65.

Satyriasis. 2454.

Scabies. 58. 512. 908. 1294.
1295. 1388. 1720. 1846
— 1848. 1882. 1964. 2236.
2240. 2364. 2366. 2413.
2442. 2748. 2933. 2934.
3034. 3035. II. S. 388.
3306. 3307. 3492—3498.
3658.

Scabies Infantum. 1563.

Scarlatina. 45. 79. 268. 269.
277. 1286. 2521. 2528.

Scarlatina, zum Schutz vor
derselben. 792.

Schafhusten. 421.

Scharlach, s. Scarlatina.

Schlaflosigkeit, s. Agrypnia.

Schlagfluss, s. Apoplexia.

Schlangenbiss. 307. 310.

Schleimabsonderung, zur Be-
schränkung derselben im
Nasenkanale. 1472.

Schleimansammlung in den
Bronchien. 558. 1560. 1561.
1597.

Schleimfieber, s. Febris pitui-
tosa.

Schleimfluss, s. Blennorrhoea.

Schleimbämorrhoiden. 1763.

Schleimhäute, entzündliche Af-
fektionen derselben. 343.
992. 993.

Schleimbäute, Erschlaffung
derselben. 3079.

Schleimhäute, Krankheiten der-
selben bei Kindern. 331.

- Schleimhäute, Verdickung derselben. 341. 347. 1029.
- Schleimhäute, Wucherung derselben. 648. 3225.
- der Speiseröhre und des Magens, katarrhalischer Zustand derselben. 424.
- Schleimhusten, s. Catarrhus Pulmonum.
- Schleimschwindsucht, s. Phthisis pulmonalis pituitosa.
- Schlundkrampf. 670. 793.
- Schmerzen aller Art. 2106. 2852.
- arthritische und rheumatische. 804. 2863. 2865. 3071. (Vergl. „Arthritis“ und „Rheumatismus.“)
- Schnupfen, s. Coryza.
- Schwämmchen, s. Aphthae.
- Schwamm des Fussgelenkes. 907.
- Schwefelsäure - Vergiftung. 2248.
- Schweiss, zur Hervorrufung eines solchen. 16. 131. 135. 261. 335. 534. 954. 2198. 2656.
- Schweisse, hektische. 92. 842 — 845. 1200. 1675. 2288. 2407. 2838. 2978. 3002. (Vergl. „Nachtschweisse.“)
- Schweisse, unterdrückte. 280.
- Schwerhörigkeit, s. Harthörigkeit.
- Schwindel, s. Vertigo.
- Schwinden. 388.
- Scirrhus. 719. 721. 860. 1591. 2153. 2154.
- Cardiae. 1397.
- Scirrhus Intestini recti. 341. 1410.
- Oesophagi. 341.
- Prostatae. 341. 1029. 2312.
- Pylori. 1395. 1397.
- Uteri. 34. 2312.
- Ventriculi. 793. 796.
- Vesicae urinae. 341.
- Scorbutus. 39. 46. 879. 880. 1336. 1338. 1342 — 1344. 1346. 1865. 1866. 2921. 2931. 3085.
- Scrofula fugax. 893.
- Scrofulosis. 74. 299. 300. 328. 329. 487. 507. 508. 509. 511. 517. 685. 689. 722. 723. 779. 780. 781. 783. 784. 788. 818. 889. 892. 912 — 915. 918. 1027. 1028. 1136. 1137. 1264. 1266. 1285. 1386. 1413. 1475. 1476. 1525. 1605 — 1607. 1619 — 1623. 1652. 1662. 1773. 1774. 1777. 1816. 1873. 1900. 2089. 2092. 2093. 2159. 2263. 2264. 2270. 2289. 2302. 2304. 2305. 2448. 3025. 3092. 3093. 3143. 3316. 3319. 3448. (Vergl. „Drüsenverhärtungen“ und „Geschwülste, skrofulöse.“)
- Scrofulosis erethica. 2234. 2447.
- cum Nervorum affectionibus complicata. 2158.
- Scrofulosis cum Syphilide complicata. 1903. 1909. 1910. 2025. 2151.

- Scrofulosis cum Ulceribus phagedaenicis. 1476.
- Seekrankheit. 301. 1751.
- Seelenstörungen. 790. 793. 1361. 1370. 1804. 1805. 1808. 1843. 1849. 1853. 2333. 3467. 3473. 3475.
- Sehorgan, rheumatische und katarrhalische Affektionen desselben. 926.
- Seitenstich. 2118. (Vergleiche „Pleuritis.“)
- Selbstschwächung, s. Onania.
- Sensibilität, örtlich krankhaft erhöhte. 2454.
- Singultus. 574. 575.
— Infantum. 332. 333.
- Skorbut, s. Scorbutus.
- Skrofelgeschwülste, s. Drüsenverhärtungen und Geschwülste, skrofulöse.
- Skrofeln, s. Scrofulosis.
- Sodbrennen, s. Pyrosis.
- Sommersprossen. 310. 823. 1341. 2239. 3429. 3510.
- Speiseröhre, Skirrhus desselben. 341.
— Verengerung desselben. 1053.
- Sphacelus. 82. 292. 958. 972. 1216. 1218. 1224—1228. 1230. 2653. 3478. 3604. (Vergl. „Ulceri gangraenosa.“)
- Sphacelus a Congelatione. 3009.
— siccus. 612. 3478.
- Sphincter Ani, krampfhaftes Striktur desselben. 808. 810. 2117.
- Sphincteren, krampfhaftes Striktur desselben. 808.
- Spina ventosa. 900. 2089. (Vergl. „Arthroce“ und „Paedarthroce.“)
- Spongiosis chronica. 256.
- Spulwürmer, s. Lumbrici.
- Staar, grauer, s. Cataracta.
— schwarzer, s. Amaurosis.
- Staphyloma. 583.
- Starrkrampf, s. Tetanus.
- Starrsucht, s. Catalepsia.
- Status biliosus. 2506.
— gastrico-biliosus. 2505.
— gastricus. 706. 2528. 2679. 2721. 3123. 3137. 3297.
- Status gastric. Infantum. 2230.
— mucosus. 2135.
- Steatoma Orbitae. 3605.
- Steinbeschwerden, s. Lithiasis urica.
- Stickfluss, s. Catarrhus suffocativus und Paralysis Pulmonum.
- Stimmlosigkeit, s. Aphonia.
- Stirnhöhlenschmerz, periodischer. 1930.
- Stirnschmerz bei Augenentzündung. 871.
- Stockschnupfen. 1447. 2532. 3488. 3489.
- Stockungen, zur Auflösung solcher. 4. 1584. 2243. 2373. 2682. 2726. 3128. 3302. (Vergl. „Unterleibsstockungen.“)
- Stockungen im Uterinsysteme. 2455.

- Stockungen, venöse. 2445.
 Stofferzeugung, um Umänderung in derselben herbeizuführen. 1999.
 Stomacace. 211. 1044. 1337. 3657.
 — Infantum. 1286. 1287. 3104.
 Stranguria. 427. 428. 2118. 2493—2495. 2508.
 — Infantum. 2492.
 Strictura Intestini recti spastica. 808. 810. 2117. 3285.
 Strictura Oesophagi. 1053.
 — Sphinct. Vesicae urinar. spastica. 2117.
 — Urethrae spastica. 2117.
 Strikturen, krampfhaft, der Sphinkteren. 808. 810.
 Struma. 116. 510. 860. 906. 915. 924. 925. 1387. 2140. 2147. 2302. 2305. 2312. 2355. 2680. 2683. 2698. 2699. 3448—3456.
 Strychninvergiftung. 2857.
 Stuhlverstopfung, s. Obstructio Alvi.
 Stuhlgang, s. Tenesmus.
 Stupor. 1370.
 Subluxationes. 991.
 Sugillationes. 10. 22. 610. 3180. 3192. 3274. 3377.
 Surditas. 71. 151. 324. 1153.
 — catarrhalis. 1024. 1025. 1026. 2532.
 — ex imminuta Ceruminis secretion. 2022.
 — ex intumescencia Tonsillarum. 3069. 3070.
 Sycosis. 2024. 3503.
 Syphiliden. 2051.
 Syphilis. 50. 54. 56. 57. 58. 59. 61. 62. 76. 114. 149. 472. 473. 513. 559. 585. 593. 595. 710. 714. 716. 718. 719. 778. 1065. 1461. 1475. 1476. 1619. 1811. 1812. 1876—1878. 1888—1891. 1893—1896. 1898. 1900. 1901. 1922—1927. 1929. 1931—1935. 1937. 1967. 1968. 1975. 1994. 2019. 2021. 2026—2031. 2046—2050. 2056. 2057. 2074. 2079—2082. 2218. 2250. 2299. 2304. 2524. 2537. 2586—2589. 3313. 3316—3320.
 Syphilis, eingewurzelte, mit Geschwürbildung verbundene, durch Quecksilbermissbrauch entartete. 1475.
 Syphilis cum Herpete complicata. 1911.
 — — Scrofulosi complicata. 1903. 1909. 1910. 2025. 2151.
 Syphilis, Präservativmittel gegen Ansteckung durch solche. 905. 1954. 2259.
 Syphilis Infantum. 1902. 1981. 2071. 2072.

T.

Tabakrauchen, gegen den übelriechenden Athem nach solchen. 894. 904.

- Tabakrauchen, zum Bleichen
gelber Zähne durch solches.
903. 904.
- Tabes. 700. 1131 — 1134.
1711 — 1713. 1715. 1716.
1778. 1779. 1842. 1863.
2468 — 2470. 2472. 3231.
3234. 3235. (Vergl. „Fe-
bris hectica.“)
- Taenia. 8. 137. 664. 679.
1699. 1700. 1702 — 1707.
1787 — 1789. 1791. 1792.
1827 — 1831. 2783. 2874.
2939. 2954. 2956. 2957.
3175. 3457 — 3461.
- Taubheit, s. Surditas.
- Tenesmus dysentericus. 2117.
— Infantum. 331. 2761.
- Tetanus. 1642. 2242. 2616.
2813. 3464.
- Thränenfistel, s. Fistula lacry-
malis.
- Thränensackentzündung. 2830.
- Tinea Capitis. 47. 58. 143.
383. 911. 1050. 1051.
1294. 1409. 1451. 1726.
1728. 1846. 1889. 2015.
2023. 2292. 2310. 2363.
2367. 2749. 3499.
- Tonsillen, nicht entzündliche
Geschwülste derselben.
1572. 3069. 3070. 3280.
- Tremor Artuum. 571. 1709.
- Triefauge. 1471. (Vergl. „Lip-
pitude.“)
- Tripper, männlicher, s. Go-
norrhoea.
— weiblicher, s. Fluor
albus.
- Tripper - Augenentzündung, s.
Ophthalmia gonorrhoeica.
- Trismus Neonatorum. 235.
- Trommelsucht, s. Tympanitis.
- Trunkenheit. 308.
- Trunksucht. 3080.
- Tumor albus. 729. 786. 808.
1569. 1729. 1881. 2067.
- Tumor albus Genu. 1542.
1571. 2168. 2171.
— cysticus. 1459. 2307.
— lymphaticus. 927.
- Tussis. 183. 184. 185. 334.
414. 416. 419. 422. 423.
426. 429. 437. 441. 463.
477. 482. 484. 501. 556.
558. 948. 1058. 1131.
1132. 1139 — 1142. 1555.
2100. 2103. 2190. 2214.
2433. 2473 — 2476. 2484
— 2486. 2817. 2819. 3584.
(Vergl. „Catarrhus“ und
„Catarrhus Pulmonum.“)
- Tussis catarrhalis chronica.
1554. 1561.
— chronica. 1881.
— — Infantum.
1389. 1421. 1543.
— convulsiva. 202. 386.
395. 496. 498. 520. 660.
667. 674. 675. 791. 795.
814. 815. 819. 998. 1000.
1335. 1393. 1476. 1540.
1544. 1881. 2101. 2436.
2449. 2508. 2516. 2517.
2611. 2612. 2615. 2634.
2741. 2743. 2744. 2905.
3062. 3631. 3646.
- Tussis convulsiva Adultorum.
659.

- Tussis convulsiva cum typo intermittente. 1008.
 — Infantum. 181. 336. 1504. 2102.
 — ex Morbillis. 1390. 1301. 1504.
 — spasmodica. 483. 670. 1256. 1542. 1557. 2107. 2192. 2429. 2739. 2819.
 Tussis spasmodica Infant. 181.
 — — Phthisicorum. 425. 2451.
 Tylosis. 1407. 1408. 1428. 2115.
 Tympanitis. 328. 329.
 Typhus. 15. 38. 1193. 1328. 1416. 2705. 3421. 3447.
 (Vergl. „Febris nervosa.“)
 Typhus abdominalis. 192.
 — petechialis. 960. (Vergl. „Febris putrida.“)
 — cum torpore. 453. 458.
 — — — organorum digestionis. 2580.

U.

- Uebelkeiten Schwangerer. 2194. (Vergl. „Vomitus Gravidarum.“)
 Ueberbein. 973.
 Ulcera. 562. 563. 578.
 — arthritica. 1825. 2099. 2150.
 — atonica. 174. 768. 1121. 2166. 2281. 3030. 3659.
 Ulcera callosa. 577. 2269.
 — carcinomatosa, s. Carcinoma.

- Ulcera in cavitate Oris. 94. 1291. 1345. 2277. 2702.
 Ulcera Conjunctivae. 2038. 2163.
 — Corneae. 583. 594. 853. 1470. 1887. 1974. 2038. 2041. 2163.
 Ulcera Faciei. 645.
 — — phagedaenica. 1913. 1914.
 — foetida. 1038.
 — fungosa. 88. 227. 228. 474. 577. 1049. 1502. 2269. 2688.
 Ulcera gangraenosa. 969. 972. 1216. 1224 — 1228. 1234. 1235. 1454. 1649. 2653. 2832. 3249 — 3251. 3253.
 (Vergl. „Gangraena“ und „Sphacelus.“)
 Ulcera Glandis. 2064.
 — herpetica. 58. 2217. 3249. 3640.
 — impura. 1618. 1721. 1726. 3253.
 — Intestini recti. 439. 749. 2641.
 — inveterata. 2949.
 — Labiorum. 645.
 — laxa. 1229. 1456. 1458. 1552. 1649. 1654. 3089.
 Ulcera Linguae. 1460.
 — luxuriantia foetida. 2419. 2647.
 — maligna. 647. 1068.
 — mercurialia in cavitate Oris. 430. 975. 976.
 — Palpebrarum. 2038.

- Ulcera Papillarum Mammæ. 579.
 — Pedum. 768. 769. 898. 1130. 1215. 2044. 3154.
 Ulcera Pedum callosa. 2044.
 — phagedænica. 2269. 3249. 3478.
 — scabiosa. 58.
 — scorbutica. 1721. 2647. 3253.
 — scrofulosa. 74. 690. 722. 723. 1726. 1905. 1906. 1916. 2043. 2150. 2156. 2160. 2161. 2165. 2168. 2216. 2260. 3022. 3026. 3032. 3249. 3615. 3624. 3659.
 Ulcera syphilitica. 56. 57. 58. 59. 593. 595. 647. 648. 898. 1402. 1499. 1890. 1896. 1899. 1900. 1904. 1905. 1915. 1916. 1952. 1955. 1956. 1958. 1963. 1968. 1975. 2007. 2008. 2021. 3529. 3606. (Vergl. „Syphilis.“)
 Ulcera syphilitico-mercurialia. 2150.
 — torpida. 721.
 — Urethrae. 749. 2826.
 — Vaginae. 749.
 — Vesicae urinariae. 1780.
 Unfruchtbarkeit. 3205. 3209. 3210. 3214.
 Ungeziefer auf dem Kopfe. 143. 449. 2091.
 Unruhe kleiner Kinder. 3116. 3117.
 Unterleib, träge Absonderungen in demselben. 2591.
 Unterleib, Aufgetriebenheit desselben. 2631. (Vergl. „Flatulentia.“)
 Unterleib, Aufgetriebenheit desselben, bei Kindern. 450. (Vergl. „Flatulentia Infantum.“)
 Unterleib, Torpidität und Verschleimung desselben. 1801. 2591.
 Unterleibsabzehrung Erwachsener. 1475.
 — — der Kinder, s. Atrophia mesenterica Infantum.
 Unterleibskrämpfe. 1097. 1106. 1148. 1166. 1168. 1196.
 Unterleibskrämpfe, hysterische und hypochondrische. 280. 1168.
 Unterleibskrämpfe der Kinder. 1422. 1423.
 — — der Wöchnerinnen. 1149.
 Unterleibskrankheiten. 1741.
 Unterleibsleiden von gestörter Assimilation. 1475.
 Unterleibsorgane, drüsige, Atonie derselben. 1594.
 Unterleibsorgane, Entzündung derselben. 2430.
 — Entzündung derselben bei Kindern. 2343.
 Unterleibsorgane, Physkonie derselben mit Erweichung. 1601.
 Unterleibsschmerzen. 2113.
 Unterleibsschwäche. 618.

Unterleibsstockungen. 159.
 246. 344. 486. 488. 489.
 499. 506. 536. 613. 924.
 925. 1059. 1122. 1161 —
 1164. 1424. 1718. 1730.
 1731. 1742. 1784. 1804.
 1806. 1808. 2135. 2229.
 2318. 2320. 2331. 2380 —
 2383. 2592. 3125. 3127.
 3133. 3142. 3145. 3300.
 3309 — 3311. 3508. 3531.
 3533. 3536 — 3538. (Vergl.
 „Infarkten.“)
 Unterleibsverhärtungen. 628.
 811. 818. 2048. (Vergl.
 „Leberverhärtungen.“)
 Urethralgia. 2847.
 Urethritis. 343.
 Urethrorrhoea. 757.
 Urinverhaltung, s. Ischuria.

V.

Vari. 388. 825. 826.
 Varices Gravidarum. 359.
 3546.
 Variolae asthenicae. 374.
 — inflammatoriae. 3515.
 — in Oculis. 971.
 Veitstanz, s. Chorea Sti. Viti.
 Verbrennung, s. Combustio.
 Verdauungsbeschwerden. 1077.
 1575. 1651. 1684. 1767.
 1768. 1773. 2690 — 2692.
 2972.
 Verdauungsbeschwerden kleiner Kinder. 1982. 2509.
 2514. 3298.
 Verdauungskanal, zur Wieder-

herstellung der normalen
 Absonderung in demselben.
 1920. 1921.
 Verdauungsschwäche, s. Ma-
 genschwäche.
 Verdauungsübel, hartnäckige.
 3627.
 Verdauungswerkzeuge, Atonie
 derselben. 1633.
 Verdauungswerkzeuge, Entzün-
 dung derselben. 1131. 1132.
 Verdauungswerkzeuge, erethi-
 sche Verstimmungen dersel-
 ben. 1711.
 Vergiftung durch Alkaloide.
 1756. 3245.
 — durch arsenige Säure.
 1647. 2249.
 — — arsenigs. Salze.
 I. S. 583.
 — — Blei. 2357.
 — — Brechweinstein.
 1756. 3245.
 — — Schwefelsäure.
 2248.
 — — Strychnin. 2857.
 — — Zinkvitriol. 1756.
 3245.
 Vergiftungen. 3641. 3642.
 Verhärtungen, chronische.
 1996. 1997. 2062. 2067.
 2308.
 Verhärtungen, entzündliche.
 2067.
 — skrofulöse. 722.
 723. (Vergl. „Drüsenver-
 härtenngen“ und „Scrofulo-
 sis.“)
 Verhärtungen syphilitischen
 Ursprungs. 719.

- Verrenkungen, s. Luxationes.
 Verrucae. 88.
 — syphiliticae et gonorrhoeicae. 76. 3223. 3224.
 (Vergl. „Condylomata.“)
 Verschleimung. 536. 702.
 2317. 2380. 2381. 2907.
 3536.
 Verschleimung der Bronchien.
 558. 1560. 1561. 2466.
 2906.
 Verschleimung des Darmkanals.
 2734. 3120. 3121.
 3550.
 Verschleimung des Darmkanals bei Kindern. 1657.
 1661.
 Verschleimung im Halse. 2666.
 — — der Kinder. 3116.
 3117.
 — — des Magens.
 1076. 1371. 1375. 2276.
 3426. 3607.
 Verschleimung der Respirationsorgane und des oberen Theils des Darmkanals.
 1597.
 Verschleimungszustand des Unterleibes. 846. 1633. 1801.
 3309 — 3311.
 Verschwärung erfrorner Glieder. 3031.
 — — im Munde nach Speichelfluss. 2277.
 Verschwärungen, bösartige.
 1868. (Vergl. „Ulcera.“)
 Verstauchungen. 3305.
 Verstopfung der Eingeweide mit entzündlichem Zustande.
 1993. 1998.
 Vertigo. 310. 2764. 3566.
 — spuria. 3061.
 Vipernbiss. 307. 310.
 Vomica Pulmonum. 2725.
 Vomiturationes ex acore Ventriculi. 411. 2499.
 Vomitus acidus Infantum. 2507.
 3147. 3597.
 — biliosus. 2116. 2505.
 — chronicus. 171. 574.
 575. 793. 796.
 — Gravidarum. 239.
 2194.
 — marinus. 301. 1751.
 — pituitosus. 2666.
 — spasmodicus. 301. 834.
 2178. 2203. 2245. 2252.
 2253. 2654. 2678. 2690.
 — 2692. 3577.
 Vomitus spasmodicus Infantum. 566. 886.
 — ex vactione. 3182.
 Vorhaut, Brand derselben und des Penis. 1041.
 — Geschwulst derselben, s. Paraphimosis u. Phimosi.
 Vorsteherdrüsen - Skirrhus.
 341. 1029. 2312.

W.
 Wahnsinn. 790. 1805. (Vergl. „Seelenstörungen.“)
 Warzen, s. Verrucae.
 Wasserbalggeschwulst. 362.
 2307.
 — — der Knie-
 scheibe. 2930. 3029.
 Wasserbrechen mit kardialgischen Beschwerden. 1475.

- Wasserbruch, s. Hydrocele.
 Wasserkrebs, s. Noma.
 Wasserscheu, s. Hydrophobia.
 Wassersucht, s. Hydrops.
 Wasserwürgen. 574. 575. 796. 2396.
 Wechselfieber, s. Febris intermittens.
 Wehen, falsche. 2118. 2180. 2802. 2803.
 Wehen, zu schwache. 2661. 2662. 3379 — 3381. 3384. 3386. 3387. 3389.
 Winddorn, s. Spina ventosa.
 Würmer, um ihre Gegenwart zu entdecken. 3526.
 Wunden, zur Austrocknung derselben. 934. 935.
 — brandige. 3250. 3251.
 — frische, besonders der Nerven. 2950.
 — gerissene, zur Verhütung des Starrkrampfes bei solchen. 2824.
 Wunden, schlaffe, unreine. 1552.
 — zur schnelleren Vernarbung solcher. 3024.
 Wundflächen, tendinöse, zur Verhütung fauliger Zersetzung in solchen. 1553.
 Wundsein, s. Intertrigo.
 Wurmfieber, s. Febris verminosa.
 Wurmkrankheit, s. Helminthiasis.
- K.**
- Xerophthalmus. 3003.
- Z.**
- Zähne, zum Bleichen gelber von Tabakrauchen. 903. 904.
 Zähne, feuchter Brand derselben. 1095.
 Zähne, zum Reinigen derselben. 883. 891. 1045 — 1048. 1138. 1236. 1237. 2561. 3112. 3252.
 Zähne, kariöse. 904. 1095. 1127. 1348. 2414. 2415. 2841.
 Zähne, kariöse, zum Ausfüllen derselben. 2563. 2564.
 Zähne, kariöse, gegen den üblen Geruch derselben. 2560. 2562.
 Zähne, wackelnde. 1348.
 Zähneknirschen der Kinder. 886.
 Zäpfchen, lymphatische Anschwellung desselben. 210.
 Zäpfchen, Erschlaffung desselben. 1118. 1221. 1759. 2913. 3069. 3070. 3280. 3543.
 Zahnfieber. 398. 1286.
 Zahnfieber mit Krämpfen. 2548.
 Zahnfleisch, Exulcerationen desselben. 897. 1345.
 Zahnfleisch, skorbutisches. 1347. 2395.
 Zahnfleischentzündung, faulige. 2367.
 Zahnfleischerschlaftung. 125. 208. 209. 1119. 1348. 2643. 2644. 3084. 3105. 3107. 3112.

- Zahnfleischgeschwüre, atonische. 75. 80. Zinkvitriol-Vergiftung. 1756. 3245.
- Zahnkrämpfe. 680. 3597. Zittern, s. Tremor Artuum.
- Zahnschmerz, s. Odontalgia. Zunge, fressende Geschwüre derselben. 1460.
- Zellgewebe-Verdickung. 90. Zungenlähmung. 2917. 3073. 3428.
- Zellstoff, verdorbener. 774. Zweiwuchs, s. Rhachitis.
- Zerstörung organischer Theile, Mittel dazu. 643. 644. 1604. 2257. 3616.

Berichtigungen und Nachträge.

- I. Bd. S. 67, Recept 1, lese man in der Unterschrift: Meyer, anstatt Mayer.
- — 67, Recept 2, lese man in der Unterschrift: F. X. Hartmann, anstatt J. X. Hartmann.
- — 95, Recept 101, lese man in der Unterschrift: Behrends, anstatt Behrends.
- — 105, Recept 138, lese man in der Anwend.: Man schüttet, anstatt Man schüttelt.
- — 202, lese man in der Ueberschrift: Angusturae cortex, anstatt Angustura cortex.
- — 206, Recept 470, lese man in der Anwend.: syphilitische, anstatt syphylitische.
- — 208, lese man: 475., anstatt 375.
- — 209, lese man unter den Synonymen: Sulphuretum Antimonii luteum, anstatt Sulphuretum Antimonii.

I. Bd. S. 209, Recept 477, lese man: Pharm. Paup. Cerutti, anstatt Pharm. Paup.

— — 214, lese man unter den Synonymen: Sulphuretum Stibii rubeum, anstatt Sulphuretum Stibii.

— — 232, Recept 554, lese man in der Signatur: Alle Viertelstunden, anstatt Aller 4 Stunden.

— — 244, Recept 596, lese man in der Unterschrift: Emplastrum, anstatt Emplastum.

— — 300, Recept 757, lese man in der Anwend.: Urethrorrhöe, anstatt Uretorrhöe.

— — 314, Recept 896, lese man in der Unterschrift: Freyberg, anstatt Freiberg.

— — 351 fällt in der synonymen Benennung Calcareum sulphuratum stibiatum das Komma weg.

— — 437, Recept 1192, lese man in der Anwendung: Gegen Wassersucht nach Wechselfieber, anstatt Gegen Wassersucht und Wechselfieber.

— — 441, Recept 1211, lese man in der Anwendung hyposthenische Fieber, anstatt hypersthenische Fieber.

— — 577, Recept 1629, lese man in der Anwendung: Formeln, anstatt Formen.

— — 623, Zeile 8. von oben, lese man: Lalic, anstatt Lalié.

II. Bd. S. 39, Recept 2236, lese man: Kali carbon. crudi, Kali nitrici crudi āā 3ij, anstatt āā 3ij.


— — 518, I. Register über die Autoren, ist bei Berends die Nummer 1420, sowie S. 522 bei Fricke die Nummer 1499 nachzutragen.

— — 600, III. Register über die Krankheiten, ist bei Drüsenverhärtungen die Nummer 1584 nachzutragen.



Druck von Fr. Rückmann in Leipzig.

Med.
Walther



Walther, Johann Carl Wilhelm,

Ausführliches Recept-Taschenbuch in alphabetischer Ordnung für praktische
Aerzte und Wundärzte mit einleitenden Bemerkungen über die Art und Weise
Recepte zu verordnen
Bd.: 2

Leipzig 1847

Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek -- Med 4757 -2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11192803-9